

1907



BIBLIOTECA DELLA R. CASA
IN NAPOLI

N.º d'inventario 365 371

Sala Grande

Scansia 3 Polchetto 1

N.º d'ord. H 26

Palat. III 3



5742 JOANNIS DANIELIS LEERS
**FLORA
HERBORNENSIS**

EXHIBENS
P L A N T A S


CIRCA
HERBORNAM NASSOVIORVM

CRESCENTES,
SECUNDVM
SYSTEMA SEXVALE LINNAEANVM

DISTRIBVTAS,
CVM DESCRIPTIONIBVS RARIORVM IN
PRIMIS GRAMINVM,
PROPRIISQVE OBSERVATIONIBVS
ET NOMENCLATORE.

ACCESSERVNT
GRAMINVM OMNIVM INDIGENORVM
EORVMQVE ADFINIVM
ICONES CIV.


AVCTORIS MANV AD VIVVM DELINEATAE
AERIQUE INCISAE.



HERBORNAE NASSOVIORVM

SYMPTIBVS AVCTORIS
MDCCLXXV.





SERENISSIMO. AC
CELSISSIMO. PRINCIPI. DOMINO
DOMINO
GVILIELMO. V.
PRINCIPI. ARAUS. ET. NASSAVIAE
FOEDERATARUM. BELGII
PROVINCiarUM. GVBERNATORI. HEREDITARIO
ET. IMPERATORI. TERRA. MARIQVE. SUPREMO
RELIQVA.
ACADEMIAE. HERBORNENSIS
RECTORI. MAGNIFICENTISSIMO
PRINCIPI. AC. DOMINO. LONGE
CLEMENTISSIMO.



SERENISSIME
P R I N C E P S
CLEMENTISSIME
P R I N C E P S
AC DOMINE!



Haec opella, quam ad
CELSITUDINIS
TUAE pedes humil-
lime & summa cum
reverentia, tanquam patriae Florae pri-
mitias, in meae erga TE pietatis signum
deponere audeo, enumerationem Plan-

tarum Vegetabiliumque continet, quae
in plantis abundante tractu urbis TUAE
Herbornae, sub TUO illustri glorio-
soque regimine felicissimae, sponte
nascuntur.

Hunc quem multorum annorum
intervallo tandem ad finem perduxī
laborem, quique mihi multum negotiū
ac molestiae faceffivit, votum meum
ardentissimum effecit : ut nempe ad
elaborationem cultumque historiae nat.
Nassoviae, & in primis Botanices, par-
tis in hoc quo vivimus seculo, tam in
Medicina, quam Oeconomia, quo-
vis respectu maximi momenti, quid-
quam conferrem.

Feli-

Felicissimum me praedicabo , si
quem mihi proposui finem, etiam quo-
dammodo tantum adsecutus fuero.
Quodsi TUA CELSITUDO huic
meo labori calculum Suum adjicere,
eo SE oblectare , & hoc leve opu-
sculum SUA summa gratia & patro-
cinio dignum judicare non dedignabi-
tur; hoc & maximum, quo affici pos-
sum, laboris mei quem huic operi im-
pendi, praemium erit, & stimulum ad-
det ad historiae nat. studium , si mihi
vita contigerit, amplius excolendum.

Ceterum ad Summum Numen sup-
plices mitto preces , ut TIBI longissi-
mam det lucis usuram , & universam
regiam domum salvam ac incolumem

ad ultima usque tempora conservare
velit, quo TE diutius, & quamdiu
in mortalium numero futurus sum, ve-
nerari & summa cum observantia per-
sequi possit

TUAE CELSITUDINIS
MEI CLEMENTISSIMI PRINCIPIS
AC DOMINI

SVBIECTISSIMVS CIVIS AC

SERVVS

JOANNES DAN. LEERS.

PRAE-



PRAEFATIO.

Leetori B. S.

Amor studii Botanici, quo jam a teneris annis captus fui, anam mihi dedit, ut tam arduum laborem suscipiens, stirpes in hac plantarum ditissima urbis nostrae regione sponte provenientes, per octodecim annos colligerem, ad quem etiam magna ex hoc studio semper percepta voluptas accedebat, hunc meum ardorem magis magisque incendens. Ascendi eum in finem adjacentes montes, visitavi prata, campos, silvas, meque demisi in nemora umbrosa, paludes cet. Quam collectionem stirpium rite examinarum & in ordinem redactarum Tibi B. L. offerre non dubitavi, sperans fore, ut hanc a me susceptam operam grato animo accipias, minimeque supervacaneam esse putes.

Numerus quidem plantarum, quae in hoc opusculo recensentur, respectu aliorum haud ita magnus est, cryptogamicis exceptis; ve-

PRAEFATIO.

rum haec collectio, si ad spatium vix semimiliare ab urbe distans, in quo plerasque harum stirpium collegi, respicias, alias hujusmodi enumerationes copia, ut mea fert opinio, multum superare videtur.

Me plures stirpes quoque colligere potuisse credo nisi negotia muneris, quibus domi interesse coactus, matutinas vespertinasque horas tantum ambulatiunculis meis Botanicis dicare potui, me ab excursionibus in loca ab urbe remotiora detinuisent.

Novae cives etiam quas, in centies perquisitis locis, in hunc usque diem adhuc reperio, meam confirmant opinionem, Plantarum divitias a benignissimo Creatore in hac regione dispersas, a me nondum exhaustas esse.

Omnes stirpes in hac enumeratione recensitas, sine ullo adjutore socioque a me ipso collectas, solus, omnique vivo auxilio, librorumque plurimorum ad hanc rem necessariorum suppellectili destitutus, argutissime examinavi, majores figura diminuta, minores naturali magnitudine depinxi, descripsi, & denique efficcavi. Fateor vero harum inquisitionem, determinationemque mihi multum negotii fecisse :

cisse : Perill. Equitis a Linné Systema sexuale tantum , mihi omnem , quam desiderabam , utilitatem attulit , ac semper de stirpe quadam dubium certum reddidit ; meque ut unam quamque repertam plantam cognoscere , ejusque genus ac speciem , certitudine physicali , determinare potuerim , docuit.

In stirpium Herbornensium enumeratione celeberrimum Dr. Rosenbach in hac Academia olim Medicinae Professore Antecessorem quidem habui , verum opus illius , quod mihi sine dubio multum utilitatis attulisset , ac certe laborem meum paululum sublevasset , vetustatis injuria , quod dolendum , periit , nec in celeberrimis totius Germaniae Bibliothecis , quamvis multa ad hunc librum inveniendum adhibita fuerit opera , reperiri potuit. Caspar Bauhinus tantum in suo Pinace hujus opusculi mentionem facit.

Stirpes meas secundum Perill. Linnaei Syst. Nat. edit. XII. Holmiae 1767. enumeravi ; nomina generica secundum Ejusdem Gener. Plantar. Viennae 1767. Nomina specifica vero , secundum Species Plantar. Viennae 1764. notavi. Unicuique speciei autem , nomen Genericum

cum cum Numero Speciei Perill. Halleri Hist. stirp. Helvet. edit. nov. adjunxi.

Loca natalia diligenter adposui, ut illi instructionem quandam habeant, qui mea vestigiat premere vellent.

Observationes paucas, plures vero descriptiones addidi; inprimis Graminum eorumque adfinium quae ut adcurate describerem, minutissima quaeque perscrutatus sum, ac necessaria brevissimis, ut potui, exhibui, imo unumquodque Gramen per plures annos, ad minimum examinaui, eorumque habitum, ac fructificationis partes adcurate descripsi. Attamen fatendum est mihi, habitum, figuramque partium adeo saepe variare, ut aliquoties has descriptiones, post aliquot tempus elapsum, mutare expolireque me oportuerit: nihilominus tamen secundum Characteres quosdam quarundam specierum partes, primo intuitu, aliter se visui offerent, ac eas descripsi, operae autem pretium erit in collatione Characterum meorum non individuum tantum, sed plura in diversis locis collecta, secundum hos examinare. Illas vero fructificationis partes, a generico Characterē Linnaeano non discedentes, brevitati studens, in plurimis descri-

descriptionibus , non vero in Iconibus , omisi.

Plantas omnes, quarum partes Officinas ingrediuntur, summo cum studio annotavi, quo verae species, non autem ex ignorantia, ut saepe fieri solet, falsae colligantur; nec, in urbis nostrae tractu sponte provenientes, sumptibus ab exteris adferantur.

Quasdam paucas cum cruce (†). signatas, quarum investigatio, ob defectum seu mutilationem partium, mihi sufficientem certitudinem praebere non poterat, in civium dubiorum numero habeo.

Et quia Graminum cognitio hisce omni luce perfusis temporibus, ob eximium, quem adfert Oeconomiae usum magni momenti, Tirolibusque difficillima est, operam dedi, ut omnia gramina indigena, eorumque adfinia, ad vivum depingerem, & praecipuarum partium Icones adcuratas propria manu aeri incisas, in majorum usum adjungerem.

Et quum ad requisita Botanici proprie pertineat, ut & sit pictor ac sculptor; exemplum magni Dillenii imitatione dignissimum imitari mihi proponebam. Omnem itaque adhibui operam,

ut

ut figuras summa cum adcuratione depingerem, easque depictas, quas aliena manus forte deformasset, cum Chalcographi manu ductio-
ne destituerer ipse aeri inciderem, caelique
usum discerem, cuius ope omissa aliaque aqua
forti defigurata, emendare expolireque possem.

Quantum laboris & negotii vero hujus Ar-
tis primaria Experimenta mihi fecerint, vix
exprimere possum. Quae cum ita sint L. B.
non a me ut autodidacto in arte Chalcographi-
ca, artificiosa specimina multaque arte exorna-
ta expectabis, sed hisce iconibus simplicissi-
mam naturam repraesentantibus, ut spero,
contentus eris.

Animus mihi erat Vegetabilia Cryptogami-
ca, Muscos nimirum & Algas, hasce umbra-
rum incolas, quibus ob structuram mirabilem
eximiamque pulchritudinem semper amicissi-
mus fui, tanquam secundam hujus florae par-
tem, non multo post hanc primam in lucem
edere; sed tam multa se mihi opposuerunt im-
pedimenta, quae nullo modo superari pote-
rant, meque ab hoc opere perficiendo detinue-
runt. Propterea hanc partem cum Crypto-
gamia, quam sine ea mutilatam ac imperfectam
publi-

publico tradere malui. Si vires corporis longo & ad hucdum me premente malo admodum debilitate mihi potestatem facient, ac si Deo T. O. M. sic visum fuerit, ut hac vice ex incommoda hac valetudine emergam; Muscos Algasque sub tit. *Vegetabilia Cryptogamica Iconibus illustrata*, cum accuratis a me ipso ad vivum depictis & autographa manu aeri incisis figuris, emittere, animum induxi. Et cum mihi Perill. Hallerus, pro sua benignitate omni laude dignissima, suos plurimos rarosque Muscos & Algas mecum humanissime communicare pollicitus sit, haec mea collectio hoc additamento eo numerosior, illustrior, ac utilior evadet.

Ipsa opere Dilleniano quo Muscorum indagator carere non potest, destitutus sum; nam Celeberr. Doct. Boehme Bibliothecar. & Prof. Giesae mihi quidem istud per literas enixe roganti, humanissime misit, quia mihi autem non nisi per aliquot hebdomadas concedebatur, non multum in usum meum convertere potui. Natura igitur, quam tantum imitabor, ipsa mihi sufficiens erit, ad meas icones, cum artem Chalcographicam diligentius nunc quam antea excoluerim eiusque plurima arcana de-
 texe.

texerim, adeo naturae similes acri incidendas, ut nisi figuras Dillenianas, Michelianasque superent, iis tamen in re nulla, quae certe ad accuratationem attinet, cedant.

Haec mea collectio multa alia Vegetabilia Cryptogamica rariora continebit. Non unaquaeque flora enim Anthocerote, Buxbaumia, Blasia, Marchantia conica & hemisphaerica, quibusdam Ricciae ac multis Jungermanniae speciebus &c. gaudet. Quae tamen omnia in locis a nullo adhuc perscrutatis ipse primo reperi, pluraque eorum adpositis nominibus cum Amicis communicavi.

In ceteris frui hoc meo labore B. L. qualiscunque etiam sit, eumque serena excipe fronte, ac finis quem mihi in hoc tam arduo labore suscipiendo proposui, non immemor esto. Qui nisi rei herbariae peritorum applausum captem, me aliquid tamen ad Botanophilorum tironum usum contulisse mihi gratulari possum. Dabam Herbornae Mense Novembri MDCCLXXIV.

JOANNES DAN. LEERS.

VITA



VITA
JOANNIS DANIELIS LEERS,
SCRIPTA

AB

HENRICO PAULO LEERS, FILIO.



Idem cum aliis, maxima cum indignatione, diu
multumque observavi, homines plerosque in
hoc mundi theatro versari, absque ut sentiant,
pulchritudinem, ordinem ac sapientiam ex naturæ
operibus elucens : cum tamen, Cl. LINNÆO (a) ju-
dice, *rerum creaturarum indagatio ab hominibus sibi ve-*
lictis semper aestimata ; vere eruditis ac sapientibus
semper exulta ; male doctis & barbaris semper ini-
mica fuerit ; cumque eruditissimus quisque inficias
ire non potuerit, hanc scientiam mirificam & utili-
tatem & voluptatem adferre cultori. Ego quidem
b a prima

(a) LINN. Syst. Nat. edit. Holm. XII. Tom. I. p. 14.

a prima statim ætatula, amorem quasi a natura insitum percepi doctrinæ naturalis, simulque in hunc usque diem ea, mirum in modum, delector, mihi-que hoc plus semel in optatis fuit, ut historiæ naturalis scientia pateret latius, ita ut non tantum esset disciplina medicorum propria, sed & Theologorum atque Jurisconsultorum fora occuparet. Non quidem opus est, ut multis verbis hujus scientiæ ostendam utilitatem. Res ipsa, & ii, qui vel primoribus tantum labris hocce studium attigerunt, loquantur. Pauca tamen hac de re *ἐπεὶ* dicere, animus est.

Cum omnes in eo conveniant, ut sapiens nihil frustra faciat; quare, quæso, Deus mihi oculos dedit, & quare rationem? Nonne ad sua opera in hocce mundo consideranda? Si itaque Dei opificiū, vel contemptui habeam, vel plane negligam, & non dignum judicem, quod a me videatur, huic fini, quem Deus sibi in hoc mundo creando proposuit, penitus repugno. Quod si vero negaveris, prodesse harum rerum cognitionem: magno te hercle temeritatis crimine obligaveris; cum de Deo ignominiosum sit dicere, quædam ab ipso esse effecta, quæ plane nullum habeant usum (b).

Por-

(b) Sic e. g. usum, quo gaudeant Insecta, hæc animalcula
a vul-

Porro cum omnes res creatæ ab opifice optimo maximo originem trahant, atque ex iis divinæ perfectiones eluceant; hominis ratione prædicti esse puto, virtutis divinæ cognitionem, ex sacris literis haustam, ope contemplationis rerum creatarum, luce pleniore collustrare. Ex rebus namque creatis perfectiones Dei patere, cuivis extra dubium positum est. Nimirum supremi Numinis potentia ex creatione, gubernatione, ac omnium rerum conservatione evincitur. Etenim pulcherrimus nexus, qui in rebus, quas benignissimus creator in hocce mundo produxit, deprehenditur, evidentissimum divinæ sapientiæ indicium est. Bonitas deinde creatoris in eo cernitur, quod, experientia teste, omnia in hominum usum sint condita cetera. Nam Sicuti e. g. in artificioso quodam opere, artificis solertiam admiror, sic & ex rebus, in hac rerum universitate a Deo productis, Ejus perfectiones colligo. In rebus creatis divinæ artis ac sapientiæ sunt vestigia: Hæc adeat ille, qui Dei existentiam in dubium vocare non erubescit. (c)

b 2

Dein-

a vulgo plerumque susque deque habita, ostendit Cel. de
GERR.

(c) Videatur Clar. NAEVENTYT L'existence de Dieu
démontrée dans les merveilles de la Nature.

Deinde hominem obligatum esse ad divina opera contemplanda, ex eo quoque recte judicatur, quod eum Deus, haud temere aut fortuito, miro varietatis ac pulchritudinis sensu, instruxit, ut & magna cupiditate res creatas contemplandi per se feratur. Hanc itaque sciendi cupiditatem naturalem esse video, & cum haec naturæ dos, quam Deus humano cordi iniecit, non sine ratione eidem indita videatur, & huic obtemperare meum esse, plane video.

Quantam non adfert tandem historiæ Naturalis notitia cultoribus voluptatem? (d) Etenim Animus hominis ita est comparatus, ut ex varietate & pulchritudine non possit non incredibilem voluptatem capere. Et ubi quæso major rerum varietas (e) ac venustas reperitur, quam in regno naturæ? Item quot inveniantur animalia? Quantus numerus vegetabilium, lapidum, cet., & quanta pulchritudine singula sunt exornata? Ratio, ob quam quarundam naturalium pulchritudo non statim perspi-

(d) *Hæc contemplatio Natura evadit voluptatis cælestis vestibulum, cujus particeps Animus in luce obambulat, & sanqu岸 in terrestri cælo vitam degit. L. E. Holm.*

(e) *Non ad unam, inquit SENECA, Natura formam opus suum præstat, sed in ipsa varietate se jactat.*

perspiciatur, sæpe quærenda est in minutissima ac subtilissima ipsarum structura & partium coagmentatione, quæ non statim in sensum cadit, sed, quando microscopiis subjecta fuerit, earum pulchritudo animadverti facile potest. Si v. g. nonnullæ cives civitatis Cryptogamicæ tali essent magnitudine, quali Aloe indica gaudet, certe, ut mea fert opinio, plurium oculos in se traherent, & viridiorum Regionum decora essent eximia. Quælis pulchritudo non conjuncta deprehenditur in minuta quavis bestiola, quæ sæpe pedibus calcatur, & a communi hominum turba sperni solet? Quis enim, quæso, si structuram plurium insectorum contemplatur, oculos satis pascere, animumque exsaturare satis poterit? Hinc ipsi Magnates ac Reges hujus amore ducti, scientiæ naturali operam dare omni tempore consueverunt, nec hoc suæ dignitati dedecori esse putarunt, adeoque hoc modo novum illi splendorem conciliare voluerunt (f) Primum humanitatis patrem etiam, si quid video, hi-

(f) Quantos fecerit Rex ille *Salomon* in Hist. nat. progressus, patet ex Reg. 4: 33. ubi traditur, eum locutum fuisse de arboribus, de cedro Libani usque ad hyssopum ex pariete nascentem, de quadrupedibus, avibus, reptilibus, ac piscibus.

istoria naturali delectatum esse, sacrae literae testantur. (g)

Postremo cum omnia opera Divinam gloriam prædicent per hominem (b), ille itaque Auctoris sui majestatem ex fine creationis contemplari debet, ut hoc modo, ut par est & æquum, evadat, summi Numinis præco.

Verum enimvero infinita foret oratio, si omnia vellem explicare argumenta, quæ pro dignitate ac præstantia naturalis studii adferri possent, sed vereor ne actum agam, cum id iam pridem a multis eruditis hominibus præstitum sit egregie. Hæc ergo sufficiant, ad declarandam utilitatem hujus studii. Rem ipsam attigi: nunc vero ad hujus opusculi auctorem progrediendum videtur.

Antequam vero de Ejus vita exponam, in antecessum moneo, eum non criminis illius esse accusandum,

(g) Nam legimus de primo homine Deum ad eum omnia animalia duxisse, ut ipsis nomina imponeret. Hinc certas notas noverit necesse est, quibus species a se invicem distinguantur. Opus propterea erat horum animalium cognitione.

(b) Psalm. 118.

sandum, cujus se, ut supra dixi, plurimi hominum
 reos facere solent, nimirum ignorationis naturæ.
 Beatus videlicet auctor vitæ suæ pretium metiri
 sciebat, atque adeo, quamdiu vixit, quantumque
 potuit, tempus bene impendebat, ad opera creatoris
 contemplanda ac perscrutanda, sæpe dicere solitus :
 omnia alia oblectamenta (s. quæ tantum talia esse
 videntur, non autem re vera sunt) crassiora,
 quæ v. g. a lusibus, confabulationibus & com-
 potationibus penderent, minime comparanda esse
 cum hisce, quarum nos, contemplatione operum
 divinorum, participes fieremus. Hisce namque
 nos omni tempore, loco & in quacumque demum
 humanæ vitæ ætate, ac habitu, frui posse. Omnia
 autem ea in deliciis habebat, quæ continent tria
 regna naturæ. Nec minus delectabatur vermicu-
 lo, pulverem inhabitante, quam altissima, exquisi-
 tissimisque coloribus exornata, planta. Nulli adeo
 pepercit labori, tam in colendo Botanices studio,
 cui imprimis operam dabat, quam in colligendis
 plantis. Hujus rei stimulum ipsi indiderat, sicuti de
 se Ipso in præfatione monuit, cupido quædam
 insatiabilis, eique quasi innata, quam a tenera sta-
 tim juventute persenserat, opera Naturæ colligen-
 di, eaque cum attentione contemplandi. A primis
 vero annis plantas collegit, aliaque naturalia, iisque
 admodum delectatus est, & quidem semper

VITA AUCTORIS.

in gloriam ac honorem creatoris, optimi, maximi.

Quod vero ad originem Ejus attinet, hanc lucem adspexit d. XXIII. Februar. 1727. *Wonsideliae*, Baruthi urbe, ubi pater ejus *Sebastus* oriundus, IOANNES PAULUS BENIGNUS LEERS, mercaturam magnariam exercebat. Propter præclaras ingenii atque animi dotes, quæ jam in prima juventute sese exerebant, a parentibus ad studia destinatus, & hunc in finem iis scientiis instructus fuit, quibus solida doctrina, tanquam fundamento, inniti debet. Sed providentia aliud plane moliebatur, nonnulla quippe intercedebant, quo minus scientiis operam dare posset. His ita se habentibus, apud animum statuit, studiis relictis, arti *medicamentariæ*, seu *pharmacentiæ*, operam navare, cum in primis incredibili flagraret rerum naturalium amore, eaque libenter tractaret. A patre itaque cum fere annos tredecim esset natus, Norimbergam in pharmacopolium missus est, ad prima hujus artis principia addiscenda. Positis feliciter hac in urbe rudimentis, Norimberga relicta, alias quoque multasque
urbes

urbes invisit , quas hoc loco non attinet commemorare, in multisque officinis servivit. In primis vero Strasburgi aliquamdiu commoratus est , ubi Ipsi occasio fuit addiscendæ Anatomix, aliarumque scientiarum, quæ ad rem medicam pertineant.

Tandem a Deo A. 1755. præter spem atque opinionem Herbornam delatus est , ut ibi præfecti officinæ Academicæ officio fungeretur. Hoc in loco subsidere, ac vitam finire statutum erat. Non ita multa post adventum suum a Pharmacopola *Magerstædt*, relictam viduam (quæ filia erat Pharmacopolæ *Friderici*, olim Dillenburgi versantis) in matrimonium duxit, ex qua tres filios , unamque filiam , genuit : ex quibus filii adhuc hac luce fruuntur, filia vero aliquantisper tantum in hac vita versata, paulo post animam efflavit. Verum ambo non longo tempore fruebantur, quæ ex hoc jucundo conjugio fluebat iucunditate, sed mors funesta mox hoc vinculum, quo arte conjuncti erant, dissolvit, siquidem uxor ejus dilectissima morbo, in puerperio ultimo, correpta, A. 1764, diem obiit.

Quo facto, cum res ejus familiares non paterentur, ut diu vitam ageret cœlibem, altera vice, cum virgine C. M. e gente *Textoria*, oriunda *Giffa*, conubium, iniit, ex quo ipsi filius natus est, qui autem, non multo postquam in lucem editus fuerat, morti occubuit.

Ab eodem Anno 1764., quo hanc virginem domum duxerat, cœpit infirma uti valetudine, morboque affligi gravi, & quidem sic dicto hypochondriaco. Hujus morbi sedes in alvo erat, hinc diris capitis doloribus excruciabatur, & defectu virium admodum laborabat. Vis hujus mali erat tanta, ut nulla spes salutis reliqua esse videretur. Sed Deus T. O. M., qui ipsum adhuc aliquandiu in hac vita, versari voluit, donicum liberi sui, usque huc impuberes, ephebis excederent. Ergo remedia salutaria esse jussit, adeo quidem, ut denuo sanitatem recuperaret.

A. 1770. iterum periculoso affectus est morbo, quem artis salutaris periti Anginam appellare solent. Etiam maximum aderat periculum, omnesque vitæ suæ finem appropinquare credebant. Sed Deus, apud quem possibilia sunt, quæ, apud homines limitata ratione præditos impossibilia esse videntur, omnibus de redintegrandâ valetudine desperan-

sperantibus, se interposuit, eumque ab hoc quoque morbo liberatum, sanitati restituit.

A. 1772. in febrem incidit putrescentem, cujus morbi vis tum temporis in nostræ urbis regione late vagabatur, ipsique mortem minari visa est, sed Deus cujus bonitas immensa est, effecit, ut & hoc morbo explicaretur.

Sed morbus ultimus hic corpus suum usque adeo debilitarat, ut usque in Septembrem A. 1774. continuo levi esset valetudine. Membra ejus tali semper languore laborabant, ut levem quandam deambulationem statim ejusmodi sequeretur lassitudo & virium prostratio, quæ vix exprimi potest, aliaque sese exerebant morbi imminentis indicia, sicuti & hujus mensis initio, morbo quodam pertinaci ac admodum acerbo, corripiebatur. Initium morbi erat Colica spasmodica, quæ cum febre, ut vocari solet, tabida, conjuncta erat, singulis noctibus ipsi magnum sudorem exprimente. Quo fiebat, ut optimis & ad vitam sustentandam necessariis viribus privaretur, quod non nisi mortem ipsi adferre poterat. Denique successu temporis magis magisque, viribus frangebatur, ut maxime lectulo affixus sederet, ita, ut tandem proprio Marte ire non posset, sed duci oporteret. Omnibus autem admirabile visum est, eum, licet diris conficeretur dolori-

VITA AUCTORIS.

loribus & præ lassitudine pedem vix movere posset, miram tamen animi præsentiam ac æquabilitatem retinuisse, ita quidem, ut semper pias preces effunderet, quibus, tanquam antidoto contra morbi cruciatus, usus est. Nullis parvitum est remediis ad eum hocce morbo levandum. Cel. Dr. & Prof. *Hoffmannus* t. t. Acad. Herbornensis Prorektor, & Clar. Dr. *Ebertz*, advocati ipsum inviserunt, multaque curarunt: quin imo Ipse nonnunquam sibi quædam ex officina sua præscripsit. Sed nihil horum exoptatum effectum habuit, omniaque irrita fuerunt: Ipsemet enim sentiebat vitæ suæ finem appropinquare, sibi ex hac vita discedendum esse.

Omnibus itaque exacte dispositis, quæ ad rem domesticam attinerent, ut Christianus constans, quem nec mortis terror concutere potest, mira animi tranquillitate mortem exspectabat, qui suis doloribus finem imponeret. Neque etiam sibi longiorem exoptavit vitam, sed libenter mori voluit & quavis hora optavit. Tandem & voti sui fuit damnatus:

nam

VITA AUCTORIS.

nam 7mo die Decembris, hora post meridiem fere tertia, interna viscerum inflammatio, doloribus & vitæ finem fecit.

Talem exitum habuit vita viri, qui propter multa sua, eximiaque merita, quamdiu in hac vita versabatur, ab omnibus, qui eum æstimare poterant, eximio amore colebatur. Urbs ejus obitu rerum naturalium peritissimum & in multis artibus ac scientiis versatissimum amisit Virum: Liberi vero ejus patrem, cujus obitum numquam satis elugere poterunt.

Considerato itaque vitæ cursu exituque, describenda erit, partim Parentis beati cognitio rerum naturalium, partim character Eius moralis.

Quod quidem ad cognitionem ejus attinet in rebus naturalibus, (i) Regno in primis Vegetabili operam

(i) Deplorandum est, quod hujus opusculi autor, nunc inter cœlites triumphans, in ætatis suæ flore debitum naturæ persolverit, siquidem ipsi animatus erat, post editam hanc

VITA AUCTORIS.

operam dederat, ductu Botanicorum facile principis & Sueciæ immortalis decoris Cl. LINNÆI; quem semper magni fecit, cujusque non sine inima quadam veneratione mentionem iniecit, sæpius dicens: multa ipsi in Botanicis esse accepta referenda. Ratio, de qua hunc præ ceteris Botanices peritis, eximio quodam amore, profecutus est, hæc fuit, quia omnia solidissime tractasset. In urbe Herborna autem primum, intentis viribus, Botanicæ operam dedit, multaue illam diligentia tractare cæpit, ad quam ipsi quoque plantarum ditissima circa Herbornam regio ansam dedit. Plantas colligere incepit, & nulli propterea pepercit labori, visitans omnes circa Herbornam locos, ita quidem, ut nullus fuerit circa urbem locus, cui non vestigia sua impressit: vereque de eo dici potest, quod Perill. HALLERUS in præfatione ad Floram Jenensem de *Ruppio* ait: *cum omnes agrorum*

hanc, circa Herbornam crescentium plantarum collectionem, atque plantarum cryptogamicarum completam historiam, etiam imperium animale intrare & b. c. d. Faunam Herbornensem conscribere, de qua sibi in antecessum multum voluptatis promittebat. Sed providentia semper sapiens ac benigna, in qua acquiescere nostrum est, Ipsum præmaturam mortem obire iussit.

rum filvarumque angulos perreptasse. Octodecim namque annorum spatio collegit plantas, quas hæc opella continet: & tandem, licet magno cum labore ad finem perduxit.

Optimum vero erat, quod Deus ipsi tamdiu lucis usuram concesserat, donec hoc opus, exceptis nonnullis adhuc plagulis, impressum, & reliquum Ipsimet ante obitum jam scriptis consignatum esset. (k) Promiserat quidem in fine Muscorum & Algarum, se velle, si vitæ usura ipsi concederetur longius, completam plantarum *Cryptogamicarum*, circa Herbornam nascentium *historiam* tradere; (l) sed morte præventus, promissis stare non potuit.

Si

(k) Ea, quæ ego post obitum suum typis excudenda curavi, sunt Præfat. Dedicat. ac Nomencl.

(l) Cum in primis beatus Pater plantas *Cryptogamicas* in deliciis haberet, quarum insigni copia regio nostra ditata est, cumque præterea perillustis HALLEYUS plurimos de suis rarioresque muscos Patri roganti promississet, quos ego demum post obitum Eius, a Viro humanissimo, cui propterea tantas, quantas mens mea capere potest, grâti-
Iubens

VITA AUCTORIS.

Si denique ad religiosos sensus Eius moresque respiciamus, ut fervidus doctrinæ Christianæ confessor vixit, ac per totam vitam in id incubuit, ut, quantum fieri poterat, Christi servatoris præcepta observaret, & officiis suis, quæ ipsi erga Deum & proximum præstanda erant, pro viribus satisfaceret. Hinc quoque in vitæ fine mira animi tranquillitate, animam efflare, & spiritum suum immortalem Servatoris manibus tradere poterat. Sancte ergo non tantum vixit, sed & moribundus exemplum præbuit adstantibus, quanta hilaritate ac pace Christianus ex hac vita discedere posset. Ita ut votum meum tandem aliquando sit hoc, ut *moriar morte hujus Iusti, & finis meus sit, sicut finis Illius.*

Iubens meritoque persolvo, traditas accepi, profecto aliquid Parens in hac Botanices parte, adhucdum maxime relicta ac inculta, præstare potuisset, quod reipublicæ Botanicae complicandæ & illustrandæ utile & fructuosum fuisset, si id modo fata voluissent.

NOMEN.

**NOMENCLATOR
LINNAEANUS**

SEU

EXPLICATIO

TERMINORUM

TECHNICORUM

IN HOC OPUSCULO.

OCCURRENTIUM

ORDINE ALPHABETICO

EXHIBITA.

Nota ad B. L.

Licet Cl. LINNAEUS in *Horto Cliffortiano*, *Philosophia Botanica*, *Fundamentis Botanicis*, & in Libello, cui tit. est^a. *Termini Botanici explicati*, quoad maximam partem terminos botanicos exposuerit, maxime tamen sparsi sunt, hinc inde colligendi, ac ordine alphabetico non exhibiti. Me propterea haud parvam apud Tirones gratiam initurum putavi, si hosce collectos & ordine alphabetico dispositos, in Tironum usum exhiberem.



A.

1. *Abbreviatum* Perianthium, (572) longitudinem Tubi (857) Corollae (193) non attingens.
2. *Abortiens* Pericarpium, (573) quod ante maturitatem decidit.
3. *Abrupte pinnatum*, Pinnatum (593) terminatum neque Cirrho (142) neque Foliolo. (323) id. ac *Pinn. sine impari.* (595)
4. *Acaulis* Planta, Caule carens. *Carduus acaulis.*
5. *Acerosa* Folia; Linearia, (458) Subulata, (807) persistentia, (577) plerumque basi articulatione ramo inserta. *Pinus, Juniperus.*
6. *Acinaciforme* Folium, Compressum, (166) Carnosum, (122) altero margine convexo angusto, altero rectiore, crassiore.
7. *Acinaciforme* Pericarpium, (573) cum fructus instar cultelli compressus, altero angulo longitudinali obtuso, altero rectiore crassiore.
8. *Acotyledones* Vegetabilia, ubi nulli omnino exant Cotyledones (199) sub seminis Germinatione (352) *Cryptogamia.*
9. *Aculeatum* Folium, cum Aculei pungentes rigidi occupant Discum. (257)
10. *Aculeatus* Caulis, (132) Aculeis (11) Sparsis, f. confertis armatus. *Rosa. Berberis. Rubus.*
11. *Aculeus*, Mucro pungens Plantae (600) Cortici tantum adfixus. (non Ligno.) 730. 657. 404. 668. 354.
12. *Acutum* Folium, quod terminatur Angulo acuto. (*)
13. *Adnatum* Folium, Pagina (334) superiore basi rami adnexum.
14. *Adscendens* Caulis, Fol. Pedunc. Coroll. 4. arcuatim sursum versus.

(*) Si super lineam ductam perpendicularum erigo, anguli qui inde utrinque oriuntur, *recti* dicuntur. Anguli rectis maiores aut minores sunt *obliqui*. Et maiores quidem rectis appellantur *obtusi*, minores vero, *acuti*. *Geometre.*

IV NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

15. *Adversum* Folium, cum Pagina (534) superior non Coelum sed horizontem spectat.
16. *Aequalia* Filamenta (303) eandem servantia longitudinem.
17. *Aequalis*, Corolla (193) ubi partes figura, magnitudine, & proportionem aequales sunt
18. *Aestivatio*, Corollae (193) Complicatio ante explicationem Floris.
 a. Convoluta (186) b. Conduplicata, (171) c. Imbricata (391) d. Valvata. e. Inaequalivalvis.
19. *Aggregatus* Flos. Compositus (162) Receptaculo (661) dilatato, flosculis subpeduncularis *passione*.
20. *Ala*, membrana adfixa femini. (712) (24)
21. *Ala*, denotat Angulum, quem cum Caule facit Petiolus (585) & vicissim. (72)
22. *Alae*, (Caulis,) membranac foliaceae, quae secundum Caulium longitudinem decurrunt. (25)
23. *Alae*, Corollae Papilionaceae (545) Petala duo quae Carinae (125) lateribus utrinque adstant folitariae.
24. *Alatum* Semen (712) lateribus membrana auctum, qua volitante disseminatur *Acer. Fraxinus. Ulmus.*
25. *Alatus* Caulis, qui secundum longitudinem est foliatus. (22) *Scrophularia. V. Thapsus.*
26. *Alatus* Petiolus (585) latere utrinque membrana auctus. *Citrus. Aurant.*
27. *Alterna* Folia, cum unum post alterum, tanquam per gradus circa Ramum exoritur.
28. *Alternatim* pinnatum Folium. Pinnatum (593) foliolis alternis minoribus.
29. *Amentum* Calycis (113) Species, a Receptaculo communi (152) filiformi, squamis palcaceo-gemmaceis distinctum.
30. *Amplexicaule* Folium, si basis Folii utrinque ambiat latera Caulis transversim. (713)
31. *Anceps* Caulis, angulis duobus oppositis acutiusculis.

32. *Androgyna* Planta. (484)
33. *Angyospermus* Fructus. Semina Pericarpio (573) recta.
34. *Angulatum* Folium. Angulis (36) pluribus prominentibus. (834) (634)
35. *Angulatus* Caulis, pluribus quam duobus angulis cavis longitudinaliter exaratus. Unde obtusangulus acutangulus (12. in not.)
36. *Anguli* foliorum, sunt partes prominentes Folii horizontalis.
37. *Annulus* (Fungi) membrana s. pars Volvae (907) stipitem (778) supra medium cingens.
38. *Annulus* (Musci) dicitur Antherae (41) margo exterior Orae elasticus, orificium coarctans in quibusdam Muscis. estque nudus s. ciliatus.
39. *Annua* Radix, (648) intra annum emoritura.
40. *Anomala* Corolla. (430)
41. *Anthera*, Plantarum Genitale masculinum, (475) Pollen (607) (veram Genituram) ducens, quod matura demittit. (264) (179)
42. *Anthera* (Muscorum) Capitulum s. pars pericarpiformis glabra, membranacea, sessilis, (*Phascum*) vel pedunculo (565) instructa, (*Hypna*) constat Calyptra (112) operculo (522) Ciliis, Polline, & rarius Apophysi (47) differt, Figura, ovata, conica &c. Subulata in *Anthoceroze*, Multifida, (*Marchantia*) quadrifida. (*Jungermannia*)
43. *Antbesis* in Florescentia (313) peragitur, dum Antherae (41) ruptae spargunt suum Pollen (607) vesiculare supra Stigma. (775) Nuptiae Plantarum
44. *Apetalus* Flos., Petalis (581) carens, non Perianthio. (572)
45. *Apex* Folii simplicis (734) respicit extremitatem in quam desinit.
46. *Aphyllus* Caulis, Foliis destitutus.
47. *Apophysis* (in muscis) Pars inferior Antherae

VI NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

- (41) cartilaginea incrassata, qua Pedunculo (565) adfigitur. *Polytrichum*.
48. *Appendiculatus* Petiolus (585) ramentis foliaceis ad basin instructus.
49. *Appressum* Folium, cum Discus (257) folii approximatur Cauli.
50. *Approximata* Folia, ad se invicem proxime accedentia.
51. *Approximata* Volva (907) fungi Pileum (586) accedens.
52. *Arboreus* Caulis, Perennis Caudice (127) simplici gemmifero.
53. *Arillus*, Tunica propria exterior seminis sponte secedens, estque Cartilagineus (*Cynoglossum*) vel succulentus. (*Evonymus*.)
54. *Arista*, Mucro subulatus Glumae (364) insidens graminibus, estque *Recta* (664) *Tortilis* (831) &c.
55. *Arma*, Mucrones arcentes animalia, ne laedant Plantam.
a. Aculei (11) b. Furcae (341) c. Spinae (761) d. Stimuli (776)
56. *Articulata* Radix (648) geniculis (349) intercepta.
57. *Articulata* Siliqua (729) geniculis coarctatis intercepta. *Raphanus*.
58. *Articulata* Spica (759) Internodiis (419) geniculata. *Carex pylvicaris*.
59. *Articulate* dehiscens Pericarpium (573) secundum articulos monospermos transversim. *R. Raphanistrum*.
60. *Articulate* pinnatum Folium, Petiolo communi (885) articulo.
61. *Articulatum* Folium, cum unum ex alterius apice excrescit.
62. *Articulatus* Bulbus (106) constans lamellis catenulatis. *Adoxa*.
63. *Articulatus* Caulis s. Culmus (205) Internodii (419) geniculatus.

64. *Articulatus* Pedunculus (564) Geniculo (349)
plerumque unico instructus. *Rumex*.
65. *Articulus*, Culmi (205) pars geniculis duo-
bus interjecta. Internodium (419)
66. *Asperum* Folium, idem ac scabrum. (702)
67. *Assurgens*, Caulis. Folium, arcuatim erectum,
primum declinatum (215. 216) deinde apice
erectum.
68. *Attenuatus* Pedunculus (564) versus apicem
sensim crassitiem perdens.
69. *Auctum*. Perianthium. (111)
70. *Auriculata* Folia, lobo laterali minore prope
Basin aucta. *Jungermannia*.
71. *Avenia* Folia, Venis destituta. Opposita Veno-
sis (882)
72. *Axilla*, *Axillaris*, est denominatio quae spa-
tium comprehendit inter Caulem Ramum et Fo-
lium. Ala (21)
73. *Axillare* Folium (subalare) quod ad rami exi-
tum inseritur.
74. *Axillaris* Pedunculus, ex ala (21) scilicet inter
folium et ramum &c. ortus. *Dulcamara*.

B.

75. *Bacca*, Pericarpium (573) farctum evalve,
non dehiscens, semina nuda nidulantia (499)
continens, estque mono - di - tri , tetra - penta -
poly sperma.
76. *Barba* Corollae Ringentis (693) Labium (433)
inferius.
77. *Barba* Species Pubis (628) Pili (591) paral-
leli, unde :
78. *Barbatum* Folium, pilis parallelis obsitum.
79. *Bicapsulare* Pericarpium (573) tri multicapsu-
lare, a numero Capsularum. *Asclepias*. *Aconitum*.
Aquilegia.
80. *Bicornes*, dicuntur Plantae, quarum Corollae an-
theris cornutis instructae sunt. *Erica*, *Vaccinium*.

VIII NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

81. *Biennis* Radix. altero anno florens, & deinde emoritura *Cynoglossum*.
82. *Bifaria* Folia, ad latera rami opposita, tantum enata.
83. *Bifidum* Folium, tri-quinque-Multifidum Folium a numero Fissurarum. Species Fissi. (306)
84. *Biflora* Gluma (364) duos tantum Flores amplectens. *Aira*.
85. *Bigenimum* Folium, cum Petiolus dichotomus (238) apicibus adnectit foliola (323) quatuor..
86. *Bijugum* Folium *trijuga*, *quadrjuga*, *quinquejuga*, *sejuga* &c. Pinnatum (593) sed foliolis (323) tantum quatuor, sex, octo, decem, duodecim &c.
87. *Bilobum trilobum* &c. Folium, a numero loborum. Lobati (462) Species.
88. *Bilocularis tri-quadri-quinque-decem* locularis Capsula (119) a numero Loculamentorum (463)
89. *Bina* Folia-prout Terna, Quaterna, &c. Species verticillatorum (895)
90. *Binatum* Folium, *ternatum*, *quinatum*, est digitatum (247) foliolis tantum duobus, tribus, quinis.
91. *Bipartitum tri-quinque multipartitum* Folium, a numero Laciniarum (438) Partiti (557) species.
92. *Bipinnatum* Folium, f. Duplicato pinnatum, cum Petiolus (585) lateribus adfigit foliola pinnata. (593)
93. *Biternatum* Folium, f. Duplicato ternatum, cum Petiolus (585) adfigit tria foliola ternata (822)
94. *Bivalvis* Capsula, *tri-quadri*, *quinque* sex &c. valvis a numero valvarum (885) in quas dehiscit.
95. *Bivalvis* Gluma (364) duabus constans squamis.
96. *Brachiae*, arborum Rami crassiores.

97. *Brachiatus* Caulis, Ramos decussatim (224) oppositos habet.
98. *Brachium*, *Brachialis*, Mensura, ab axilla ad apicem Digiti intermedii. *Pedes duo*.
99. *Bractea*, Folium florale (311) Colore & Figura a ceteris foliis recedens. *Tilia*, *Fumaria bulbosa*.
100. *Bracteatus* Pedunculus, Bracteis (99) instructus.
101. *Brevis* Petiolus, longitudinem Folii non attingens.
102. *Brevissima* Filamenta (303) Corolla breviora.
103. *Brevissimus* Petiolus. (885) Folio multoties brevior.
104. *Bulbiferus* Caulis, Bulbos (106) gerens in axillis (72) Foliorum.
105. *Bulbosa* Radix, Bulbo (106) instructa.
106. *Bulbus*, Hybernaculum (387) Plantae (600) ex rudimentis foliorum praeteritorum.
107. *Bullatum* Folium, ex Rugoso (698) fit, rugis contractis, ab altera parte concavis.

C.

108. *Caduca* Corolla, Perianthium, ad explicationem Corollae mox decidens. *Thalicttrum*; *Altea*; *Chelidonium*; *Papaver*.
109. *Calucum* Folium, brevi decidens, nec per integram aetatem permanens.
110. *Calcar*, Nectarium (496) ex Corolla pone in Conum extensa. *Antirrhin*, *Linar*, *Orchides* unde *calcarata* Corolla.
111. *Calyculatum* Perianthium, s. auctum, quasi alio minore Calyce exterius ad basin cinctum. *Crepis* *Dianthus*.
112. *Calyptra* Calyx (113) Musci Cucullatus, antherae (41) superimpositus. (665) (513) (900)
113. *Calyx*, Cortex Plantae in fructificatione (331) praesens. Species septem numerantur. I. *Perianthium*

- thium* (572) II. *Involucrum* (427) III. *Gluma* (364) IV. *Amentum* (29) V. *Spatha* (756) VI. *Calyptra* (112) VII. *Volva*. (907)
114. *Campaulata* Corolla, Venricosa (890) absque Tubo (857) Limbo (456) dilatato. *Campaula*.
115. *Canaliculatum* Folium, supra longitudinaliter sulco profundo excavatum.
116. *Capillaris* Pappus (548) radiis seu pilis indivisis. *Crepis*.
117. *Capillus*, Mensura, est diameter Crinis. *Lineae pars duodecima*.
118. *Capitulum* constat Floribus pluribus in Globum ferme congestis. (249) (361) (804) (503) (324) (295)
119. *Capsula*, Pericarpium (573) membranaceum cavum, determinate Valvis (884) dehiscens. Constat *Valvis* (884) *Loculamentis* (463) *Dissepimento*, (259) *Seminibus* (712) *Proprio Receptaculo* (626) & *Columella* (149)
120. *Carina* Corollae Papilionaceae (545) constat duobus Petalis coadunatis, excipit & includit Stamina (771) Pistillaque (598)
121. *Carinatum* Folium si pars prona s. inferior Disci (257) prominat longitudinaliter. unde *Carina acuta*, *obtusa ciliata*, in foliolis Calycis, & valvis (95) Glumae. (364)
122. *Carnosum* Folium, interne pulpa solidiuscula succulenta repletum. *Sedum*.
123. *Cartilagineum* Folium, cujus margo Cartilagine a substantia folii diversissima firmatur.
124. *Castrata* Stamina (771) Antheris (41) destituta *Geranium*. *Herniaria*.
125. *Cauda* Filum nudum (*Geum urban.*) s. plumosum (*Clematis vitalba*). Semen terminans. unde :
126. *Caudata* Semina dicuntur.

127. *Caudex* dicitur Arborum Truncus. (850) estque adscendens, s. descendens, (Radix)
128. *Caulescens* Planta, Caule instructa. Opposita Acaulis (4)
129. *Caulinum* Folium, Cauli (132) non Ramo insertum.
130. *Caulinus* Bulbus (130) Cauli insidens. Axillis, *Dentaria*, *Lilium*. apice *Allium*.
131. *Caulinus* Pedunculus, e Caule, non ex ramo ortus.
132. *Caulis*, Truncus (850) proprius Herbae (375) elevat folia, fructificationemque. (331)
133. *Cernuus* Pedunculus, cum apice incurvatur, (402) ut Flos versus latus vel Terram nutet. *Bidens cernua*.
134. *Cespitosa* Planta, cum multi caules ex eadem Radice simul prodeunt.
135. *Ciliatum* Folium, cujus margo (473) setis parallelis longitudinaliter obvallatur. Basi ciliata folia *Thymus*, *Serpillum*.
136. *Circinalia* Folia, *Vernatio*, s. *Spiralia*, quum Folia deorsum spiraliter involvuntur. *Filices*.
137. *Circumscissa* Capsula, (119) quae maturo fructu horizontaliter discedit. *Anagallis*. *Lysimachia*. *Plantago*.
138. *Circumscriptio* Folii, considerat Peripheriam Fol. simplicis, absque sinubus (745) & angulis. (36) idem ac Figura. (805) (533) (527) 529 516. &c.
139. *Circumsepiens* somnus, (752) cum Folia (alias horizontaliter posita) noctu eriguntur in formam Infundibuli (412)
140. *Cirrhosum* Folium, quod terminatur Cirrho (142)
141. *Cirrhosum pinnatum* Folium, est Pinnatum (693) terminatum Cirrho (142)
142. *Cirrhus*, est Vinculum filiforme spirale, quo Planta alio Corpori alligatur.

XII NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

143. *Clavatus* Pedunculus , Clavaeformis s. versus apicem sensim incrassatus. (400)
144. *Coadunata* Folia, quae invicem annectuntur, ut plura inter se basi concrecant.
145. *Coalitae* antherae (41) idem ac connatae. (179)
146. *Coarctata* Panicula (543) s. *contracta*, cum Pedicelli (561) culmo approximantur.
147. *Coarctati* Rami, (650) versus summitatem fere incumbentes.
148. *Colorata* Folia, & omnes partes Plantae (excepta Corolla) dicuntur, quae alium colorem quam viridem induunt.
149. *Columella*, Capsulae (119) pars, connectens parietes (259) internos cum seminibus.
150. *Coma* constat Bracteis (99) quae Caulem terminant magnitudine insignes *Fristillar Coron. Imper.*
151. *Commune* Perianthium (572) plures flores congregatos continens cingensque.
152. *Commune* Receptaculum (661) plures flores eorumque fructus connectens.
153. *Communis* Gemma (344) flores & folia includens.
154. *Communis* { Pedunculus, pluribus floribus communis.
 { Petiolus plura quam unum adnectens folia.
155. *Compactum* Folium, substantia solida constans.
156. *Composita* Corolla, pluribus constans flosculis intra commune Perianthium (151) supra Receptaculum commune. (152)
157. *Composita* Fructificatio, (331) pluribus flosculis confluentibus.
158. *Composita* Spica (759) pluribus spicillis (760) pedunculo insidentibus.
159. *Composita* Umbella (862) omnibus pedunculis apice Umbellulas (863) gerentibus.
160. *Compositum* Folium, Petiolo (154) plura quam unum proferente folia, secundum Gradus (367) compositionis. a. compo-

a. *composita* (61. 120. 247. 90. 160. 593. 86.)

b. *decomposita* (218)

c. *supradecomposita* (814)

161. *Compositus* Caulis, in ramulos subdivisus, deliquescentis ascendendo.

162. *Compositus* Flos, (156) Receptaculo (152) dilatato integro flosculis sessilibus antheris connatis. *Syngenesia*. Estque 1. *Ligulatus* (455) 2. *Tubulosus*. (855) 3. *Radiatus*. (638)

163. *Compositus* Pappus (548) Radiis s. pilis ramosis (659) (605) instructus.

164. *Compositus* Racemus, (635) ramosus s. divisus in plures.

165. *Compressa* Siliqua (729) lateribus oppositis proxime ad se invicem accedentibus.

166. *Compressum* Folium, est Pulposum (630) lateribus magis quam disco (257) complanatis.

176. *Compressus* Caulis, duobus lateribus oppositis fere planis.

168. *Concavum* Folium, Margine Disco (257) arcuatiore, ut deprimatur Discus.

169. *Conceptaculum*, Folliculus, (326)

170. *Conduplicans* Somnus. (752) quando foliola sibi invicem ut libri folia approximantur, superiorem paginam regentia

171. *Conduplicata* a) Vernatio (891) b) Folia, cum folii latera *parallela* (*) sibi invicem approximantur. *Quercus*; *Corylus*; *Carpinus*; *Fagus* &c

172. *Conferta* Folia, cum ita copiosa, ut ramos occupent totos, vix relicto spatio

173. *Confertus* verticillus. (897). pedunculis approximatis.

174. *Confluentia* Folia, ad basin inter se cohaerentia.

175. *Conglomerati* Flores s. Pedunculi, cum Pedunculus ramosus flores ferat brevissimis pedicellis, absque ordine arte congestos & compactos. *Dactyl. glomer.* 176.

(*) *Lineae parallelae* sunt rectae, aequali ubique spatio se iunctae. *Geometr.*

XIV NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

176. *Conicum* Receptaculum (661) teres (816) versus apicem attenuatum.
177. *Connata* filamenta (303) in unum corpus coacta *Monadelphia*.
178. *Connata* folia, si opposita (524) paria basi utrinque inter se coadunantur.
179. *Connatae* Antherae, (41) in unum Corpus concretae *Syngenesia*.
180. *Conjugatum* Folium, Pinnatum (593) foliolis binis lateralibus, nec pluribus.
181. *Connivens* Corolla, cujus Limbi (456) lobi apicibus convergunt.
182. *Connivens* Somnus (752) quando duo folia opposita, pagina (534) superiore tam arcte ad se mutuo applicantur, quasi unicum esset Folium.
183. *Contorsio*. v. *Torsio* (830)
184. *Contortum* Pericarpium (173) cum Spiraliter contorquetur. *Medicago*. *Spirea*. *Ulmaria*.
185. *Convexum* Folium, Margine Disco (257) arctiore instructum, ut elevetur discus.
186. *Convoluta* Folia, Vernatio. (891) cum unius lateris margo ambit alterum ejusdem folii marginem instar cuculli. (204)
187. *Convolutus* Cirrus, (142) in annulos contortus.
188. *Corculum*, novae Plantae primordium intra semen, constat Plumula (606) & Rostello. (695)
189. *Cordato-oblongum* folium, oblongum (516) angulis posticis obtusissimis, basi excavatum.
190. *Cordato-lanceolatum*, lanceolatum (447) angulis posticis obrusis, basi excavatum.
191. *Cordato-sagittatum*, sagittatum (700) marginibus versus angulos convexis.
192. *Cordatum* Folium, Ovatum (533) basi sinu (745) excavatum, angulis posticis destitutum.
193. *Corolla* Liber (albuminum) Plantae (600) in flore (316) praefens, estque Monopetala (485) Tubo (857) & Limbo, (456) vel Polypetala (611) Ungue (868) & Lamina (443) constans.

194. *Corollula* est Compositi floris (162) Corolla partialis.
195. *Corona*, *Coronula* Seminis, Calyculus supra adhaerens, quo volitat. *Scabiosa*, *Dipsacus*.
196. *Coronata* Semina, quae 1) Pappum (548) (*Hieracium*, *Crepis*, *Picris*) vel 2) Perianthium parvum, (195) (*Scabiosa*) vel 3) Setas hispidas (*Bidens*) supra adfixa habent.
197. *Corticalis* Gemma (344) e corticis ramentis confecta.
198. *Corymbus* fit ex Spica, (759) dum singuli flores pedunculis propriis instruuntur, situ elevato proportionali. *Tetradynamia*.
199. *Cotyledon*, Corpus laterale seminis (712) bibulum Caducum, unde *Acotyledones* (8) *Monocotyledones*, (482) & *Dicotyledones*, (241)
200. *Crenatum* Folium, margine incisuris sine respectu extremitatis secto. unde *acute - obtuse crenatum duplicato crenatum*, crenis iterum crenatis.
201. *Crispum* Folium, margine luxuriante, ut *Difcus* (257) evadat major. sua *Rachi* (637. b) omnia folia crispa sunt monitrosa. *Malva crispa*, *Lepid. nasturt.*
202. *Cruciformis* s. *Cruciata* Corolla, Petalis (581) quatuor aequalibus patens. *Tetradynamia*.
203. *Cubitus*, *Cubitalis*, Mensura, a flexura Cubiti ad extimum apicem Digiti intermedi. *Unciae septendecim*.
204. *Cucullatum* Folium, lateribus ad basin conniventibus, apice vero dilatatis.
205. *Culmus*, Truncus (850) Graminibus proprius, elevat Folia fructificationemque, plerumque geniculatus (348) Articulis inanibus. Europaei annui (39) omnes.
206. *Cuneiforme* s. *cuneatum* Folium, sensim versus basin angulatum.
207. *Cuneiforme emarginatum* Folium, (206) apice sinu excavatum.

208. *Cuspidatum* Folium, terminatum apice setaceo rigidiusculo.
 209. *Cyathiformis* Corolla, cum ex cylindro (*) superne parum dilatata est.
 210. *Cylindrica* Spica (759) cylindriformis f. tereiuscula, secunda verò dimidiata.
 211. *Cyma*, Receptaculum omnes pedunculos primarios ex Centro eodem universali educens, partiales vero vagos spargens. V. *Opulus*.

D.

212. *Daedaleum* Folium, una flexuosum lacerumque (435)
 213. *Decidua* Corolla, cum floris casu. *Pleraeque*.
 214. *Deciduum* Folium, peracta unica aestate casurum.
 215. *Declinatum* Folium, deorsum flexum instar Carinae Naviculae.
 216. *Declinatus* Caulis, arcuatim descendens.
 217. *Decomposita* Umbella (862) f. *Prolifera*, si ex umbellula (863) simplici, aliae enascuntur umbellulae. Gradu iterum aucto dicitur *supradecomposita*.
 218. *Decompositum* Folium, cum Petiolus semel divisus adnectit foliola (323) plura. (85. 93. 92)
 219. *Decompositus* Flos, compositus (162) ex *compositis*, continet intra Calycem communem (151) minores Calices, communes multis floribus. *Spatranthus*.
 220. *Decumbens* Caulis, procumbens (618) altiore basi.
 221. *Decurrens* Folium, basi folii deorsum per caulem extensa. *Carduus* V. *Thapsus*.
 222. *Decurrens* Petiolus, lateribus deorsum per caulem vel Ramum extensis
 223. *Decursive pinnatum* Folium, Pinnatum (593) foliolis (323) decurrentibus (221) per petiolum.
 224. *Decussata* Folia, ita opposita (524) disposita, ut rami apice inspecto, quatuor ordines referant.

225.

(*) *Cylindrus* oritur, circulo ad lineam rectam; motu parallelo, descendente *Geometr.*

225. *Deflexi* Rami, arcuatim deorsum inclinati.
226. *Defoliatio*, Tempus autumnale, quo Arbores folia dejiciunt.
227. *Debifcentia*, Tempus quo fructus maturus semina dispergit; fitque apice (*Cerastium*) basi (*Triglochin*) angulis (*Oxalis*) Poro, (*Campanula*) horizontaliter (137) vel articulare. (59)
228. *Deltoideum* Folium, Rhombeum (694) ex quatuor angulis, quorum laterales minus a basi distant, quam reliqui.
229. *Demersum* Folium, quod intra aquae superficiem absconditur.
230. *Dentata* Radix, moniliformis, ex articulis concatenatis.
231. *Dentato Sinuatum*, Dentatum (232) Sinubusque excavatum.
232. *Dentatum* Folium, quod acumina horizontalia, folii consistentia, spatio remota habet.
233. *Dependens* Folium, quod recta terram spectat.
234. *Dependens* Somnus (752) foliolis demissis.
235. *Depressum* Folium, Pulposum (630) Disco (257) magis quam lateribus complanato.
236. *Determinatio* Foliorum (317) non a propria Structura, sed a loco (465) Situ (746) Insertione (413) & Directione (255) s. Expansione, desumitur.
237. *Dextrorsum* (743)
238. *Dichotomus* Caulis, bifariam semper divisus.
239. *Diclinia*, Flores masculi (476) & feminei (300) in eadem specie, sed distinctis Thalamis, gaudentes. Comprehendit a. *Monoecciam* b. *Dioeciam* & c. *Polygamiam*.
240. *Dicocca* Capsula (242)
241. *Dicotyledones*, foliis feminalibus duobus sub seminis germinatione *Plantae*. (600)
242. *Didyma* s. *Dicocca* Capsula, duobus nodis extus gibba. *Didyma* Anthera, duobus globulis distinctis, latere connatis. *Mercurialis*.

XVIII NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

243. *Difformia* Folia, si in eadem planta variant figura. *Ranuncul* ▽. *Rudbeck* lacin.
244. *Difformis* Corolla, Irregularis (430)
245. *Diffusa* Panicula (549) cum laxè divaricantur pedicelli (661) angulis rectis s. obtusis (12. in not.)
246. *Diffusus* Caulis, Ramis absque ordine patentibus.
247. *Digitatum* Foliū, cum Petiolus simplex, seu indivisus, adnectit foliola (323) plura.
248. *Dimidiata* Spatha (756) latere tantum interiore fructificationem (331) obvestiens.
249. *Dimidiatum* Capitulum (118) ab altero latere rotundum, ab altero planum.
250. *Dimidiatum* Involucellum (425) extrorsum situm, estque patens vel dependens. *Aethusa*.
251. *Dioica* Planta, quae flores masculos (476) & femineos (300) in distincto individuo profert. *Dioecia*.
252. *Diphyllus* Pedunculus, foliolis duobus oppositis instructus.
253. *Diphyllum* Perianthium (486)
254. *Dipetala* Corolla (485)
255. *Directio*, fol. (236) est expansio, quam Folia a basi ad apicem adquirunt. (288. 791. 49. 385. 158. 410. 662. 514. 682. 667. 688. 233. &c.)
256. *Discus* Floris, in composito radiato, (638) pars media, ex corollulis (194) minoribus regularibus (672) constat.
257. *Discus* Folii s. Pagina (534) dicitur folii superficies, (811) superior, plerumque coelum spectans.
258. *Dissectum* Folium, Laciniatum (438) Incisum (398)
259. *Dissepimentum*, Paries quo Fructus (119. 573. 729) interne distinguitur in concamerationes (463) plures.
Parallelum (887) *contrarium* (886)
260. *Distans* Verticillus (897) pedunculis remoris.

261. *Disticha* Folia, duo latera rami tantum respicientia, licet undique inserta.
262. *Disticha* Spica (759) floribus ad utrumque latus spectantibus, unde *tetrasticha*, *hexasticha*, a numero ordinum.
263. *Distichus* Caulis, Ramos firu horizontali, nec decussatim (224) viros, exserit.
164. *Distinctae* Antherae (41) inter se non cohaerentes.
- * 265. *Divaricata* Panicula (543) cum striete divaricantur pedicelli ad angulum obtusum f. rectum. (12. in not.)
266. *Divaricati* Rami, a trunco ad angulum obtusum discedentes.
267. *Divergens* Somnus, (752) si foliola basi approximantur, apicibus vero patent.
268. *Divergentes* Rami, a trunco ad angulum rectum discedentes.
269. *Dodrans*, *dodrantal* (Mensura) est spatium inter apicem Pollicis & Indicis extensum. *Unciae septem*.
270. *Dolabriforme* Folium, Compressum (166) subrotundum (805) extrorsum gibbum (353) acie acuta, inferne teretiuscula.
271. *Dorsalis* Arista (54) lateri exteriori Glumae (364) adfixa.
272. *Drupa*, Pericarpium (573) farctum evalve, continens Nucem (511) estque *Sicca* (727) vel *Succulenta* (808)
273. *Duplicato crenatum* Folium, (100)
274. *Duplicato pinnatum* Fol. (92)
275. *Duplicato serratum* Fol. (720)
276. *Duplicato ternatum* Fol. (93)
277. *Duratio* Foliorum, respicit Tempus a frondescencia (328) usque ad casum eorum. (214. 109. 577-569. 718.)

E.

278. *Ebracteatus* Pedunculus. Bracteis (99) destitutus, d 2 279.

279. *Echinatum* Pericarpium, (573) cum aculeis (14) seu Spinis (761) undique adspersum.

Datura Stramon

280. *Efflorescentia* est Tempus Mensis, quo singulae species Plantarum primos Flores ostendunt.

281. *Ellipticum* Folium, Lanceolatum (447) latitudine Ovati (533) folii.

282. *Emarginatum* Folium, quod terminatur Crenna. Unde *acute*, *obtusè* emarginatum.

283. *Enerve* Folium, Nervis destitutum, Nervoso (497.) oppositum.

284. *Enodis* Culmus, qui continuus est, nec articulis (65) interceptus.

285. *Ensiforme* Folium, anceps (31) a basi ad apicem sensim attenuatum.

286. *Equitantia* Folia. Vernatio. Marginibus conniventia (182) situ opposito, ut alterum includat alterum. *Acorus. Carex. Iris.*

287. *Erecta* anthera (41) quae basi adfigitur filamento (303)

288. *Erectum* Folium, s. caulis fere ad perpendicularium constitutus.

289. *Erectus* Culmus, situ subperpendiculari, articulis infimis saepe obliquis.

290. *Erosum* Folium, sinuatum (744) sinubus minimis obtusis laciniisque inaequalibus instructum.

291. *Extrafoliacei* Pedunculi, s. Stipulae (781) infra folium collocatae.

F.

292. *Farctum* Folium, medulla farctum, non tubulosum (856)

293. *Fascicularis* Radix, e partibus carnosis basi sessili connexis

294. *Fasciculata* Folia, plura ex eodem puncto prodeuntia *P. Larix.*

295. *Fasciculus*, Capitulum (118) colligens flores erectos parallelos fastigiato - approximatos.

Dianth. barb.

296. *Fastigiati* Flores, Fasciculus (295) floribus omnibus aequalis altitudinis.
297. *Fastigiatus* Caulis, Ramis omnibus aequali altitudine.
298. *Faux* Corollae, hiatus inter lacinias (437) Corollae Ringentis, (693) ubi tubus (857) terminatur.
299. *Femina* Planta (600) quae flores tantum femineos (100) profert.
300. *Femineus* Flos, qui Pistillum (598) absque staminibus (771) habet.
301. *Feminina* Genitalia (350) sunt Stigmata (775) germinibus (351) ubique adnexa.
302. *Fibrosa* Radix, tota constans filamentis simplicibus vel Ramosis.
303. *Filamentum*, pars Floris (316) elevans adnectensque antheram. (41)
304. *Filiforme* Folium, longissimum latitudine & crassitie aequali.
305. *Filiformis* pedunculus, aequabili ubique crassitie.
306. *Fissum* Folium, divisum sinibus (745) linearibus, marginibus rectis. *bi-tri. quinque multifidum.* (83)
307. *Fistulosus* Caulis, interne tubulosus non factus (292)
308. *Flaccidus* Pedunculus, debilis, ut a proprio floris pondere dependeat.
309. *Flexuosus* Caulis, a Gemma (344) ad Gemmam horsum vorsum actus.
310. *Flexuosus* Pedunculus, a flore ad florem flexus. *Aira flexuosa.*
311. *Florale* Folium, Flori proximum: differt numero & figura.
312. *Floralis* Gemma (344) flores non folia continens.
313. *Florescentia* est Generatio, sistens Plantarum sponsalia in flore, & Nuptias in Anthesi (43)

XXII NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

314. *Floris* Perianthium s. Calyx, Stamina continet absque Germine.
315. *Floris* Receptaculum, basis, ubi floris partes absque Germine adfiguntur.
316. *Flos*, Constat Calyce, Corolla (193) Stamine (771) & Pistillo (198) antecedit omnem fructum, ut Generatio Partum.
317. *Folia*; Organa motus Plantae (600) considerantur secundum a) Simpliciter, (734) b) Compositionem, (160) c) Determinationem, (296) & Durationem (277)
318. *Foliacea* Spica (759) foliis interstincta.
319. *Foliaris* Cirrhus, (142) folio insidens.
320. *Foliaris* Gemma (344) Folia continens, non flores.
321. *Foliatio*, Vernatio. (891)
322. *Foliatus* Caulis, foliis instructus.
323. *Foliolum*, partiale est Folii compositi. (160)
324. *Foliosum* Capitulum, (118) foliis intermixtis floribus.
325. *Folium* (325) expandens per aëra superficiem: attrahit præparatque humores, volatile, a casu nunquam renasciturum.
326. *Folliculus*, (169) Pericarpium, (573) membranaceum univalve, altero latere longitudinaliter dehiscens, proprio Receptaculo (nec futurae) semina adfigens. *Asclepias*.
327. *Fornicata* Corolla, dicitur si labium superius Ringentis (693) fornicis in modum arcuatum. *Galeopsis. Lamium*.
328. *FronDESCENTIA*, est Tempus aestatis, quo species singulae plantarum prima folia explicant.
329. *Frons*, ex Stipite (777) in folium transeunte facta, fructificationes in averfa folii parte, gerens. *Filices*.
330. *FruCTESCENTIA*, comprehendit tempus, quo Semina matura dispergunt Plantae.

331. *Fructificatio*, Vegetabilium pars temporaria, generationi dicata, estque simplex (735) vel composita. (157)
332. *Fructificationis* partes, septem numerantur 1) Calyx (113) s. Perianth. 2) Corolla (193) 3) Stamen (771) 4) Pistillum, (598) 5) Pericarpium (573) 6) Semen (712) & 7) Receptaculum. (661)
333. *Fructificationis* Calyx s. Perianth. Germen (351.) Staminaque includens.
334. *Fructificationis* Receptaculum, (661) pro flore & fructu commune.
335. *Fructus* Perianthium, (572) s. Calyx, Germen absque Staminibus (771) continens.
336. *Frutex*, Caudex perennis supra terram adscendens absque Gemmis (344)
337. *Fruticosus* (336) Caulis, perennis, cum caudicibus pluribus.
338. *Fulcra*, adminicula Plantae (600) pro commodiore sustentatione. Septem numerantur species: 1) Stipulae (781) 2) Bractea (99) 3) Pubes (628) 4) Glandula (356) 5) Spina (761) 6) Aculeus (11) 7) Cirrhus. (142)
339. *Fulcrati* Rami fulcris instructi.
340. *Furcatae* Serae (726) Ramosae s. subdivisae quasi in ramulos. *Leontodon hispid.* *Arabis thal.*
341. *Furcae*, aculei (11) ramosi s. triplices. *Berberis*, *Ribes*. *uva-cr.*
342. *Fusiformis* Radix, (648) Simpliciuscula, oblonga, crassa, versus basin sensim attenuata. *Daucus*.

G.

343. *Galea*, Corollae ringentis (699) labium superius.
344. *Gemma*, Hybernaculum (387) Plantae, (600) ex rudimentis foliorum futurorum.

345. *Gemmatio*, est Gemmae (344) constructio, ex Foliis, Stipulis (781) Petiolis (585) aut Squamis.

346. *Gemmina* Folia, Trina, quaterna, &c. duo, tria, quaterna &c. ex eodem puncto prodeuntia.

347. *Geniculata* Arista (54) articulatione instructa. *Agrost. canina*.

348. *Geniculatus* Culmus, geniculis (349) interceptus.

349. *Genicula* Nodi, in culmo (205) Articulis (65) interjecti.

350. *Genitalia* Plantarum, Organa sexualia, Stamina (771) & Pistilla (598. 301. 475)

351. *Germen*, Rudimentum Fructus immaturi in flore; estque inferum (407) vel superum (812)

352. *Germinatio* est Tempus quo Semina Terrae mandata, eadem excludunt, in Cotyledonum (199) proventum.

353. *Gibbum* Folium, utraque superficie (811) convexa, (185) mediante copiosiori pulpa.

354. *Glaber* Caulis, superficie laevi & lubrica.

355. *Glabrum* Folium, Disco (257) laevi & lubrico, absque omni inegalitate.

356. *Glandula*, Papilla humorem excernens, estque sessilis vel stipitata.

357. *Glandulatio*, Vasa secretoria offert, Glandulae (356) & Utriculi, (879)

358. *Glandulosum* Folium, quod Glandulas (356) insidentes gerit, vel in dorso, vel in ferraturis. *Salix*.

359. *Globosa* Corolla, Sphaerica, Globum referens. *Vaccin. Myrtillus. R. Convallar.*

360. *Globosa* Radix, subrotunda, carnosa, radicalibus lateralibus. *Bunium*.

361. *Globosum* Capitulum (118) ab omni parte rotundatum. *Echinops*.

362. *Glochides*, mucrones apice retrorsum multidentati.

363. *Glomerata* Spica (759) Spicillis (760) varie congesta.
364. *Gluma*, Calyx (113) Graminis, valvis amplexantibus.
365. *Glutinositas*, est qualitas humoris lubrici.
366. *Glutinosum* Folium, humore lubrico (365) illitum.
367. *Gradus* foliorum, in Compositis (160) considerant subdivisionem Petioli communis (154) in Compositis (160) Decompositis (218) & Supradecompositis (814).
368. *Graminea* Folia, linearia (458) sensim versus apicem angustata. Constant folio, vagina (880) & ligula (453)
369. *Granulata* Radix, particulis sphaericis carnosis adspersa. *Saxifraga*.
370. *Gymnosperma* Planta, Semina nuda, nec Pericarpio (573) tecta. Gymno mono-di-tri-tetrasperma. *Didynamia Gymnosperm.*

H.

371. *Habitationes* Plantarum, ex loco ubi sponte prognascuntur, respiciunt solum s. Telluris naturam.
372. *Habitus*, est conformitas Vegetabilium, affinium & congenerum, in Placentatione, Foliatione &c.
373. *Hami*, mucrones acuminati, curvati, quibus quasdam Plantarum partes adhaerent animalibus praetereuntibus. *Artium*.
374. *Hastatum* Folium, Sagittatum (700) angulis posticis acutis sinu divisis, ad latera prominentibus, patulis. *Rumex acetosella*.
375. *Herba* est, cujus caulis singulis annis perit: estque a) annua, b) bima s. biennis seu c) sempervivens. Constat Hybernaculo (387) Trunco, (850) Folio, (325) & Fulcro. (338)

376. *Herbanium*, Collectio Plantarum intra chartas siccatarum asservatarumque, omni Botanico necessarium.
377. *Herbaceus* Caulis, etiamnum annuus, non lignosus.
378. *Hermaphrodita* Planta, quae flores tantum Hermaphroditos [381] gerit.
379. *Hermaphrodita* [polygamiae] Flos, quorum antherae non dehiscunt, sed decidunt, & Pistillum mox in fructum, ab antheris alterius floris [380] foecundatum, excrescit. A parte masculina sterilis dicitur. *Acer*.
380. *Hermaphroditus* [Polygamiae] Flos, quorum antherae pollen pluunt, Pistilla vero ob labem Stigmatis non accrescunt, sed decidunt, a parte feminea sterilis dicitur. *Acer*.
381. *Hermaphroditus* Flos, Pistillo [598] Stigmatibus 775] & Antheris [41] instructus.
382. *Heteromalla* Panicula, Secunda. [710]
383. *Hilum*, cicatrix externa Seminis, ab ejusdem adfixione in fructu.
384. *Hispidum* Folium, fetis rigidis adpersum.
385. *Horizontale* Folium, quod ad Angulum re-
ctum (12. in not.) a Caule discedit.
386. *Horizontalis* Radix, quae sub terra transversim extenditur. *Iris*.
387. *Hybernaculum*, Compendium Herbae [375] totius, squamosum. Estque Bulbus [106] vel Gemma. [344]
388. *Hybrida* Planta. Polygama. [610]
389. *Hypocrateriformis* Corolla. Limbus Limbus [456] planus tubo [857] impositus.

I.

390. *Imbricans* Somnus, [752] foliolis imbricatis [391] complicatis.
391. *Imbricata* Folia, quando parallele superficiei recta sibi invicem incumbunt, & se quo ad partem

- rem tegunt. *Vernatio* (872) imbricata. *Syringa*.
Lygustrum. *Daphne*.
392. *Imbricatum* Perianthium [572] squamis variis imbricatum [391] superimpositis *Hieracium*.
393. *Imbricatus* Caulis, squamis reclusus, ut superficies non appareat.
394. *Inanis* Caulis, interne medulla Spongiosus.
395. *Inaequalia* Filamenta, [303] aliquot majoribus vel minoribus. *Daphne*. *Didynam*.
396. *Inaequalis* Corolla, ubi partes non magnitudinis, sed proportionem respondent, ut Regularis flos evadat. *Butomus*.
397. *Incana* Folia, Tomentosa, [827] colore glauco, s. fere argenteo.
398. *Incisum* Folium, Laciniatum. [438]
399. *Includens* Somnus, [752] cum folia alterna [17] noctu se cauli approximant.
400. *Incrassatus* Pedunculus, apice semper majorem molem acquirens.
401. *Incumbens* Anthera, s. Versatilis, quae latere filamento [303] adfigitur.
402. *Incurvati* Rami, introrsum nutantes.
403. *Incurvum* Folium [410]
404. *Incurvus* Aculeus, [11] introrsum flexus.
405. *Indivisum* Folium, integrum [416] Sinubus (745) destitutum.
406. *Inerme* Folium, Spinis [761] aculeis [11] & Stimulis [776] destitutum.
407. *Inferum* Germen [351] infra Corollam positum.
408. *Inferus* Flos, s. Calyx, cui Germen [351] supra Receptaculum, [661] s. cujus Pistillum abest in fructum. *Tourn*.
409. *Inflatum* Perianthium, instar Vesicae cavum. *Cucub*. *Behen*.
410. *Inflexum* Folium, s. incurvum, dum sursum arcuatur versus caulem.

XXVIII NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

411. *Inflorescentia*, est modus, quo Flores Pedunculo Plantae adnectuntur: 1] Verticillus [897] 2] Capitulum [118] 3] Spica, [759] 4] Corymbus (198) 5] Thyrsus (826) 6] Racemus (635) 7] Panícula. (143)
412. *Infundibuliformis* Corolla, si limbus (456) conicus tubo (857) impositus.
413. *Insertio* Foliorum, respicit modum, quo folia Plantae adnectuntur. (584. 567. 721. 13. 144. 30. 171. 178. 882.)
414. *Insertus* Petiolus, perpendiculariter ramo insidens.
415. *Integer* Caulis, simplicissimus (742) ramis angustatis.
416. *Integrum* Folium, indivisum (405) omnique sinu (745) destitutum.
417. *Integerrimum* Folium, margine continuo nec minimum secto.
418. *Interfoliacei* Pedunculi, inter Folia opposita, sed alternatim collocati. *Asclepias*.
419. *Internodum* (65) quod inter artus vel Genicula (349) medium intercedit. Estque convexum, concavum, vel planum.
420. *Interrupta* Spica (759) Spicis minoribus alternis distantibus.
421. *Interrupte Pinnatum* Folium, seu *Foliolis ruptis*, Pinnatum (593) foliolis alternis minoribus.
422. *Intorsio* v. *Torsio*. (830)
423. *Intrafoliaceae* Stipulae (781) supra folium s. petiolum collocatae.
424. *Invertens* Somnus (752) foliolis demissis & simul inversis.
425. *Involucellum*, est parziale Involucrum (427) umbellulae (863) subiectum. (260)
426. *Involucratus* Verticillus (897) s. umbella (862) involucro (427) instructus. Oppositus *Nudo*.
427. *Involucrum*, Calyx (118) umbellae (862) a flore remotus. Est mono-di-tri-penta-polyphyllum, vel nullum.

428. *Involuta* Vernatio, (891) Folia, quorum margines laterales utrinque introrsum spiraliter involvuntur. *Pyrus. Malus. Populus.*
 429. *Involvens* Somnus (752) quando foliola erecta apice connivent, & cavitatem inter se formant.
 430. *Irregularis* Corolla. (Difformis, Anomala.) Limbi (456) partibus, figura, magnitudine, & proportionem diversis. *Aconitum.*
 431. *Isthmis interceptum* Legumen (452) interne transversim in varia loculamenta (463) divisum.

L.

432. *Labiata* Corolla, Ringens (693) bilabiata. Labium super. & inferius.
 433. *Labium* s. Barba (76) Corollae, pro ringentis (693) labio inferiore saepe sumitur.
 434. *Lacera* Corolla, cujus limbus (456) tenuissime dissectus est.
 435. *Lacerum* Folium, margine varie divisum: Segmentis difformibus.
 436. *Laciniae* Calycis s. Perianthii, numerantur praesertim in monophyllo. (486)
 437. *Laciniae* Corollae, numerus in Monopetala (486) a medio limbi (456) in Polypetala (611) laminae (443) desumitur.
 438. *Laciniatum* Folium, varie & indeterminate in partes sectum.
 439. *Lactescens* est copia Liquoris, qui effluit laesa planta, estque alba (*Euphorbia*) lutea (*Chelid.*) vel rubra. (*Rumex Sangu.*)
 440. *Lacunosum* Folium, Disco (257) depresso (235) inter venas interjectas. *Lich. pulmon.*
 441. *Laevis* Caulis, folium, superficie aequali
 442. *Lamellae*, membranae transversae fructificantes, Pileo (586) Fungorum subtus adnatae.
 443. *Lamina*, Corollae Polypetalae (611) pars superior patula.

444. *Lana* Species Pubis, (628) Pili (591) curvi denfi, fervat plantam ab aestu nimio. *Stachis german.*
445. *Lanatum* Folium, pilis incurvatis imbricatis, quasi tela araneae indutum. *Salvia.*
446. *Lanceolato* - ovatum Folium, Lanceolatum (447) ad ovatam (533) figuram subaccedens.
447. *Lanceolatum* Folium, oblongum (516) ab utraque Extremitate attenuatum.
448. *Laterales* Stipulae, (781) Lateribus Petioli seu foliorum inserti.
449. *Laterifolii* Pedunculi, ad latus baseos folii inserti. *Solanum.*
450. *Laxa* Panicula (543) Pedicelli debiles, libere & laxe sine ordine Sparfi.
451. *Laxi* Rami, libere in arcum flexiles.
452. *Legumen*, Pericarpium (573) membranaceum bivalve, adfigens semina secundum futuram alteram tantum, estque 1) uni - 2) biloculare 3) vel Isthmis interceptum. (431) 1) *Vicia*. *Pisum.* 2) *Astragalus.*
453. *Ligula*, membrana tenuis Oris foliorum, in graminibus, estque truncata, lanceolata. bifida. fissa &c.
454. *Ligulata* Corolla, simplex, tubo brevi, limbo (456) plano extrorsum vero, apice acuto, vel truncato tri s. quinquedentato.
455. *Ligulatus* Flos, compositus (162) Corollulis flosculorum omnibus planis imbricatis versus exterius latus expansis. (454)
456. *Limbus* Corollae monopetalae (485) pars superior dilatata.
457. *Linea* Linearis mensura, est Lunulae longitudo, ab unguis radice versus unguem extensa. (non vero in Pollice.) *Linea una.*
458. *Lineare* Folium, aequali ubique latitudine, interdum utraque extremitate angustatur.

459. *Lineari-lanceolatum* Folium, Lineae (457)
ad lanceolatam (447) figuram accedens.
460. *Lineatum* Folium, nervis depressis excavatum,
Euphrasia.
461. *Lingulatum* f. *Linguiforme* Folium, lineare
(458) Carnosum (122) subrus convexum. (185)
462. *Lobatum* Folium, usque ad medium in par-
tes stitantes divisum, unde biloba - triloba - &c.
a numero Loborum.
463. *Loculamentum* Capsulae (119) Concameratio
lava, pro seminum loco.
464. *Loculare* (88) Pericarpium, uni - bi - tri - qua-
dri - quinque &c. loculare, a numero loculamen-
torum.
465. *Locus*, in Determinatione (236) Folii, respi-
cit partem plantae, qua folia adnectuntur. (715.
640 129. 73. 311)
466. *Longus* Petiolus, longitudinem folii supe-
rans.
467. *Longissimus* Petiolus, aliquoties folii longitu-
dinem superans.
468. *Lucidum* Folium, quasi illuminatum.
469. *Lunatum*, *Lunulatum* Folium, subrotundum
(805) basi sinu excavatum, angulis posticis
acutis.
470. *Lyratum* Folium, transversim divisum in la-
cinias (438) quarum inferiores minores remo-
tioresve, terminalis maxima.

M.

471. *Maculatum* Folium, Colorati (148) Species.
Albo maculata, (*Trifol. repens*) nigro - maculata,
(*Arum Orchides*) rubro-maculatae. (*Ranunc. acris.*)
472. *Marcescens* Corolla, contabescens, nec deci-
dens. *Campanula. Orchis.*
473. *Margo*, est extrema ora folii ad latera, in-
tacto disco Folii. (763. 720. 677. 232. 200. 123.
135. 290. 435. 416)

474. *Mas* Planta, quae flores tantum masculos (476) profert.
475. *Masculina* Genitalia (350) sunt Antherae (41) Polline (607) repletae.
476. *Masculus* Flos, Si stamina (771) sine Stigmatibus (775) continet.
477. *Mediocris* Petiolus, longitudine folii.
478. *Membranaceum* Folium, quod inter utramque superficiem nulla evidenti pulpa scater.
479. *Membranatus* Caulis, Complanatus more folii.
480. *Mensura*, qua in Dimensione partium Plantae utimur: Capillus (117) Linea (457) Unguis Pollex (608) Palmus, (541) Dodrans (269) Spithama (767) Pes (579) Cubitus (203) Brachium (98) Orgya. (528)
481. *Monoclinia*, Flores omnes Hermaphroditi (381) s. Stamina (771) cum Pistillis (598) in eodem flore. Comprehendit Classes Plantarum a Monandria usque ad Polyadelphiam, inclusive.
482. *Monocotyledones*, unico Cotyledone (715) germinantes. Fruges. s. *Palmae*. *Gramina*. *Lilia*.
483. *Monogynia*, *Digynia*, *Trigynia* &c. id est Pistillo unico, duobus, tribus, &c. instructi flores. Numerus desumitur a basi Styli (796) si Stylus autem deficiat, (*Myriophyllum*) a numero Stigmatum calculus fit.
484. *Monoica* Planta, (*Androgyna*) quae flores masculos (476) & femineos (300) distinctos in eadem planta gerit. *Monoecia*.
485. *Monopetala* Corolla, s. Petalo unico constans. Staminibus (771) Semper Petalo insertis, exceptis Bicornibus. (80)
486. *Monophyllus* Calyx s. Perianth. unico foliolo absolutum, quoties monopetala (485) Corolla est, unde di-tri-tetra-penta-hexaphyllus, &c. a numero foliorum.
487. *Monosperma*, di-tri-tetra, penta-hexa polysperma capsula, a numero seminum quae includit.

488. *Monostachius* Culmus, unicam Spicam gerens.
Lolium.
489. *Mucronatum* Folium, terminatum mucrone
exstante.
490. *Multiflora* Gluma, (364) plures flores in-
cludens.
491. *Multivalvis* Gluma (364) pluribus quam
duabus Squamis constans.
492. *Muniens* Somnus, (752) dum Folia (an-
tea horizontaliter patentibus periolis) circum-
circa dependent, & quasi fornicem formant.
493. *Muricatus* Caulis, punctis subulatis mollioribus
adpersus.
494. *Mutica* Gluma, (364) Mucrone & Arista de-
stituta.

N.

495. *Natans* Folium, superficiei aquae incumbens,
f. innatans. *Potamogeton.*
496. *Nectarium*, Pars mellifera flori propria, est-
que proprium (625) vel Petalinum. (580)
497. *Nervosum* Folium, venis simplicissimis emi-
nentibus a basi ad apicem extensis.
498. *Neuter* Flos, qui neque Stamina (771) ne-
que Stylum (796) vel Stigma habet. *Corcopsis*,
Rudbeckia. (Radius)
499. *Nidulantia* Semina, per pulpam absque or-
dine Sparfa, in Baccis. (75)
500. *Nitidum* Folium, Glabritie lucente.
501. *Nodi* . . *Nodosus*, (349)
502. *Nucleus*, Pars edulis Fructuum, in ossea
Capsula, Nuce (511) recondita
503. *Nudum* Capitulum, (118) foliis & setis de-
stitutum.
504. *Nudum* Folium, Setis & Pilis (591) desti-
tutum.

XXXIV NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

- §05. *Nudum* Receptaculum, (661) superficie nec villis nec paleis (536) rectum.
 §06. *Nudus* Caulis, Foliis destitutus. *Cuscuta*. *Oppositus* Foliato (322.) & imbricato. (393)
 §07. *Nudus* Flos, caret Calyce, non Corolla.
 §08. *Nudus* Verticillus, (897) nec bracteis (99) nec Involucro (427) instructus.
 §09. *Nutans* Caulis, apice extrorsum reflexus.
 §10. *Nutans* Flos, non proprio Pondere, sed peculiari structura Pedunculi, extrorsum reflexus. *Carduus Nutans*.
 §11. *Nux*, semen rectum epidermate ossea; uni f. bilocularis. Nucleum (502) condens.

O.

- §12. *Obcordatum*, Obverse cordatum. (521) (192)
 §13. *Obliqua Calyptra*, (118) ad aliquod Latus flexa.
 §14. *Obliquum* Folium, basi coelum, apice horizontem spectans.
 §15. *Obliquus* Caulis, a perpendiculari aut horizontali Linea discedens.
 §16. *Oblongum* Folium, Diametro (*) longitudinali aliquoties superante transversalem.
 §17. *Obovatum* Folium, obverse Ovatum. (533) (521)
 §18. *Obtuse Grenatum* Folium (200)
 §19. *Obtusum* Folium, intra segmentum (**) circuli terminatum.
 §20. *Obtusum* acumine, *Obtusum* (519) nervo medio apice prominulo.
 §21. *Obversa* Folia, quorum basis angustior evadit regione Apicis. Unde *Obverse Cordata* f. *Obcordata* (512) *Obverse Ovata* f. *Obovata*. (517.)

§22.

(*) Linea, quae ab uno extremitatis puncto ad aliud in circuli ambitu, per centrum vadit, *Diameter* dicitur. *Geometr.*

(**) Si circulum & ejus chordas duco pars ejus arcu uno & chorda comprehensa, sub *Segmenti* nomine venit. *Geometr.*

- §22. *Obvoluta* Foliatio, (891) cum margines alterni comprehendunt oppositi folii marginem rectum. *Lychnis. Saponaria. Scabiosa*
- §23. *Operculum* (Muscis) Membrana Antherae (41) Orificium supra ciliis claudens, calyptra (112) tota aut semitecta. Varias assumit figuras: obustum, conicum, subulatum, arcuarum, rectum & obliquum.
- §24. *Opposita* Folia, duo per paria decussatim e regione collocata.
- §25. *Opposite-pinnatum* Folium, Pinnatum (593) foliolis oppositis. (524)
- §26. *Oppositi-foliae* Stipulae, (781) in latere folii opposito collocatae.
- §27. *Orbiculatum* Folium, Periphæria (*) circinata, (Diameter (516) longitudinalis aequalis transversali.)
- §28. *Orgya, Orgyalis* Mensura, hexapoda s. humana altitudo, est Mensura inter manus expansas. *Pedes Sex.*
- §29. *Ovale* Folium, ex orbiculato (527) oblongum, (516) utraque extremitate rotundata aequali.
- §30. *Ovato lanceolatum* Folium, Ovatum (533) ad lanceolatam (447) figuram accedens.
- §31. *Ovato-oblongum* Folium, Ovarum (533) ad oblongam (516) figuram accedens.
- §32. *Ovato-rhombeum* Folium, ovatum (533) simulque rhomboideum. (694)
- §33. *Ovatum* Folium, cujus diameter longitudinalis superat transversalem, basi segmento circuli circumscripta, apice angustiore.

P.

- §34. *Pagina* dicitur folii superficies (811) utraque, unde pagina superior & inferior.

e 2

§35.

(*) Linea illa in se rediens, quae circulum constituit, quoniam radio in orbem circa se eunte describitur, *periphæria* appellari solet.

535. *Palatum* Corollae, Gibbositas prominens in Fauce (298) Corollae. *Antirrhinum*.
536. *Palae*, Lamellae Receptaculo (661) innatae flosculos & tandem semina distinguens, in floribus Compositis (162) *Anthemis*. *Bidens*. *Hypochaeris*.
537. *Paleaceum* Receptaculum. *Paleis* (536) instructum.
538. *Paleaceus* Pappus, (548) membrana inaequalis tenuis apici feminis adfixa.
539. *Palmata* Radix, Carnosa, lobata. *Orchis*.
540. *Palmatum* Folium, divisum ultra medium in Lobos subaequales basi cohaerentes.
541. *Palmus*, *Palmaris* Mensura, Diameter quatuor digitorum transversorum parallelorum, demto Pollice. *Unciae tres*.
542. *Panduraeforme* Folium, Oblongum (516) inferne larius, lateribus coarctatum.
543. *Panicula*, Flores sparsi (755) in pedunculis diverse divisis & subdivisis. Estque aequalis, vel secunda. (710)
544. *Paniculatus* Caulis, ramis varie subdivisis, floribus numerosis. *Eriger. canadense*.
545. *Papilionacea* Corolla, Irregularis (430) Petalo inferiore cymbiformi, (Carina (120) superiore adscendente, (Vexillum (898) lateralibus solitariis. (Alae (23)
546. *Papillosum* Folium, rectum punctis carnosiss.
547. *Papposum* Semen, Pappo tenuissimo inaequali instructum. *Populus Salix*.
548. *Pappus*, Corona (195) feminis pennacea pilosave, volitans. Estque simplex vel compositus.
549. *Papulofum* Folium, quod tegitur punctis vesicularibus.

550. *Parabolicum* Folium, cujus diameter longitudinalis superat transversalem, versus apicem sensim angustius rotundatum.
 551. *Parallelum* Dissepimentum. (887)
 552. *Parasiticus* Caulis, alteri Plantae nec terrae innatus. *Viscum*.
 553. *Partiale*, Involucrum, Involucellum. (425)
 554. *Parallelepipedum* (*) Anthera (41) idem ac quadrangularis. *Polytrichum*.
 555. *Partialis* Pedunculus, aliquot flores pedunculi communis (154) proferens.
 556. *Partialis* Umbella (862) Umbellula. (863)
 557. *Partitum* Folium, ad basin fere divisum, unde bi-tri-multipartitum, (91) a numero partium.
 558. *Patens* Folium, ad angulum acutum (12. in not.) cauli insidens.
 559. *Patula* Panicula, (543) Pedunculis pedicellisque undique dispersis, floribus remotis. *Opoplit. Coarctatae*. (146)
 560. *Pedatum* Folium, Petiolo bifido, latere tantum inferiore adnectente foliola plura. *Helleborus*.
 561. *Pedicellus*, Pedunculus (564) partialis (555) seu proprius floribus in Pedunculo communi. (154)
 562. *Peduncularis* Cirrhus, (142) pedunculo insidens.
 563. *Pedunculatus* Verticillus, (897) pedunculis flores elevantibus.
 564. *Pedunculus*, Fulcrum (338) sustinens Fructificationem (331) nec folia.
 565. *Pedunculus* (Muscis) Seta (725) plerumque Colorata, antheram (41) superne sustinens, basi tuberculata (852) nuda (*Bryum*) vel Perichaetio (574) vestita. (*Hypnum*).

(*) *Parallelepipedum* dicunt oriri, parallelogrammo ad perpendicularum, motu parallelo, demisso. *Geomet.*

XXXVIII NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

566. *Pelta* (Lichenibus) Fructificatio plana s. revoluta, margini vel apici folii verticaliter adglutinata. *Lich. Canin. Aphrof. &c.*
567. *Peltatum* Folium. Petiolo Disco Folii non basi inserto.
568. *Pennatus* Surculus (815) in Muscis, quum Folia ad rachis utrinque latus annexa, alternata vel opposita sunt.
569. *Perenne* Folium, per aliquot annos virens.
570. *Perennis* Radix, per plurimos annos regerminans.
571. *Perfoliatum* Folium, basi transversim cingente, (nec antice dehiscente) Caulem. *Buplarum.*
572. *Perianthium* Calyx (113) Fructificationi contiguus.
573. *Pericarpium* Viscus Plantae, gravidum seminibus, quae matura demittit. Capsula, (119) Siliqua, (729) Legumen, (452) Folliculus (126) Drupa (272) Pomum (614) Bacca (75) Strobilus. (795)
574. *Perichaetium* (Muscis) Congregatio foliorum angustorum, tuberculum (852) setarum (726) cingentium.
575. *Perpendicularis* Radix, quae recta descendit.
576. *Persistens* Corolla, Perianth. ad maturitatem Fructus. *Nymphaea.*
577. *Persistens* Folium, peracta aestate, non casurum.
578. *Personata* Corolla, Ringens (693) sed inter labia (433) Palato (535) Clausa.
579. *Pes*, *Pedalis* Mensura, mensuratur a flexura Cubiti, ad basin Pollicis. *Unciae duodecim.*
580. *Petalinum* Nectarium (496) Petalis insertum. Porus (*Ranunculus*) Rima, *Hydrophyllum.*
581. *Petalum* Corollae, Pars Corollae in plures divisae.

582. *Petioularis* Cirrhus, (142) Petiolo insertus.
 583. *Petioularis* Gemma, (344) e foliorum rudimentis confecta.
 584. *Petiolatum* Folium, Petiolo ad basin inserto. Sessili (721) oppositum.
 585. *Petiolus*, Fulcrum (338) sustinens Folium, nec Fructificationem.
 586. *Pileus* (Fungi) Orbiculus horizontaliter expansus, subtus fructificationes in lamellis (442) gerens.
 587. *Piliferum* Folium, apice in pilum desinens. *Bryum*.
 588. *Pilosum* Folium, quum Pili distincti elongati tegunt superficiem.
 589. *Pilosum* Receptaculum, pilis erectis rectum.
 590. *Pilosus* Caulis, Pilis distinctis elongatis rectus.
 591. *Pilus*, Ductus excretorius Plantae setaceus. Species Pubis. (628)
 592. *Pinnatifidum* Folium, transversim divisum in lacinias horizontales oblongas.
Bipinnatifidum quum bis laciniis lateralibus divisum.
 593. *Pinnatum* Folium, Petiolo simplici lateribus adnectente Foliola plura.
Abrupte. (3) *Alternatim* (28) *Articulate* (60)
Cirrbosum (141) *Decursive* (223) *Duplicato*. (274) *Interrupte* (421) *Opposite* (525)
Triplicato. (843) pinnatum.
 594. *Pinnatum cum impari*, Folium, Pinnatum (593) foliolo unico (impari) terminatum.
 595. *Pinnatum sine impari*, Folium (3)
 596. *Pinnatus* furculus (815) oppositos alternatosve admittit Ramos.
 597. *Pinnae* vocantur Foliola conjugata. *Pinnae pinnatae* quando foliola conjugata profundis incisuris minores *Pinnulas* repraesentant.

598. *Pistillum* Organum genitale femineum, constat Germine (351) Stylo (796) & Stigmate. (775)
599. *Placentatio*, est Coryledonum (199) Dispositio sub ipsa feminis Germinatione. *Mono-* (482) *Di-* (241) *Acotyledones*. (8)
600. *Plantae* dicuntur *Dicotyledones* (241) *Herbae* (375) & *Arbores*.
601. *Planum* Folium, superficie ubique aequali.
602. *Plicata* Vernatio, (891) in plicas varias coarctata longitudinaliter. *Betula*. *Crataegus*. &c.
603. *Plicatum* Folium, Disco (257) plicis acutis alternatim flexo, angulis dependentibus, & ascendentibus. *Alchemilla*.
604. *Plumosae* Setae (726) villosae, compositae.
605. *Plumosus* Pappus. (548) pilis pennatis constans.
606. *Plumula*, Pars Corculi (188) squamosa ascendens.
607. *Pollen* Pulvis Floris anthera (41) inclusa, humore rampendus, atomosque elasticos ejaculans. (Genitura Plantarum.)
608. *Pollex*, Pollicaris mensura, est longitudo aut Diameter extimi Articuli Pollicis. *Uncia una*.
609. *Polyanthos* Caulis, qui plures quam unum sustinet florem.
610. *Polygama* Planta, (Hybrida) quae flores hermaphroditos necessario, dein alios flores alterius sexus, femineos vel masculos, in eadem specie profert.
611. *Polypetala* Corolla, Petalis pluribus. Numerus ab ordinibus Insertionum determinatur. *Anemone*. *Hepatica*.
612. *Polyphyllum* Perianthium. Foliolis pluribus constans
613. *Polystachius* Culmus, plures quam unam Spicam gerens.

614. *Pomum* Pericarpium (573) factum ex valve, capsulam (119) continens.
615. *Praemorsa* Radix, deorsum truncata; Radiculas (645) laterales emittens. *Sc. Succisa. Plantago.*
616. *Praemorsum* Folium, Obtusissimum, terminatum incisuris inaequalibus.
617. *Prismaticum* (*) Pericarpium, lineare polyedrum, lateribus planis.
618. *Procumbens* Caulis, debilis horizontaliter terrae innitens.
619. *Prolifera* Umbella, (862)
620. *Prolifer* Flos, cum ex uno Flore alius enascitur. *Scabiosa. Geum rivale. Bellis hortens.*
621. *Prolifer* Caulis, ex apicis centro emittens tantum ramos. *Pinus.*
622. *Propagines*, Muscorum semina nuda s. Tunica cotyledonibusque destituta.
623. *Proprium* Involucrum, cuilibet Flori subiectum.
624. *Proprium* Perianthium, quemlibet florem respiciens.
625. *Proprium* Nectarium, a petalis & ceteris partibus distinctum. *Aconitum.*
626. *Proprium* Receptaculum, quod partes unius tantum Fructificationis respicit.
627. *Prostratus* Caulis, basi decumbente erectus.
628. *Pubes*, Hirsuties omnis in Planta, Pili (591) Lana (444) Barba (77) Tomentum (828) Strigae (793) Setae (726) Hami (373) Glandulae (356) Viscositas (905) Glutinositas. (365)
629. *Pubescens* Folium, Caulis, rectum pilis (591) raris brevibus sibi incumbentibus.
630. *Pulposum* Folium, materia tenaci factum.
631. *Punctatum* Folium, punctis excavatis adpersum.
- e 5
- 632.

(*) *Prisma* effici, ajunt, cum figura rectilinea ad rectam descendat, motu parallelo, *Geometr.*

XLII NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

632. *Pungens* Folium Aculeis (11) f. Spinis (761) Armatum.

Q.

633. *Quinatum* Folium. Digitatum (247) foliolis quinis.

634. *Quinquangulare* Folium, angulis quinis prominentibus. Spec. Angulati. (34)

R.

635. *Racemus*. Pedunculo communi, pedicellis-
que lateralibus, instructo. *Ribes*.

636. *Rachis*, Receptaculum filiforme flosculos longitudinaliter adnectens, in Spicam. (759)

637. *Rachis* f. *Costa*, Productio Petioli f. Nervus intermedius, foliorum medium longitudinaliter percurrents.

638. *Radiatus* Flos. Corollulis Disci (256) Tubulatis (854) Ambitus (527) vero Ligularis (454) difformibus, compositus. (162)

639. *Radiata* Umbella (863) petalis florum marginalium, reliquis majoribus. *Tordyl.* *Caucalis*.

640. *Radiale* Folium, quod ex radice immediate exit.

641. *Radicans* Caulis, aliis se adfigens Radiculis lateralibus. *Hedera.* *Cuscuta*.

642. *Radicans* Folium, si radices agat. unde.

643. *Radicata* Folia, quae radículas demittunt ex substantia ipsius folii.

644. *Radicatio*, est Radicis dispositio Caudice ascendente (127) Descendente (648) & Radiculis (645)

645. *Radicula*, Pars Radicis (648) fibrosa.

646. *Radius*, Floris Compositi (638) ambitus ex Corollulis ligulatis. (454)
647. *Radii* (*) dicuntur etiam Pedunculi Umbellae (862) & Setae rigidiores Pappi. (548)
648. *Radix* Organum nutriens Plantam (600) Constat Caudice descendente & Radiculis. (645)
649. *Rameum Folium*, quod Ramo (non Cauli) insidet.
650. *Rami* Partes caulis. Situs notetur.
651. *Ramificatio*, manifestatur in situ Ramorum, quem folia sequuntur. (147. 268. 266. 263. 896. 225. 669. 683. &c.)
652. *Ramosa Radix*, in fibras (645) subdivisa.
653. *Ramosa Spica* (759) varie in Spicas partiales divisa.
654. *Ramosa Spina* (761) divisa, apice partita.
655. *Ramosae Setae*, (726) s. *Furcatae*, subdivisae quasi in Ramulos. *Leontodon. hispid. Arabis thaliana.*
656. *Ramosum Folium*, Pedatum. (560)
657. *Ramosus Aculeus*, (11) *Furca*. (341)
658. *Ramosus Caulis*, Ramis lateralibus pluribus instructus.
659. *Ramosus Pappus*, (548) Radiis (647. b.) subdivisis. *Carlina.*
660. *Ramosissimus Caulis*, Ramis numerosis absque ordine cumulatis.
661. *Receptaculum*, Basis qua partes Fructificationis (331) connectuntur. Estque Commune (152) vel Proprium. (626)
662. *Reclinatum Folium*, deorsum versus petiolum flexum, ut arcus sit basi inferior, apice ascendente.
663. *Reclinatus Caulis*, arcuatim versus terram. *Ficus.*
664. *Recta Arista*, perpendiculariter exiens. *Agrostis. Spica Venti.*

665

(*) Lineae pares, quae ex medio puncto, quod *Centrum* dicunt, ad puncta peripheriae ducuntur, *radii* appellantur. *Geometr.*

665. *Recta* Calyptra, (112) undique aequalis.
 666. *Rectus* aculeus, flexuris destitutus.
 667. *Recurvatum* Folium, deorsum, ut Convexitas Arcus superiora spectet.
 668. *Recurvi* Aculei, (11) extrorsum reflexi.
Rosa.
 669. *Reflexi* Rami, (650) perpendiculariter dependentes.
 670. *Reflexum* Folium, deorsum curvatum, ut apex basi inferior evadat.
 671. *Reflexum* Perianthium, partibus retrorsum flexis.
 672. *Regularis* Corolla, aequalis, (17) figura, magnitudine & proportionem partium.
 673. *Remota* Corolla, a Calyce interjecto Germine, (351) *Sanguisorba. Poterium.*
 674. *Remota* Folia, Spatio e se invicem distantia.
 675. *Remota* Volva, (907) a Capitulo (118) Spatio recedens.
 676. *Reniforme* Folium, subrotundum, (805) basi sinu excavatum, angulis posticis destitutum.
 677. *Repandum* Folium, cujus margo angulis,isque interjectis sinubus circuli segmento inscriptis, terminatur.
 678. *Repens* Caulis, Terrae incumbens, radículasque agens.
 679. *Repens* Radix, longe sub terra excurrans, hinc inde germinans, & Radículas demittens.
 680. *Restantes* Pedunculi, post Casum fructificationis.
 681. *Resupinata* Corolla, Tubo contorto, ut Labium superius Terram, inferius coelum spectet.
Viola. Scrophularia.
 682. *Resupinatum* Folium, Pagina (534) superiore inferiore, & inferiore superiore facta.

683. *Retroflexi* Rami, horum vorsum divaricati. (266)
 684. *Retrofractus* Pedunculus, vi quasi ad dependendum redactus.
 685. *Retrorsum* Sinuatum, Fol. Runcinat. (699)
 686. *Retusum* Folium, quod terminatur sinu obtuso.
 687. *Revoluta* Vernatio, (891) lateribus versus Paginam inferiorem utrinque spiraliter contortis. *Primula. Tussilago.*
 688. *Revolutum* Folium, quod deorsum in Spiram revolvitur.
 689. *Revolutus* Cirrhus, Spira dimidio itinere retorta. *Bryonia. Leguminosae.*
 690. *Rictus* Corollae, hiatus inter duo Labia Corollae Ringentis. (693)
 691. *Rigidus* Caulis, flexurae impatiens.
 692. *Rimosus* Caulis, Cortice exteriori fissuras sponte agens *Acer.*
 693. *Ringens* Corolla, Limbo (456) irregulari in duo Labia hians. (343. 433.)
 694. *Rhombeum* Folium, Figura Rhombi. (*)
 695. *Rostellum.* Pars Corculi (188) in semine, simplex descendens.
 696. *Potata* Corolla, Monopetalae, Limbus (456) planus, partitus, nullo tubo (857) impositus.
 697. *Rotundum* Folium, s. *Rotundatum*, angulis orbium.
 698. *Rugosum* Folium, Rugis confectum. *Salvia.*
 699. *Runcinatum* Folium, (685) Pinnatifidum, (592) ita ut lobi antice convexi, portice transversi sint. *Leontod. Taraxac.*

S.

700. *Sagittatum* Folium, Triangulare (834) basi sinu excavatum, angulis posticis acutis.

701.

(*) Cujus figurae quadratae latera aequalia quidem, non autem recti sunt anguli, *Rhombus*; cujus neque recti anguli, neque omnia latera sed opposita tantum, aequalia sunt, *rhombiformis* dicitur. *Geometr.*

XLVI NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

701. *Sarmentosus* Caulis, filiformis subnudus, geniculis radican-
tibus.
702. *Scaber* Caulis, Punctis eminentibus rigidiu-
sculis exasperatus.
703. *Scandens* Caulis, alta petens, aliisque corpo-
ribus sustinendus.
704. *Scapus* Pedunculus, Radicatus, caulis faciem
induens. *Viola odorata*.
705. *Scapus* Trunci (850) Species, fructificatio-
nem sustinens, absque foliis. *Narcissus*.
706. *Scariosum* Folium, substantia sicca arida, ta-
ctu sonora.
707. *Scariosum* Perianthium, imbricatum (392)
squamis margine s. apice membrana auctis, ari-
da sonora. *Chrysanthem*.
708. *Scutellum*, Fructificatio orbiculata, concava:
margine undique elevato. *Lichenes*.
709. *Scyphus*, in Lichenibus pyxidatis, constat sti-
piti basi attenuato, superne dilatato excavato,
fructificationes sessiles, seu pedunculatas scutel-
liformes, proferens.
710. *Secunda* Panicula, (382) Pedunculis flori-
busque omnibus versus unum idemque latus fle-
xis. *Festuca*. *Dactyl. glom*.
711. *Secunda* Spica, floribus omnibus ad unum la-
tus versis.
712. *Semen* Vegetabilis Pars decidua, novi rudi-
mentum, pollinis (607) irrigatione vivifica-
tum, vesica tunicatumque. Partes: Hilum (383)
Cotyledon (199) Corculum. (188)
713. *Semiamplexicaule* Folium, gradu minore dif-
fert a fol. amplexicauli. (30)
714. *Semicylindricum* Folium, Teres (817) sed
altero latere longitudinaliter planum.
715. *Seminale* Folium, quod antea Cotyledon (199)
fuit, & primum in Planta est.

716. *Seminum* Receptaculum , Basis , qua semina intra Pericarpium adfiguntur.
717. *Semiteres* Caulis , hinc planus , inde teretiusculus.
718. *Sempervirens* Folium , per omnia tempora anni virens.
719. *Sericeum* Folium , tectum pilis appressis, molliissimis nitidis.
720. *Serratum* Folium , margine inciso : omnibus incisuris extremitatem respicientibus. *Duplicato serratum* (275) incisuris iterum incisus.
721. *Sessile* Folium , immediate Cauli vel Ramo, absque petiolo insidens.
722. *Sessilis* Pappus , (548) Semine absque Stipite (779) adhaerens.
723. *Sessilis* Umbellula , (863) plures Pedunculos simplices ex eodem centro, ambitu aequali, prodeuntes.
724. *Sessilis* Verticillus , (897) absque pedicellis manifestis.
725. *Seta* dicitur Pedunculus (565) in Muscis.
726. *Setae* , Pili rigidiusculi teretiusculi , Spec. Pubis. (628)
727. *Sicca* Drupa , (272) non succulenta. (808)
728. *Silicula* , Siliqua (729) subrotunda , oblonga , obcordata stylo instructa. *Lepidium. Draba. Thlaspi.*
729. *Siliqua* , Pericarpium (573) membranaceum bivalve , adfigens semina secundum utramque futuram : constat valvis (884) & Dissepimento.
730. *Simplex* Aculeus , (11) non divisus. (666) (404) (668)
731. *Simplex* Caulis , continua serie versus apicem extensus.
732. *Simplex* Cirrhus , indivisus.
733. *Simplex* Flos , intra Perianthium aut Corollam unicum receptaculum constituit.

734. *Simplex* Folium, cum Petiolus gerit unicum Folium, differt : 1) Circumscriptione (138) 2) Angulis (36) 3) Sinubus (745) 4) Apice (45) 5) Margine (473) 7) Superficie (811) 8) Substantia (806) 9) Duratione. (277)
735. *Simplex* Fructificatio, (331) Paucis floribus constans.
736. *Simplex* Pappus, (548) radiis pluribus indivisis in orbem positis. *Hieracium*.
737. *Simplex* Perianthium, compositum dum ferries unica squamarum ambit flosculos. T. *Parfara*.
738. *Simplex* Radix, quae non subdividitur.
739. *Simplex* Seta (725) continuo extensa longitudinaliter.
740. *Simplex* Spica; Rachi (637) indivisa.
741. *Simplex* Umbella (862) Pedunculis non ramosis omnibus ex uno eodemque Receptaculo ortis.
742. *Simplicissimus* Caulis, idem ac Integer. (415)
743. *Sinistrorsum*, hoc est: quod respicit sinistrum, si ponas te ipsum in centro constitutum; meridiem adspicere; *Dextrorsum* itaque contrarium. (908. 909.)
744. *Sinuatum* Folium, a lateribus sinubus dilatatis.
745. *Sinus*, Discum Folii in partes secant. (676. 192. 374. 700. 306. 540. 592. 470. 699. &c.)
746. *Situs* Foliorum. Insertio. (413)
747. *Solidus* Bulbus (106) Carnosus, intrus indivisus. *Tulipa*.
748. *Solidus* Caulis, interne factus (292) non tubulosus. (856)
749. *Solitariae* Stipulae, simplices, sparsae.
750. *Solitarius* Pedunculus, qui unicus est in loco.
751. *Solutae* Stipulae, Folia, basi productae, crassitiem percentes.

752. *Somnus*, nocturna Foliorum mutatio in Planta. Connivens, (182) Includens, (399) Circumsepiens, (139) Muniens, (492) Conduplicans, (170) Involvens, (429) Divergens, (267) Dependens, (234) Invertens, (424) imbricans, (390)
753. *Spadix*, Receptaculum (661) Palmae, enatum intra Spatham, in ramulos fructificantes divisum.
754. *Sparsa* Folia, absque certo ordine constituta.
755. *Sparsi* Pedunculi, ubi plures absque ordine prognascuntur.
756. *Spatha* Calyx (113) membranaceus, longitudinaliter ruptus. *Narcissus*.
757. *Spatulatum* Folium, subrotundum (805) basi angustiore lineari. (458)
758. *Spbaerophyllum*, Fructificatio feminea sessilis vel pedunculata, constans minutissimis foliis congregatis imbricato-patulis. *Mnium pellucid.* *Androgyn.* & *Fissum*.
759. *Spica* Floribus sessilibus alternis, pedunculo communi simplici (Rachi) adfixis.
760. *Spicula*, *Spicilla*, partialis spica, compositae (158) Locusta dicta.
761. *Spica*, Mucro durus, pungens, e ligno, (non ex cortice) protrusus. A cultura saepe evanescent. *Pyrus.* *Prunus.* *Rhamnus*.
762. *Spinescens* Petiolus, indurescens et pungens.
763. *Spinosum* Folium, quod margine exit in acumina rigida subulata & pungentia. *Carduus.* *Ilex*.
764. *Spinosum* Perianthium, Squarrosum, (770) Squamis in mucrones pungentes terminatis. *Onopordon*.
765. *Spinosus* Caulis. Spinis (761) armatus.

766. *Spiralia* Vernatio (136)
 767. *Spithama*, Spithamalis, Mensura, Spatium inter Apicem Pollicis & Indicis extensum. *Unciae septem.*
 768. *Squamosus* Bulbus, (106) Lamellis f. squamis imbricatus. *Lilium.*
 769. *Squamosus* Caulis, squamis adspersus.
 770. *Squarrosus* Perianth. Imbricatum (392) squamis undique divaricatis patentissimis. *Onopordon. Conyza.*
 771. *Stamen*, Viscus pro Pollinis (607) praeparatione, (Organum Genitale masculinum.) Constat 1) Filamento, (303) Anthera (41) & Polline. (607)
 772. *Stella* f. *Stellula*, Fructificatio in Muscis: Surculi terminalis expansio pluribus foliis patentibus conflata cujus medio (in quibusdam) minuta folia compactissima, in aliis distinctiora corpora cylindrica (209. in not.) imbricata, insident. *Polytrichum. Mnium.*
 773. *Stellata* Folia, Verticillata. (895)
 774. *Stellatae* Setae, (726) decussatim dispositae.
 775. *Stigma*, Summitas Pistilli (598) madida humore, pro Pollinis receptione. Numerus & Figura notetur.
 776. *Stimuli*, Mucrones puncturas inflammatorias efficientes, unde pruriginosae evadunt Partes. *Urtica.*
 777. *Stipes* Frondis (329) Trunci (850) Species, in Folium transiens. *Filices.*
 778. *Stipes* Fungi, Truncus f. Pes fungi, estque farctus, vel fistulosus; nudus vel annulatus. (37)
 779. *Stipes* Pappi (548) Filum elevans connectensque Pappum & Semen. Unde.

780. *Stipitatus* Pappus. Stipite (779) instructus, non sessilis. (722)
 781. *Stipula*, Foliorum f. Squamula, basi petiolorum enascentium ubique adstans. Fulcri (351) Species.
 782. *Stipulares* Glandulae (356) Stipulis inferae.
 783. *Stipularis* Gemma, (344) ex Stipulis (781) confecta.
 784. *Stipulatio*, Stipularum (781) situs & structura ad Basin Foliorum.
 785. *Stipulatus* Caulis, Stipulis (781) notatus.
 786. *Stolones*, (786) nova Plantarum Soboles, e Radicibus fructificantes, per quas Plantae quoque multiplicantur. *Ajuga. Viola* od.
 787. *Stoloniferus* Caulis, Turiones (861) ad radicem emittens.
 788. *Striatum* Folium, Lineis superficialibus excavatis parallelis inscriptum.
 789. *Striatus* Caulis, Lineis tenuissimis excavatis longitudinalibus.
 790. *Stricta* Panicula (543) pedunculis pedicellis-que rigidiusculis. Opposit. Laxae. (450)
 791. *Strictum* Folium, omnino perpendiculare absque flexura.
 792. *Strictus* Caulis rectus, perpendicularis, non flexuosus.
 793. *Strigae*, Pili rigidiusculi planiusculi.
 794. *Strigosum* Folium, aculeis lanceolatis rigidis in superficie.
 795. *Strobilus*, Pericarpium (573) imbricatum, ex Amento (29) coarctato factum, squamis induratis. *Pinus*.
 796. *Stylus*, Pars Pistilli (598) intermedia, elevans Stigma (775) a Germine. (351) Situ, Divisione, & figura differt.
 797. *Subalare* Folium, Axillare (73)

798. *Subcordatum* Folium, ad hanc figuram, (192) fere accedens.
799. *Subdivisus* Caulis, in ramos absque ordine.
800. *Suberosus* Caulis, Cortice exteriori molliore, sed elastico indutus.
801. *Submersum* Folium, intra aquae superficiem absconditum.
802. *Subovatum* Folium, ad ovatam figuram (533) subaccedens.
803. *Subramosus* Caulis, ramis paucissimis lateralibus.
804. *Subrotundum* Capitulum. (118) fere globosum.
805. *Subrotundum* Folium, cujus figura Orbiculato (527) proxime accedit.
806. *Substantia* Folii, consideratur secundum latera. (478. 706. 353. 235. 166. 155. 630. 122. 6. 270. &c.)
807. *Subulatum* Folium, ad basin lineare (458) versus apicem sensim attenuatum.
808. *Succulenta* Drupa (272) humorem continens. *Prunus*.
809. *Suffruticosus* Caulis, basi permanens, ramis quotannis marcescens.
810. *Sulcatum* Folium, Disco (257) lineis profundis excavatum.
811. *Superficies* Folii, Paginam (534) Supinam (superiorem) vel pronam (inferiorem) tegit. Communiter prima coelum, secunda terram spectat. (504 500. 355. 148. 497. 840. 839. 845.)
812. *Superum* Germen, (351) Corolla inclusum.
813. *Superus* Flos, Calyx. Cui Germen sub receptaculo. s. cujus Calyx abit in Fructum. *Tourn.*

814. *Supradecompositum* Folium, cum Petiolus aliquoties (bis-ter) divisus, adnectit plurima Foliola. (818. 848. 841.)
 815. *Surculus*, Caulis species in Muscis, reptans, procumbens vel erigens; expansione continue multiplicatur. (568. 596. 393.)

T.

816. *Teres* Caulis, cylindricus (209. in not.) f. angulis destitutus,
 817. *Teres* Folium, quod maxima ex parte cylindricum.
 818. *Tergemminum* Folium, (842) Petiolus bifidus utroque apice foliola duo ferens, & insuper foliola dico ad divaricationem petioli communis.
 819. *Terminalis* Arista. (54) apici Glumae adfixa.
 820. *Terminalis* Pedunculus, f. Flos. ad apicem Caulis f. Rami positus.
 821. *Terna* Folia (89)
 822. *Ternatum* Folium, est Digitatum (247) foliolis tantum tribus. Estque foliolis sessilibus vel petiolatis.
 823. *Tessellata* Folia, Colorat. Species, (148) maculis quadrangularibus discoloribus picta.
 824. *Tetragonus* Caulis, (837)
 825. *Tbalamus*, Receptaculum. (661)
 826. *Tbyrsus*, Panicula (543) coarctata in formam ovatam. *Syringa*. T. *Petasites*.
 827. *Tomentosum* Folium, villis intertextis (828) obductum.
 828. *Tomentum*, Spec. Pubis, (628) villi intertexti vix conspicui.

829. *Torosa* Siliqua (729) *Torulosum* Pericarpium.
Prominentiis hinc inde Gibba.
830. *Torsia*, *Intorsia*, Contorsio (183) Flexio Par-
tium Plantæ, versus alterum latus. (681. 682.
910. 908. 909. 186.)
831. *Tortilis* Arista (54) funis instar flexa. *A-
vena*.
832. *Transversum* Dissepimentum. (886)
833. *Trapeziforme* Folium, Quadrangulare, late-
ribus inter se inaequalibus.
834. *Triangulare* Folium, angulis tribus promi-
nentibus. Angulati Spec. (34)
835. *Triangularis* Caulis, *Quadrangularis* &c. a
numero angulorum longitudinaliter prominen-
tium.
836. *Tricocca* Capsula, (119) tribus nodis protu-
berans, intusque in tria Loculamenta (463) di-
visa. *Euphorbia*.
837. *Trigonus* Caulis, tetragonus, pentagonus,
hexagonus. Angulis tribus, quatuor, quinque,
sex, prominentibus. *Ancipitis* Spec. (31)
838. *Trilobum* Folium, (462)
839. *Trinervatum* Folium, Nervosum (497) tri-
bus nervis, *pone Basin* Folii concurrentibus.
840. *Trinerve* Folium, Nervosum (497) tribus
nervis *in Basi* Folii concurrentibus.
841. *Tripinnatum* Folium, (843) cum Petiolus
communis adfigit plura foliola bipinnata. (92)
842. *Triplicato-gemminatum*, (818)
843. *Triplicato-pinnatum*. (841)
844. *Triplicato-ternatum*. (848)
845. *Triplinerve* Folium, nervosum (497) tribus
nervis, *supra Basin* concurrentibus.
846. *Triqueter* Culmus, lateribus tribus exacte pla-
nis.
847. *Triquetrum* Folium, Tribus lateribus longi-
tudinaliter planis, in folio subulato. (807)

848. *Triternatum* Folium, (844) cum petiolus adfigit tria foliola biternata. (93)
849. *Truncatum* Folium, quod transversali terminatur:
850. *Truncus*, Organum multiplicans Plantam, quatuor numerantur Species: 1) *Caulis* (132) 2) *Culmus* (205) 3) *Scapus* (705) 4) *Stipes*. (777) *Rami* partes sunt *Trunci*.
851. *Tuberculum* (*Lichen.*) Fructificatio, constans punctis scabris, ex pulvere quasi congestis.
852. *Tuberculum* (*Musci*) basis Pedunculi (565) Ovata, seu conica; nuda vel Perichaetio (574) vestita, qua furculo (815) adfigitur.
853. *Tuberosa* Radix, e partibus carnosis filo quasi connexis. *Filipendula*. *Poconia*.
854. *Tubulata* Corolla, Monopetala (485) Tubo (857) Cylindrico, (209. in not.) Limbo Campanulato, 4 f. 5 fido.
855. *Tubulosus* Flos, Compositus, (162) Corollulis flosculorum omnibus tubulatis (854) subaequalibus.
856. *Tubulosum* Folium, quod interne si detrunce-
tur cavitatem habet.
857. *Tubus* Corollae, Monopetalae (485) pars inferior cylindracea.
858. *Tunicatus* Bulbus, (106) Tunicis numerosis vestitus. *Cepa*.
859. *Tunicatus* Caulis, membranis vestitus.
860. *Turbinatum* Perianthium, obverse Conicum. (176)
861. *Turiones*, Tenellae plantarum soboles, verno tempore cum foliis e terra erumpentes. (786) *Asparagus*. *Humulus*.

U.

862. *Umbella*, Receptaculum ex eodem centro elongatum pedunculos filiformes proportionatos.
863. *Umbellula* est partialis *Umbella*. (556)
864. *Umbilicatum* Folium, Peltatum. (567)
865. *Umbo*, Discus (256)
866. *Undatum*, Disco (257) plicis obtusis alternatim flexo.
867. *Undulatum* Folium, Margine plicis alternatim flexo.
868. *Unguis* Corollae Polypetalae (611) pars inferior angustata, qua Receptaculo adfigitur.
869. *Unguis*, Unguicularis Mensura, est longitudo Unguis. *Lineae Sex.*
870. *Uniflora* Gluma (364) unicum Florem amplectens. *Agrostis.*
871. *Uniflorus* Pedunculus, bi - tri - multiflorus, pro numero florum quos profert.
872. *Unilateralis* Racemus, (635) Flores omnes ad alterum latus infert.
873. *Univalvis* Gluma (364) unica constans squama.
874. *Univalvis* Spatha (756) uno latere dehiscens. *Leucojum.*
875. *Universale* Involucrum, (427) Umbellae universali subiectum.
876. *Universalis* Umbella (862) quae alias Umbellulas (887) Apicibus gignit.
877. *Urceolata* Corolla, quae Urceoli s. Pelvis, instar inflata, & undique gibba est.
878. *Urens* Caulis, Stimulis (776) adspersus.
879. *Utriculi*, Vascula liquore secreto repleta.

880. *Vagina* Foliorum, Vaginantis (882) Folii, Tubus cylindricus Culmum vel Caulem vestiens.
881. *Vagina* (Muscis) Membrana pervia tubulosa, furculo insidens, & tuberculum (852) Pedunculi (565) arcte vestiens. *Polystichum*.
882. *Vaginant* Folium, basi formante tubum, culmum vestientem. (880)
883. *Vaginatus* Culmus, Foliorum Vaginis (880) cinctus.
884. *Valvæ*, *Valvula*, Paries quo tegitur fructus externe.
885. *Valvis* dehiscit Capsula, (119) unde tri-quadri - quinque - sex - valvis, a numero segmentorum.
886. *Valvis contrarium*, s. Transversum Dissepimentum, (259) angustius, ubi Valvulae (884) coarctatae evadunt concavae. *Tblaspi*.
887. *Valvis Parallelum* Dissepimentum (259) latitudine & Diametro transversali ad Valvulas (884) accedens. *Alyssum*. *Turritis*.
888. *Venosum* Folium, Vasis discurrentibus multifariam divisis.
889. *Ventricosa* Spica, (759) lateribus gibba.
890. *Ventricosa* Corolla, Perianth. in ventrem intumescens.
891. *Vernatio*, (321) Foliorum Dispositio intra gemmam, (344) Conduplicata, (171) Convoluta,

LVIII NOMENCLATOR SEU EXPLICATIO

luta, (126) Involuta, (428) Revoluta (687)
 Obvoluta, (122) Equitantia, (286) Imbricata,
 (391) Plicata, (602) Reclinata, (662) Circi-
 nalia, (136)

892. *Versatilis* Anthera (41) incumbens. (892)

893. *Versus* Florum, est eorum certam versus Pla-
 gam quaedam dispositio.

894. *Verticale* Folium, paginam superiorem me-
 ridiei (non coelo) obvertens.

895. *Verticillata* Folia, s. Stellata, plura quam duo
 folia caulem ambientia. (821)

896. *Verticillati* Rami, plures truncum (850) ad
 genicula (362) circumdantes.

897. *Verticillus*, Floribus pluribus Caulem annu-
 latim ambientibus. *Didynamia*.

898. *Vexillum*, Superius Petalum Corollae Papi-
 lionaceae, (545) Alis (23) & Carinae (240)
 incumbens.

899. *Vigiliae* Plantarum, absolvuntur determinatis
 horis Diei, quibus Plantae Flores quotidie ape-
 riunt, expandunt, & claudunt. *Tragopogon. Hie-
 rar. &c.*

900. *Villosa* Calyptra, sursum vel deorsum pilosa.
Bryum Siriae. Polytichum.

901. *Villosum* Folium, Testum pilis mollibus.

902. *Villosus* Caulis, Pilis mollibus pubescens.
Rhus.

903. *Virgatus* Caulis, ramusculis debilibus numerosis inaequalibus.
904. *Viscidum* Folium, oblitum tenaci humore.
905. *Viscositas*, Qualitas humoris tenacis.
906. *Vivipara* Gramina fiunt, dum glumae Corollae excrescunt in folia, tumque abortiunt, & Stamina cum Pistillis plane evanescunt.
907. *Volva*, Calyx Fungi membranaceus, undique lacerus.
908. *Volubilis* Caulis, spiraliter adscendens per ramum alienum.
909. *Volubilis* dextrorsum, (743) ☽ contra motum Solis. *Convolvul.*
910. *Volubilis* Sinistrorsum (743) ☾ Secundum solem. *Humulus. Polyg. Convolvul.*
911. *Vulgaris* Planta, s. *Frequens*, quae in solo apto sponte & copiose provenit.



Emendanda.

In Præf.

Pag. 3. lin. 14. iujuria lege *injuria*.

p. 4. l. 5. vestigiat l. *vestigia*.

p. 5. l. 21. majorum l. *maiores*.

In Nomenc.

P. XL. Nro. 607. inclusa lege *inclusus*.

CLASSIS I.



CLASSIS I.

MONANDRIA

A. MONOGYNIA.

HIPPURIS.

LINN. *Gen. Plant.* no. 11.

Cal. o. *Petala* o. *Stigma* simplex. *Semen* 1.

LINN. *SYST. NAT.* T. II. pag. 52.

1. HIPPURIS, *vulgaris*. *Linn. Spec. Plant.* pag. 6.
(*Limnopeuce*. *Hall. Hist. Stirp. Helv.* no. 1572.)

Habitat in fossis & piscinis ad *Driedorff*, *Esilstein*, alibique.
Floret Majo.

B. DIGYNIA.

CALLITRICHE. G. P. 13.

Cal. o. *Petala* 2. *Caps.* 2 - locularis, 4 - sperma. S. N. 52.

2. CALLITRICHE, *verna*, foliis superioribus ovalibus, floribus androgynis. *Linn. Spec.* 6. (*Stellaria*. *Hall.* 553.)

β . *Stellaria* foliis imis linearibus, supremis subrotundis. *Hall.* 554.

H. α . in aquis stagnantibus passim; β . similibus locis in *Fischweyer - Grund*; bey der untern *Walckmühle*. Floret α . Majo, β . Junio.

Var. β . Flores superiores masculi, inferiores feminei, uti in α ; Folia caulina linearia, apice bifida, uti in sequente.

3. CALLITRICHE, *autumnalis*, foliis omnibus linearibus apice bifidis, floribus hermaphroditis. *Linn. Spec.* 6. (*Hall.* 555.)

H. in fossis aquosis, & aquis quietis, bey der *Papiermühle*; & alibi rarius. Floret Augusto, & sequ.

A

CLAS-

CLASSIS II.

DIANDRIA

A. MONOGYNIA.

* *Flores inferi, monopetali, regulares.*

LIGUSTRUM. G. P. 18.

Cor. 4-fida. Bacca 4-sperma. S. N. 55.

4. LIGUSTRUM, *vulgare*. Linn. Spec. 10. (Hall. 530.)

H. ad sepes passim. Floret Junio.

Pharm. LIGVSTRUM Flores.

SYRINGA. G. P. 22.

Cor. 4-fida. Caps. 2-locularis. S. N. 56.

5. SYRINGA, *vulgaris*, foliis ovato-cordatis. Linn. Spec. 11. (Hall. 531.)

H. Ad sepes frequens, frutex perfixæ originis; Var. Floribus albis in Hortis auf dem Berg. Floret Majo.

** *Flores inferi, monopetali, irregulares.**Fructus capsularis.*

VERONICA. G. P. 25.

Cor. Limbo 4-partito: lacinia infima angustiore. Caps. 2-locularis. S. N. 57.

a. *Spicata.*6. VERONICA, *spicata*, spica terminali, foliis oppositis crenatis obtusis, caule adscendente simplicissimo. Linn. Spec. 14. (Hall. 542.)

H. in sterilibus sylvaticis, in der Hölle, rarius; Floret Julio. †

7. VERONICA, *officinalis*, spicis lateralibus peduncularis, foliis oppositis, caule procumbente. Linn. Spec. 14. (Hall. 540.)

H. in sylvis passim. Floret Junio & sequ.

Pharm. VERONICAE Herba.

b. *Corymboso-racemosa.*8. VERONICA, *serpillifolia*, racemo terminali subspicato, foliis ovatis glabris crenatis. Linn. Spec. 15. (Hall. 546.)

H. in pascuis, riguis, ad vias, ubique, Floret Majo & sequ. Carol.

Corolla, pallide carulea, infima lacinia angustissima alba. *Tota Planta glabra.*

9. VERONICA, *Beccabunga*, racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. *Linn. Spec. 16. (Hall. 534.)*

H. in fossis aquolis, stagnis, rivulis, abunde. Floret Junio. *Pharm. BECCABUNGAE Herba.*

Folia primo vere in acetaria recipiuntur.

Radix perennis. Caulis procumbens, basi repens. Folia subpetiolata obtusa. Corollae saturate carulea. Capsula subrotunda, gibba.

10. VERONICA, *Anagallis aquatica*, racemis lateralibus, foliis lanceolatis serratis, caule erecto. *Linn. Spec. 16. (Hall. 533.)*

H. in fossis, & aquis stagnantibus, bey der obern Papier-Mühle frequens; bey der untern Walckmühle, rarius. Floret Junio, Julio.

Radix annua. Caulis erectus. Folia amplexicaulia, acuta. Corollae carnea. Capsula obovata.

11. VERONICA, *scutellata*, racemis lateralibus, pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis. *Linn. Spec. 16. (Hall. 532.)*

H. in pratis paludosis, circa pagum Sinn, frequens. Floret Julio.

Radix subrepens. Caulis pedalis, simplicissimus, suberectus, teres, lavis. Folia opposita, lineari lanceolata; inferiora integerrima, superiora longiora serrata: serraturis oppositis remotis, incisura inaequali bifidis retrorsum versis. Pedunculi ex alis superioribus, foliis longiores, pauci (5-7) flori, alterni: Pedicellis anthesi peracta secundis, pendulis. Calyx aequalis, Corolla brevior. Corolla dilutissime carulea, demum lactea, Lacinia superiore venis sanguineis lineata. Capsula cordata, profunde emarginata, acute marginata, octosperma. Semina planiuscula.

12. VERONICA, *Teucrium*, racemis lateralibus longissimis, foliis ovatis rugosis dentatis obtusiusculis, caulibus procumbentibus. *Linn. S. N. 58. Spec. 17. (Hall. 537.)*

H. unico in loco sterili, Anontoso, umbroso; in dumetis oben im Fischweyer Grund. Floret Junio, Julio.

In meis Speciminibus Caules quam V. R. Chamadr. duriores, villosiores, basi ramosi, procumbentes; Folia solidiora, omnia subpetiolata, supra sere laevia, subtus nervosa, obscuriora, obscuriuscula.

susiusque dentata. Racemi ex axillis superioribus & inferioribus prodeunt longissimi, strictiores, densioresque. Flores numerosiores, subspicati. Bractæ minores. Calycina foliola subinaequalia, trinervia. Corollæ lacinia superior saturatus & puberulus cærulea. Capsulae non dissimiles.

TEUCRIUM hoc est **VERVM BEROLINENSIVM**, ad usum diæteticum, Theæ chinensis præstantissimum succedaneum. a **TEUCRIO SPURIO** (VER. *Chamadr.*) his notis facile distinguendum.

13. **VERONICA**, *montana*, racemis lateralibus paucifloris, calycibus hirsutis, foliis ovatis rugosis crenatis petiolatis; caule debili. *Linn. Spec. 17. (Hall. 539.)*

H. in sylvis umbrosis, in *Hirschberg* frequens. Floret Julio. Caulis *ultrapedalis*, procumbens basi repens, teres, distiche pilosus. Folia magna, omnia opposita petiolata; terra incumbens rubra, nitida. Pedunculi longissimi, ex foliorum alis intermediis. Pedicellis 5-9. remotis. Calycina foliola subequalia, imprimis basi hirsuta. Corolla magnitudine fere sequentis, dilutius cærulea. Capsula magna, suborbiculata, compressa, acute marginata, ciliata. Semina sex seu octo, planiuscula, striata.

14. **VERONICA**, *Chamædrys*, racemis lateralibus, foliis ovatis rugosis dentatis sessilibus, caule debili. *Linn. Spec. 17. (Hall. 536.)*

H. in pomariis, ad sepes passim. Floret Majo, Junio. Radix repens. Caules erecti, infirmi, simplices. Folia amplexicaulia, inferiora minora ovato-subrotunda, superiora majora ovato-oblonga subacuta. Racemi laxi ex axillis superioribus tantum foliorum. Bractæ lanceolata obtusa. Calycina foliola lanceolata inaequalia. Corolla speciosa, cærulea. Capsula exacte obcordata, polysperma.

c. *Pedunculis unifloris.*

15. **VERONICA**, *agrestis*, floribus solitariis, foliis cordatis incisus pedunculo brevioribus. *Linn. Spec. 18. (Hall. 549.)*

H. in agris (sæpe flore albo) arvis, & cultis, passim. Floret Aprili & seq.

16. **VERONICA**, *arvensis*, floribus solitariis, foliis cordatis incisus pedunculo longioribus. *Linn. Spec. 18. (Hall. 548.)*

H. in cultis passim; am *Sieghaus*, frequens. Floret Julio & seq.

17. **VE-**

17. VERONICA, *hederifolia*, floribus solitariis, foliis cordatis planis quinquelobis. *Linn. Spec. 19. (Hall. 550.)*

H. in agris & cultis, vulgatissima. Floret Majo & seq.

Folia *inferiora triloba*. Calycis *foliola cordata, ciliata, aequalia*. Corolla *exigua, carnea*. Capsula *didyma*. Semina 4, magna, hinc convexa rugosa, inde excavata.

18. VERONICA, *triphyllus*, floribus solitariis, foliis digitato-partitis, pedunculis calyce longioribus. *Linn. S. N. 58. Spec. 19. (Hall. 551.)*

H. in agris & arvis *am Dollberg*. Floret Martio, Aprili.

19. VERONICA, *verna*, floribus solitariis, foliis digitato-partitis, pedunculis calyce brevioribus. *Linn. S. N. 58. Spec. 19. (Hall. 552.)*

H. cum præcedente rarius; in arvis *am Rehberg* infrequens. Floret Aprili.

20. VERONICA, *acinifolia*, floribus solitariis pedunculatis, foliis ovatis glabris crenatis, caule erecto subpiloso. *Linn. Spec. 19. (Hall. 574.)*

H. in cultis oleraceis *in der untern Pitze*, rarissima, jam dudum lecta. Floret Majo.

UTRICULARIA. G. P. 31.

Cor. ringens, calcarata. Cal. 2-phyllus, æqualis. Caps. 1-locularis. S. N. 61.

21. UTRICULARIA, *vulgaris*, nectario conico, scapo paucifloro. *Linn. Spec. 26. (Hall. 290.)*

H. in paludibus infra pagum *Sinn*. Floret Julio.

*** Flores *inferi, monopetali, irregulares*.

Fructus *gymnospermii*.

VERBENA. G. P. 32.

Cal. 5-dentatus, unico dente truncato. Cor. infundibuliformis, subæqualis, curva. Sem. 2-f. 4, nuda. (Stam. 2-f. 4.) S. N. 62.

22. VERBENA, *officinalis*, tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule solitario. *Linn. Spec. 29. (Hall. 219.)*

H. in sterilibus, ruderatis, ad vias prope *Burck*, & *Offenbach*; in Horto meo vitium pervulgare. Floret Julio, Augusto.

Pharm. VERBENAE Herba.

A 3

LYCO-

LYCOPUS G. P. 33.

Cor. 4 - fida : lacinia unica emarginata. *Stamina* distantia. *Semina* 4, retusa. S. N. 63.

23. LYCOPUS, *europæus*, foliis sinuato-ferratis. *Linn. Spec.* 30. (*Hall.* 220.)

H. ad fossas ; ad ripas Dilla ; an der Mühlbach , passim. Floret Julio , Augusto.

Semel hanc plantam legi: Caule quadripedali. Floribus omnibus feminis, f. staminibus aestivatis.

**** Flores superi.

CIRCAEA. G. P. 24.

Cal. diphyllus , superus. *Cor.* dipetala. *Sem.* 1. biloculare. S. N. 56.

24. CIRCAEA, *lutetiana*, caule erecto, racemis pluribus, foliis ovatis. *Linn. S. N.* 56. *Spec.* 12. (*Hall.* 813.)

H. in nemorosis in der Hölle, versus Bicken, copiose. Floret Julio, Augusto.

Fructus siliculosus, obovatus, exsiccatus levi pressione basi dehiscens, bivalvis. Semina duo, oblonga, dissepimento proprio, plano affixa.

B. DIGYNIA.

ANTHOXANTHUM. G. P. 42.

Cal. Gluma 2 - valvis, 1 - flora. *Cor.* Gluma 2 - valvis, acuminata. *Semen* 1. S. N. 67.

25. ANTHOXANTHUM, *odoratum*, spica ovato-oblonga, flosculis subpedunculatis arista longioribus. *Linn. Spec.* 40. (*Avena* - *Hall.* 1491.)

H. in pratis, pomariis, inque sylvis, abunde. Floret Aprili & sequent.

- T. II. f. I. Gramen *odoratum*, fœni aroma. Bobus, Ovibus & Equis gratum præbet pabulum. Radix fibrosa, odorata, perennis. Culmi 1-2 - pedales, erecti, binodes, foliati, laeves. Folia radicalia subangusta, supra pubescentia. Folia culmea lanceolata, utrinque subscabra. Ligula obtusa, crenulata. Vagina striata, laeves, inferiores subvillosa, rufescentes. Panicula spicata. Pedunculi fasciculati, brevissimi, subramosi, erecti, ante & post florescentiam coarctati, inferiores remotiores. Corollæ valvulae duæ æquales, parallela, basi coalita, pilosa. *ferrula-*

*ferrulata, semibifida; longitudine Valvulae calycinae (a. A. *) minoris, (nec majoris (r. P. l. c.) V. exterioris Arista ex dorso medio prodit, recta, (X*) calyce brevior, V. interioris Arista juxta basin inserta, geniculata, (X) calyce paulo longior, demum reflexa tortilis, (a. f. f. c.) Nectarii Valvula exterior trinervis, obtusissima: interiorum duplo minorem, uninerviam, amplectens, Germen, Filamentaque includens, tere-tem figuram acquirit. (L. l.)*

Variat. α) Spica duplici f. ramosa; β) Glumis calycinis pubescentibus.

CLASSIS III.

TRIANDRIA

A. MONOGYNIA.

* Flores superi.

VALERIANA. G. P. 44.

Cal. o. Cor. 1 - petala, basi hinc gibba, supra. Semen 1. S. N. 72.

26. VALERIANA, *dioica*, floribus triandris dioicis, foliis pinnatis integerrimis. *Linn. Spec. 44. (Hall. 208.)*

H. in pratis uliginosis, in der Callenbach, & alibi frequens. Floret Majo.

Maris Corolla Pistillo imperfecto sterili, Feminae triplo minor, rudimentis staminum in fundo corollae instructa.

Radix odoratu sequente gratior.

27. VALERIANA, *officinalis*, floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. *Linn. Spec. 45. (Hall. 210.)*

H. in pratis sylvaticis; dumetis, am Rehberg; alibique. Floret Julio.

Pharm. VALERIANAE MINORIS Radix.*

28. VALERIANA, *Locusta olitoria*, floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus. *Linn. Spec. 47. (Hall. 214.)*

H. in agris inter segetes; in cultis ubique vulgaris. Floret Majo.

Hujus folia primaria hyberno tempore in acetaria recipiuntur, vulgo Korn - Lattig dicta.

Corollæ cærulea. Semina nuda, bipartibilia.

29. VALERIANA, *Locusta dentata*, caule dichotomo, floribus triandris, foliis oblongis subserratis, feminis corona tridentata. *Linn. Spec. 48. var. præc. 5. (Hall. 215.)*

H. inter segetes, auf dem Reuterberg frequens. Floret Julio.

Corollæ carnea. Semina hinc convexa enervia, inde angulata, binervia, non bipartibilia. Corona tri-sape 5-dentata, dense intermedio triplo majore.

IRIS. G. P. 59.

Cor. 6-partita: Petalis alternis reflexis. Stigmata petaliformia. S. N. 77.

30. IRIS, *Pseud-Acorus*, corollis imberbibus, petalis interioribus stigmatibus minoribus, foliis ensiformibus. *Linn. Spec. 56. (Hall. 1260.)*

H. in fossis, ad ripas Dilla; an der Mühlbach, frequens. Floret Majo.

Pharm. ACORI PALUSTRIS, f. ADULTERINI (male) Radix.

*** Flores inferi.*

POLYCNUM.

Cal. 3-phyllus. Petala 5, calyciformia. Sem. 1, subnudum. S. N. 74.

31. POLYCNUM, *arvense*, *Linn. Spec. 50. (Hall. 1570.)*

H. in arvis & agris arenosis am Dollberg, inter Solanum tuberosum, lecta 1771, nunc rarissima. Floret Julio Augusto.

Radix annua. Caulis brevis, jam basi in ramos divisus. Rami procumbentes, simplices f. subdivisi, striati, subpilosi, basi interiore callo nodosi, prostrati, unde Nomen. Folia numerosa, subulata, carinata, mucronata. Flores axillares, sessiles, solitarii. Folia calycina constanter duo in nostrate, lanceolata, aristata, corolla duplo longiora. Petala 5, ovata, acuminata. Stamina tria corollæ breviora. Germen intra tunicam filo, ex latere non basi prodeunte affixum. Stylus bifidus, ex latere opposito ascendit membrana apicem perforans, uti in nonnullis Chenopodiis; Stigmata globosa. Semen reniforme punctatum. Capsula tenui membranacea (Herniaria) inclusim, levissima pressione basi demittitur.

**** Flores Graminei, valvulis Glumæ calycinae.*

SCHNE.

SCHOENUS G. P. 65.

Glumæ paleaceæ, univalves, congestæ.

Cor. o. Sem. 1, subrotundum, inter glumas. S. N. 80.

32. *SCHOENUS*, *compressus*, culmo subtriquetro nudo, spica disticha, involucri monophyllo. *Linn. Spec.* 65. (*Scirpus* Hall. 1342.)

H. in pratis uliginosis hinter dem Homberg. Floret Majo.

- T. I f. I. Radix horizontalis, teres, articulata, Geniculis setosis. Culmi spithamai s. pedales, erecti, inferne squamati, subfoliati, ultra medium nudi, compresso-teretes, læves, infra spicam triquetri, scabri. Folia vaginantia, canaliculata, lævia, apice scabra, superiora culmo florenti longiora, Involucri Folium basi latiuscula amplectente, setaceum, triquetrum, scabrum, spica vix longius. (b) Spicæ Rachis flexuosa, compressa. Spiculæ 9-11-13, alterna, disticha, ovato-oblonga, (a. c.) ferruginea, 7-9-flora: Singula Calyx proprius univalvis, convexus, subtrinervius, acutus. (a) Corollæ univalves, (c) sub lanceolata, planiuscula, uninervia, angustiores, calycis longitudine: (a. c.) Receptaculo brevi, tereti, absque ordine adfixa. Singula Filamenta 3, supra Antheras immucronem producta. (M*) Germin Receptaculo proprio, truncato adnatum. (n.) Stylus longitudine corolla. Stigma bifidum, cirrhosum, pubescens. (o) Semen triquetrum, (f.) setis sex scabris (⊙) obvallatum.

CYPERUS. G. P. 66.

Glumæ paleaceæ, distiche imbricatæ. Cor. o.

Sem. 1, nudum. S. N. 81.

33. *CYPERUS*, *fuscus*, culmo triquetro nudo, umbella trifida, pedunculis simplicibus inæqualibus, spicis confertis linearibus. *Linn. Spec.* 69. (*Hall.* 1349.)

H. in fossis, & pratis uliginosis, infra pagum Simm, rarius. Flor. Jul.

- T. I. f. 2. Radix fibrosa, annua? Culmi spithamai, foliis 2, s. 3. vaginantibus ad basin vestiti, subnudi, triquetri, læves. Folia radicalia carinata, lævia, longitudine culmi. Folium involucri inferum, culmo fere longius, duo reliqua umbellam superantia, saepe quantum brevissimum. Pedunculi triquetri, basi vaginati; (*) intermedius brevissimus, spiculis obiectus. Spiculæ lanceolato-lineares, compressa, e fusco nigricantes, 9-11-13-flora. Glumæ carinata, acuta. (c) Stylus bi s. trifidus. Semen nudum (f)

SCIRPUS. G. P. 67.

Glumæ paleaceæ, undique imbricatæ. *Cor.* o.

Semen 1, imberbe. *S.N.* 82.

84. *SCIRPUS*, *palustris*, culmo tereti nudo, spica subovata terminali. *Linn. Spec.* 70. (*Hall.* 1336.)

H. in fossis, paludibus, ad ripas *Dilla* frequens. Floret Majo & sequ.

T. I. f. 3. Radix obliqua, teres, articulata, subrepens, squamata. Culmi 1-2-pedales, erecti, striati, teretes, laeves, nudi, fardi: Vaginis ad basin vestiti obtusis, aphyllis, summa longiore truncata. Folia radicalia culmo simillima breviora, acuta. Spica ovato-oblonga, acuta, magnitudine varia, Squamis imbricata acutis: (c) quarum infima dua opposita, latiores, obtusiores, (b) fructificatione destituta. Germin apice productum, gibbum (N.) Stylus semper bi- (nec 3-) fidus. (o) Semen setis quatuor, calyce brevioribus, cinctum. (S.) Suibus recens gratissimum pabulum.

35. *SCIRPUS*, *setaceus*, culmo nudo setaceo, spicis lateraibus subsolitariis sessilibus. *Linn. Spec.* 73. (*Mariscus* *Hall.* 1345.)

H. in rivulis pratorum *hinter dem Homberg*; locis inundatis *bey der untern Walckmühle*; & alibi frequens. Floret Julio.

T. I. f. 6. Radix horizontalis, fibrosa. Culmi palmares, spithamei, erecti, ad basin squamati, subfoliati, dein nudi, teretes, laeves, acuti. Folia subvaginantia, setacea, canaliculata, larvia. Spiculæ 1 f. 2, rarius 3, ovata, exigua, pauciflora: ex culmi fissura laterali, infra apicem rectum erumpentes; florentes sessiles, (☉) inferior (fidua) maturo semine pedunculata. Pedunculo brevi horizontali. (✚) Glumæ subpurpurea, nervo viridi. (c) Semen hinc convexum, striatum, inde planum, nudum s. villis destitutum (f. S.)

36. *SCIRPUS*, *sylvaticus*, culmo triquetro folioso, umbella foliacea, pedunculis nudis supradecompositis, spicis confertis. *Linn. Spec.* 75. (*Hall.* 1340.)

H. in pratis udis, secus rivulos passim. Floret Junio, Julio.

T. I. f. 4. (Umbellæ pedunculus.) Radix lignosa, teres, descendens. Culmus 1-2-pedalis, erectus, foliatus, subtrigonus, laevis. Folia latissima, carinata, apice producto obtusiusculo, colorato: marginibus carinaque hispida. Folia umbella subiecta alterna, consimilia. Umbella supradecomposita, maxime multiflora. Pedunculi numerosi, inæquales, subtrigoni, ad basin vaginati, bracteati.

Spicu-

Spiculae exiguae, ovatae, solitariae, & confertae sessiles & pedicellatae, e fusco-nigricantes. Semen villis 4 f. 6. brevibus cinctum. (1. S.)

ERIOPHORUM, G. P. 68.

Glumae paleaceae, undique imbricatae.
Cor. 6. Semen 1, Lana longissima cinctum.
S. N. 84.

37. ERIOPHORUM, *polystachion*, culmis teretibus, foliis planis, spicis pedunculatis. *Linn. Spec.* 76. (Hall. 1331.)

H. in pratis uliginosis, hinter dem Homberg, im Guldners Grund; alibique. Floret Majo.

- T. I. f. 5. Radix lignosa, teres. Culmus ultrapedalis, erectus, foliatus, subtrigonus, laevis, subtrinodis. Folia culmi 3, f. 4, vaginantia, lanceolato-acuminata, latiuscula, plana, laevia. Involucrum monophyllum, persistens, (b) subulatum, subcarinatum, antrosum obliquum, demum erectum: basi ventricosa, striata, spicas amplectens. Bractae tot quot pedunculi, involucri similes, gradatim minores, deciduae. (b*) Pedunculi alterni, inaequales, basi vaginati, breves, dein longiores. Spicae florentes ovatae, erectiusculae, subnuda, maturo semine oblongae, pendulae, villis occultatae. Glumae ovatae, acutae, nervo nullo, (c) dein majores (c*) Semen villis decuplo longioribus, albis, (per lenscem) linearibus, planis, simplicibus, cinctum. (S. c.)

NARDUS G. P. 69.

Cal 0. Cor. 2-valvis. S. N. 84.

38. NARDUS, *stricta*, spica setacea recta secunda. *Linn. S. N.* 84. *Spec.* 77. (Hall. 1410.)

H. in pratis sterilibus, ad pagos Mademühlen & Rehe; in udis infra Sinn. frequens. Floret Julio.

- T. I. f. 7. Radix densa, fibrosa, perennis. Culmi spithamei, pedales, erecti, stricti, nudi, subangulati, subpubescentes, scabriusculi: unico Geniculo prope basin, & uno Foliolo brevi, setaceo, supra basin instructi. Folia radicalia numerosa, longa, filiformia, subsc-

subscabra, erecta, inferiora ad angulum obtusum discedentia. Ligula ovata, prominula. Vaginæ folior. membranacea, albida, inferiores aphylla. Spicæ Rachis hinc convexa, inde excavata, marginibus alternatim dentatis, scabris, pro flosculorum insertione; (y) apice supra flosculos in mucronem setaceum, brevem, producta. (†) Flosculi subviolacei, pubescentes alterni, per paria magis approximati, secundi, erecti, subflorescentia discedentes. (c. C.).

B. DIGYNIA.

* Flores uniflori, vagi.

PANICUM. G. P. 76.

Cal. 3 - valvis: valvula tertia minima.
S. N. 86.

39. PANICUM, *glaucom, spica tereti, involucellis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus undulato-rugosis. Linn. S. N. 86. Spec. 83.*

H. in arvis am Dollberg; jam dudum repertum, nunc rarissimum Gramen. Floret Julio.

T. II. f. 2. †. Radix *fibrosa, annua. Culmi pedales, erecti, foliati, (†) quadrinodes, apice sulcati, læves. Folia latiuscula, (††) plana, lævia: (†††) summo spi-*

ca

† CULMUS:

- | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Nudus . . . | <i>si basi tantum</i> | } Foliorum Vaginis vestitus. |
| 2. Subnudus . . . | <i>si quarta pars inferior</i> | |
| 3. Subfoliatus . . . | <i>ad medium usque</i> | |
| 4. Foliatus . . . | <i>si magna ex parte</i> | |

†† LATITUDINEM foliorum graninum determinavi:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------|
| 1. Capillaria; Filiformia; Setacea: | <i>angustissima, lateribus involutis f. conduplicatis, supra sulco exarata.</i> | } lata. |
| 2. Augustissima, | <i>Lineam dimidiam</i> | |
| 3. Angusta . . . | <i>Lineam unam</i> | |
| 4. Subangusta . . . | <i>Lineas duas</i> | |
| 5. Latiuscula . . . | <i>Lineas tres</i> | |
| 6. Lata . . . | <i>Lineas quatuor</i> | |
| 7. Latissima . . . | <i>Semipollicem & ultra</i> | |

††† Folia lævia, omni scabritie pagina superiore & inferiore (nec marginibus) destituta.

ca saepe longiore. Ligulae loco, Pili conferti, albidii, longi, inprimis ex infimis vaginis longius prominentes. Vaginae striata, laeves. Spica sequentis: Flosculis in series dispositis, triplo majoribus, subseffilibus, solitariis, geminisque, & Setis demum flavis brevioribus, (b) quam in P. viridi composita. Calyx nervosus pubescens. (A. *. **. ***) Corolla Calyce minor. (c. C.) Petalum tertium ovatum, acutum, planum, (†) inter Cal. valvulam planiorem, & Corollae valvulam interiorem; secundi flosculi forte rudimentum. Semen striis transversis, undulatis rugosum. (f. S.)

40. PANICVM, viride, spica tereti, involuclis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus nervosis. Linn. Spec. 83. (Hall. 1542.)

H. in agris & arvis am Dollberg & Homberg frequens; in cultis am Sieghaus, rarius. Floret Julio, Augusto.

- T. II, f. 2. Radix annua. Culmi 1 - 1½ pedales, obliqui, foliati, trinodes, apice striati, scabri. Folia latiuscula, pagina superiore scabra. Ligulae loco, series pilorum brevium, decurrens. Vaginae subcompressa, laeves. Spica ovato-cylindracea, inaequali crassitie, viridis, uno latere saepe subviolacea. Pedunculi brevissimi, Pedicellis vix conspicuis, nodoso-truncatis, flosculos per paria (3 f. 4.) adfidentes. (γ. b.) Singulum par Setis pluribus albidis s. violaceis, Flosculis quadruplo longioribus involuclatum. (b) Calyx laevis. Valvula minor 3-nervia; (*) huic opposita triplo major, margine tertiam amplectens, convexa, 7-nervia. (**) tertia plana, 5-nervia. (***) Semen nervosum nitidum. (f.) Petalum Corollae tertium in precedente, sequente, & P. miliaceo semper praesens, in hoc nullum.

41. PANICVM, Crus Galli, spicis alternis conjugatisque, spiculis subdivisis, glumis aristatis hispidis, rachi quinquangulati. Linn. Spec. 83. (Hall. 1544.)

β. Gromen panicum spica divisa, aristis longis armata. Bauh. Pin. 8.

H. α , Flosculis vix aristatis, in cultis auf dem hinter Sand;
 β , Aristis longissimis, humentibus locis an der Mühlbach,
 bey dem Sieghaus - Brücken, frequens. Floret Julio, Augusto.

T. II. f. 3. Radix annua. Culmi 1 - 2 pedales, crassi,
 obliqui, suberecti, ramosi, Ramis floriferis, foliatis,
 apice nudi, laeves: Articulis 3, f. 4, inferioribus
 divaricatis; Geniculis incrassatis, cylindraceis,
 fuscis. Culmi Folia latissima, plana, utrinque levia,
 marginibus hispida. Ligulae loco, membrana brevis,
 triangularis, adnata, fusca. Vaginae laxa, subcom-
 pressa, fissa, laeves; inferiores acutae, aphyllae. Ra-
 chis universalis linearis, planiuscula, scabra: sub-
 tus angulo unico vix eminente, duobus lateralibus
 acutioribus, & supra unico, sulco diviso, eminenti-
 ori, pro ramorum insertionem, instructa. Spicae al-
 ternae, rarius conjugatae, subsecunda, subdivisa, ter-
 minali simpliciore. Rachis partialis trigona, subfle-
 xuosa, subdivisa: ad basin pilis fasciculatis, albi-
 dis, involucreta. Flosculi conferti, secundi: Pedun-
 culis brevissimis, subdivisis, ad basin fasciculato-
 pilosis, (in var. β , manifestius.) (y. b.) adfixi.
 Calyx nervosus, pubescens, scaber; Valv. minor (*)
 & convexa (**) mucronata; Tertia plana arista-
 ta: (***) Arista terminali, scabra, recta, in var.
 α , brevi. (a.*** X) in β , gluma decuplo longiore.
 (a. f. \pm) Petalum corollae tertium membranaceum,
 planum, acuminatum, (c*) inter calycis valv.
 planiorem & cor. V. interiorem. (A. C*)

42. PANICUM, sanguinale, spicis digitatis basi interio-
 re nodosis, flosculis geminis muticis, vaginis-
 foliorum punctatis. Linn. Spec. 84. (Digitaria
 Hall. 1526.)

H. in arvis arenosis hinter dem schloß; am Dollberg & Homberg,
 frequens. Floret Julio, Augusto.

T. II. f. 6. Radix annua. Culmi foliati, laeves, Arti-
 culis tribus: inferioribus duobus procumbentibus, su-
 premo obliquo longissimo. Ex Geniculis Rami florife-
 ri. Folia latiuscula, breviora, sublaevia, leviora.
 Ligu-

Ligula crenulata. Vaginæ subcompressa, sanguinea, laves, punctata: punctis eminentibus, solitariis confertisque, setiferis, vix conspicuis. Spicæ 3-4 f. 5, lineares, alterna, brevissime pedunculata. Culmo inter spicas lineari-trigono, flexuoso, mediante callo axillari, pilifero, (*) inserta: ex vaginis erumpentes erecta, parallela; (†) florentes horizontales, terminali erecta. Rachis (γ) linearis, subflexuosa, plana, scabra, supra nervo eminenti, pro Flosculorum insertionem instructa. Flosculi latere convexo Rachi adpressi, (γ.) gemini, saepe terni in singulo dente, pedunculati: Pedunculo infimo, Flosculo brevior, secundo ejusdem longitudinis, tertio (si adest,) longior. Calyx muticus, pubescens. (aA) Valv. minima (vix lente dignoscenda, sapisime omnino nulla,) triangularis, trinervia. (A*) Secunda huic opposita, obtusa, tertiam margine amplexens, subconvexa 5-nervia; Tertia plana, trinervia, acuta, subviolacea. Corolla calyce minor. (c.C) Stigmata purpurea. (o) Semen, rufum nitidum. (f.S.)

ALOPECURUS. G. P. 78.

Cal. 2-valvis. Cor. univalvis. S. N. 89.

43. ALOPECURUS, *pratensis*, culmo spicato erecto, glumis villosis, corollis muticis. Linn. S. N. 89. Spec. 88. (Hall. 1539.)

H. in pratis ubique copiosissime. Floret Majo & sequ.

- T. II. f. 4. Radix multiplex, fibrosa, perennis. Culmi 1-2-pedales, erecti, trinodes, foliati, laves. Folia lata, levia. Ligula ovata, obtusa. Vaginæ laves, suprema longissima, ventricosa. Spica ovato-cylindrica. Flosculi imbricati. Rachis glabra. Pedunculi brevissimi, congesti, subramosi, tri-quadriflori. (†) Calycis Valvulae basi connata, hinc convexa, inde depressa, trinervia, pubescentes, acuta; carina pilis albidis, planis, flexuosis, patulis, ciliata. (A.) Cor. Valvula compressa, 5-nervia acuta, nuda, vix calyce brevior: Aristam juxta basin exserens

serens geniculatam, duplo longiorem (X c. C.)
Antheræ carulescentes, flava, dein cinerea. Robus
bonum prabet pabulum.

Variat: Culmo *orgyali*; Spica 4-5-pollicari, *crassa*,
subinterrupta, Glumis *majoribus, villosioribus*; Pe-
dunculis longioribus, multisfloris. Ad ripas Dilla
frequens. Floret serius Julio, Augusto.

44. *ALOPECURUS, agrestis, culmo spicato erecto,*
glumis lævibus. Linn. S. N. 89. Spec. 89. (Hall.
1540.)

H. in agris inter *Hordeum*, am *Galgenberg*, rarius. Floret
 Junio.

- T. II. f. 5. *Radix annua. Culmus 1 - 1 ½ pedalis, ere-*
ctus, subtrinodis, foliatus, apice nudus, subscaber.
Folia subangusta, supra scabra. Ligula obtusa. Va-
ginæ carinali nervo scabra, superior subventricosa.
Spica teres, gracilis, longa, levis. Flosculi laxè
imbricati, brevissime pedunculati, solitarii, gemini,
terni. Pedunculi simplices s. indivisi. Calycis Val-
vulæ nudæ, ultra medium basi connata, superne la-
ziores, acutæ, subviolaceæ, (a A.) carina setis bre-
vissimis, erectis, ciliatæ. Cor. Valvula obtusa.
(c. C.) Arista ex basi prodit duplo longior, geniculata,
divaricata. Filamenta brevissima, basi lanceolata,
(m) subflorescentia calyce longiora, aequalia. (m)*

45. *ALOPECURUS, geniculatus, culmo spicato infracto,*
corollis muticis. Linn. S. N. 89. (Hall. 1541.)

H. in pratis udis, stagnis, & fossis aqua repletis, passim.
 Floret Junio & sequ.

- T. II. f. 7. *Radix fibrosissima, perennis. Culmi pedales,*
obliqui, adscendentes, foliati; Articulis 5 - 6, di-
varicatis; in fossis & aquis quietis, tri-quadripe-
dales, ramosissimi, Articulis, foliisque numerosiori-
bus, natantes. Folia latiuscula, plana, pagina supe-
riore scabra. Ligula oblonga, obtusa. Vaginæ subcom-
pressa, laxa, levis, suprema spicam sæpe attingens,
ventricosa. Spica cylindrica, florens ex viridi-vio-
lacea. Flosculi densius imbricati, A. pratensis duplo
mino-

minores. Pedunculi exigui, subramosi, 3 - 5 - flori. (+) Calyx magis hians. Valvulae vix supra basin connatae, pubescentes, carina ciliata, marginibus repandis. (A) Cor. Valvula trinervia, nuda, obtusissima, crenulata. (c. C) Arista geniculata, calyce sesquialongior. Antherae violaceae, exiguae. (m) Styli basi connati. (N)

PHLEUM. G. P. 77.

Cal. 2 - valvis, sessilis, linearis, truncatus, apice bicuspidato. Cor. inclusa. S. N. 88.

46. PHLEUM, *pratense*, spica cylindrica longissima ciliata, culmo erecto. Linn. S. N. 88. Spec. 87. (Hall. 1528.)

H. in pratis humentibus frequens; Spica semipedali *unter der neuen Brücke* rarius. Floret Julio.

T. III. f. 1. Radix ramosa, perennis. Culmus 3 - f. 4 - pedalis, basi bulbosus, erectus, strictus, quadrinodis, foliatus, laevis. Folia lata, patentia, pagina superiore carinaeque scabra. Ligula oblonga, obtusa, fissa. Vaginae striatae, laeves, nervo carinali scabra. Spica saepe semipedalis exacte cylindrica, obtusissima. Flosculi densissime conferti, florentes divergentes. Pedunculi brevissimi, (per lentem) subramosi: Pedicellis vix conspicuis, basi conjunctibus, bifloris. (+) Cal. Valvulae punctatae, punctis setiferis, trinerviae, compressae, cuspidatae, Carina ciliata setis albidis, patulis, flexuosis, alternis brevioribus, superioribus furcatis. (a A) Cor. Valvula exterior 5 - nervia, nuda, acutiuscula, crenulata. (C.) Nectaria duo, ovata, acuminata (l. L.) Germen (n) basi ambientia. (L.) Antherae violaceae, dein cinerea. Equis gratissimum pabulum.

47. PHLEUM, *nodosum*, spica cylindrica, culmo adscendente, foliis obliquis, radice bulbosa. Linn. S. N. 88. Spec. 88. (Hall. 1530.)

H. ad versuras, *auf dem Schlüssel*; in campis sterilissimis, *auf dem Homburg*, & alibi frequens. Floret Julio.

T. III. f. 2. Radix ex Bulbis constat pluribus, concatenatis, tumecatis, fuscis, basi fibrosis. Singuli Bulbi Culmus solitarius, semi- & pedalis, vaginae foliorum obtectus, articulis infimis 5 l. 6, divaricatis obliquis, reliquis 2 f. 3 longioribus, erectis. Folia bifaria, obliqua, angusta, utrinque scabra. Ligula truncata, semimultisida. Vaginae subcompressae, subscabrae, suprema spicam fere attingens subventricosa: Foliolo brevi (saepe) ova-

ro- acuto, instructa. Spica *precedentis*, magis scabra, 1-1½. pollicaris; Solo sicciori ovalis, vix semipollicaris. (†). Flosculi duplo minores, (a A) infimi semper emarcati steriles. Calycis cuspides maturo emine magis incurva. (a. f.) Antheræ albida, erumpentes rufa.

Gramen hoc solo cespitoso pinguiori transplantatum, subsequenti anno in P. pratense transit.

PHALARIS. G. P. 74.

Cal. 2- valvis, carinatus, longitudine æqualis, corollam includens. S. N. 85.

48. PHALARIS, *canariensis*, panicula subovata spiciformi, glumis carinatis. *Linn. Spec. 79.*

H. in cultis auf dem Schießplatz rarius, incerta civis exoticæ originis. Floret Julio.

- T. VII. f. 3. †. Calyx exterior membrana carinali auctus, corolla major. (†. a.) Cal. interior etiam bivalvis, basin corollæ vestiens, minor, (a *) cum corolla pubescens. (c)

49. PHALARIS, *arundinacea*, panicula oblonga ventricosa ampla. *Linn. S. N. 86. Spec. 80.*
(*Arundo. Hall. 1524.*)

H. ad ripas Dilla frequens. Floret Junio, Julio.

- T. VII. f. 3. Radix crassa, lignosa, fibrosa. Culmus *orgyalis*, erectus, firmus, foliatus, 5-6- nodis, lavis. Folia bifaria, latissima, plana, lavis, superne versus apicem scabra; ad basin utrinque aucta membrana cartilaginea, albida, acutiuscula. Lingula crenulata. Vaginæ striatæ laeves. Panicula in spica formam coarctata, semipedalis: florens ventricosa, mutica, variegata colorata. Pedunculi depressi, gemini s. terni. inferiores basi coaliti, squamula acuta bracteati. Flosculi imbricati, secundi, sub florescentia pedicellis brevissimis divergentes. Cal. Valvula exterior paulo minor. (a A) Corolla basi pilosa. (c. C.) Antheræ rubra. Styli basi connati. (N. O.) Nectaria 2, lanceolato-acuminata, (l. L.) margine exteriori unidentata. Gramen nostratum fere maximum, ter metendum, ut gratus evadat pecoribus. Var. viviparam: Panicula spicata, Petalis in foliola excrecentibus, sape legi an der Dille.

MILIUM. G. P. 79.

Cal. 2- valvis, uniflorus. * Cor. brevissima. Stigmata penicilliformia. S. N. 89.

50. MILIUM, *effusum*, floribus paniculatis dispersis muticis. *Linn. Spec. 90. (Hall. 1525.)*

H.

H in sylvis, in der Hölle frequens. Floret Junio.

- T. VIII. f. 7. Radix fibrosa. Culmus 2 f. 3-pedalis, erectus, binodis, subsiliatus, lavis. Folia latiuscula, plana, utrinque scabra. Ligula oblonga, truncata. Vaginæ striata, laves. Panicula semipedalis, laxa, patens. Pedunculi capillares, subramosi, flexuosi, ad basin nodosi. exiguis squamulis bracteati, horizontales demum relexi. Calycis valv., exterior ventricosior, latior: utraque trinervia, glabra. (a. A.)

AGROSTIS. G. P. 80.

Cal. 2-valvis, uniflorus, corolla paulo minor. Stigmata longitudinaliter hispida. S. N. 90.

a. Aristata.

51. AGROSTIS, spica venti, petalo exteriori arista recta stricta longissima, panicula patula. Linn. S. N. 90. Spec. 91. (Avena, Hall. 1480.)

H. inter segetes in der Aue, alibi copiose. Floret Julio.

- T. III. f. 1. Radix annua. Culmus 3 f. 4-pedalis, foliatus, quadrinodis, lavis. Folia lata, patula, pagina superiore pubescentia, inferiore scabra. Ligula longa, truncata, fissâ. Vaginæ striata, subscabra. Panicula anpla, pedalis, patens, colorata, demum subnutans. Pedunculi verticillati, numerosi, patentes, compressi, scabri. Calyx lavis, apice scaber: (a A) Valv. exterior paulo brevior. Corollæ V. exterior figura & magnitudine V. Cal. interioris: (C.) Aristam paulo infra apicem exserens rectam, quadruplo longiorem. (X) Nectaria ovata, acuta. (l. L.)

52. AGROSTIS, canina, calycibus elongatis, petalorum arista dorsali recurva, culmis prostratis subramosis. Linn. S. N. 90. Spec. 92. (Avena, Hall. 1479.)

H. in pomariis & pratis ficcioribus hinter dem Schloß; in humidioribus im Gildners-Grund; & alibi frequens. Floret Julio.

- T. III. f. 2. Radix subrepens. Culmi 1-2 pedales, erecti, foliati, laves, infimis articulis procumbentibus, divaricatis; Geniculis 4 f. 5: ex inferioribus fasciculi foliorum breves, saepe Rami floriferi. Folia radicalia angustissima, longa, plana, lavis: Culmea latiora, utrinque scabra. Ligula oblonga, fissâ, prominens. Vaginæ laves, suprema longissima, scabra. Panicula elongata, coarctata; florens diffusa, & violaceo-purpureascent, splendensque, demum pallescens. Pedunculi numerosi, capillares. Calycis V. exterior apicem versus hispidiuscula.

B 2.

(a A)

(aA) Corolla calyce minor, dorso hispida, apice trifida. Aristata ex dorso medio prodis, alba, recta, demum geniculo fusco repleta, tortilis, (C.S.N.) Corolla duplo longior. Cor. V. interior sapissime omnino nulla: Si adest, minutissima, apice retusa; (C*) si deficit. Ovarium basi interiori adnatum, Nectariis 2, triangularibus antice cinctum. Antheræ carnea.

b. Mutica.

53. AGROSTIS, *stolonifera*, paniculae ramulis patentibus muticis, culmo repente, calycibus æqualibus. Linn. S. N. 90? Spec. 93? (Poa. Hall. 1473?)

H. in sylvis, locis umbrosis muscosis, im Beilstein; am Homberg, frequens. Floret Julio.

- T. II. f. 6. Culmi plures, erecti, tenuis, infirmi, pedales: Articulis inferioribus divaricatis repentibus basi subbulbosa coherentes, ramosi. Folia culinea angusta, plana, debilia, larva, plerumque emarcida. Ligula brevis, obtusa. Vaginæ laxa, laeves. Panicula 2-3-pollicaris, laxa, divaricata, pauciflora, mutica. Pedunculi capillo fere tenuiores, horizontales, recti. Pedicelli breves, undulato-divaricati. Flosculi omnium nostratum minimi, albi. Calyx subaqualis: V. exter. dorso, interior basi scabra. (A.) Cor. V. exterior calyce paulo brevior, basi subpilosa, apice trifida. (C) V. interior $\frac{1}{3}$ brevior. (C*) Totum gramin albescent. An Var. A. alba? an sequentis?

54. AGROSTIS, *capillaris*, panicula capillari patente, calycibus subulatis æqualibus hispidiusculis coloratis, flosculis muticis. Linn. Spec. 93. (Poa. Hall. 1475.)

H. in pomariis, pratis, & ad versuras passim. Floret Julio.

- T. III. f. 3. Radix subrepens. Culmi obliqui, florentes erecti, foliati, 3f. 4-nodes, 1f. 2 pedales. Folia latiuscula, utrinque scabra. Ligula brevis, truncata. Vaginæ laeves, plerumque purpureæ. Panicula 3-4-5-pollicaris, patens, e spadiceo-purpurascens, demum pallescens. Pedunculi verticillati, capillares, ramosissimi, patentes. Calyx aequalis, mucronatus, e violaceo-purpureus, albido-marginatus, nervis viridibus: V. exterior dorso aeniculato tota, interior apice tantum hispida. (A) Corolla calyce paulo minor, apice trifida, lavis. (C) Antheræ albida. Hujus Varietatem viviparam annuatim legi, in montosis sterilibus am Homberg: Calycibus duplo majoribus; Corollis in foliola subulata excrecentibus. (†)

55. *AGROSTIS, alba*, panicula laxa, calycibus mucicis æqualibus. *Linn. Spec. 93 ? (Poa, Hall. 1475 ? Var. major, præcedentis.)*

H. in fossis, & locis fabulosis inundatis, auf der Burgermeister Wieje; unier der neuen Brücke. Floret Julio.

- T. III. f. V. Culmi 2-3 pedales, erecti, foliati, articulis pluribus, infimis repentibus, coherentes, ramosi. Folia latiuscula, utrinque scabra. Ligula oblonga, obtusa, prominens. Vagina læves, internodia vix semitegentes. Panicula semipedalis, coarctato-patula, mutica. Verticilli densi, subremoti. Pedunculi numerosi, suberecti, flexuosi, mutici: Pedicellis brevissimis, divaricatis, copiosissimisque flosculis, ad basin confertioribus, undique obiecti. Flosculi albi, dein flavescentes. Calycis Valvula sub anthesi horizontaliter discedente. (A) Corolla erecta, subventricosa, apice trifida, Calyce brevior. (C.) Varietas Agr. capillaris.

56. *AGROSTIS, dubia*, calycibus æqualibus lævibus, corollis infra apicem mucronatis, foliis fetacis. (*Poa. Hall 1476 ?*)

H. in montosis apricis am Homberg. Seinel jam dudum lectum. Floret Julio.

- T. III. f. 4. Radix subrepens. Culmi pedales, adgregati, adscendentes, erecti, subfoliati, binodes. Folia radicalia angustissima, setacea, apice scabra. F. culmea brevia, setacea, scabra, Vaginis lævibus, Ligula obtusa. Panicula 1-2-pollicaris, angusta, subcoarctata. Pedunculi breves, solitarii, inferiores terni. Calyx spadiceo-virens, lævis. (A) Corolla dorso scabra, apice bifida, mucrone brevi extante infra apicem instructa. (C) V. interior $\frac{1}{2}$ brevior, retusa. Var. Ag. canina?

DACTYLIS. G. P. 86.

Cal. 2-valvis, compressus: altera valvula majore, carinata. S. N. 95.

57. *DACTYLIS, glomerata*, panicula secunda glomerata. *Linn. Spec. 105. (Bromus. Hall. 1512.)*

H. in pratis, & ad versuras passim. Floret Junio & seq.

- T. III. f. 3. Radix multiplex, fibrosa, perennis. Culmi 2-3 pedales, erecti, foliati, quadrinodes, superne nudi scabri. Folia lata, patentia, subglauca, utrinque scaberrima. Ligula oblonga, obtusa, fissa. Vagina subcompressa, acute carinata, scabra. Panicula subspicata, coarctata, florens secunda; saepe

colorata. Pedunculi solitarii, alterni, angulati, firmi, subpubescentes, scabri, basi interiore nodosi, bis 1. ter bifidi: quorum inferior (rarius duo) remotior longior, patens, demum horizontalis, subreflexus. Spiculae subsessiles, geminatim glomeratae, oblongae, obtusissima, bi- (**) tri (***) rarius quadristorae, (†) adpressa, florentes divergentes. Calyx pubescens, saepe ciliatus, carinatus, scaber, subaristatus: hinc convexus latior, (†) inde depressus duplo angustior, (‡) corolla tenuior; V. interior duplo major, aristata, flosculos si duo adequans, si plures ipsa spicula brevior. Flosculi scabri, albidomarginati, obtusi: Arista terminalis brevis, in ultimo flosculo brevissima, saepe nulla. (c.) Cor. V. interior vix brevior, apice acute bifida. (C*) Nectaria 2, lanceolato-acuminata. (L) Filamenta corolla duplo longiora. (m) Antherae flavae. Germen ovatum, (n) Stigmata plumosa. (o) Semen oblongum sulco brevi sub apice notatum (S.) discedens, (c. f.) Durissimum dat pabulum; Equis vix pecoribus prodest. Canibus folia instante pluvia deglutientibus, vomitorium.

** Flores biflori, vagi.

AIRA. G. P. 81.

Cal. 2-valvis, 2-florus. Flosculi absque interjecto rudimento. S. N. 91.

a. Mutica.

58. AIRA, caerulea, panicula coarctata, floribus pedunculatis muticis convoluto subulatis, foliis planis. Linn. S. N. 91. Spec. 95. (Arundo, Hall. 1518)

H. in pratis humidis, oben im Fischweyer-Grund. Floret Augusto.

- T. III. f. 7. Radix subbulbosa, vaginis tunicata, fibras ex basi emittens tenacissimas. Singuli Bulbi Culmus 1-2-pedulis, subfoliatus, unico geniculo juxta basin interceptus, dehinc longissime enodis, erectus, strictus, nudus, levis. Folia radicalia ultrapedalia, angusta: Culmea latiuscula, longa, plana, firma, striata, apicem versus involuta, laevia, supra marginibusque (saepe) subvillosa. Ligulae loco, series villorum brevium. Vaginae striatae, laeves. Panicula elongata, coarctata, triquadripollicaris, Calycibus bifloris; (1-2) humidiori & fertiliori solo saepe ultrapedalis, Calycibus 3-floris. (3) Pedunculi plures, longi, erecti, flexuosi, Pedicellis brevibus uni s. bifloris. Calyx inaequalis, corolla minor: Valvulis violaceis, uninerviis. (Aa) Corolla trinervia, violacea, marginibus involutis. (cC.) Stylus

Stylus inter flosculos, ex pedicello elongato, nudus, (y*) saepe flosculo imperfecto instructus. (Y*) Nectaria duo, apice crenata. (L.) Antheræ atro-caruleæ. Styli basi nudi, reflexi. Stigmata plumosa, purpurea. (O) Semen oblongum, subfusum. (c. f.)

b. *Aristata*.

59. *AIRA*, cespitosa, foliis planis, panicula patente, petalis basi villosis aristatisque: arista recta brevi. *Linn. Spec. 96. (Avena. Hall. 1487.)*

H. in pratis copiosissime. Floret Junio, Julio.

- T. III. f. 8. Radix multiplex, fibrosa Culmi 3 f. 4 pedales, erecti, stricti, subfoliati, binodes, laves. Folia plana, firma, subtus lavis, pagina superiore epidermate plicato acutissimisque densiculis armato septemsulcata, omnium nostratum scaberrima: Fol. radicalia angusta juniora conduplicata; Fol. culmea latiuscula, patentia. Ligula oblonga, obtusa, suprema bifida. Vagina striata, laves, Panicula pedalis, patens, subscabra, splendens. Internodia semiteretia scabra. Pedunculi verticillati, basi in nodum coaliti, angulati, ramosissimi. Calyx inaequalis. (a A) Corolla inferior basi nuda; (C. †) Superior minor, basi pilosa, (C. X) pedicellata, Pedicello demum elongato, supra calycem prominens. (C) Cor. V. exterior calyce brevior, 3-f. 5-nervia, apice 3-f. 5-fida, obtusa. (C) Arista ex basi prodis recta, corolla vix longior. (X) Nectaria 2, ovata. (L) Stylus inter flosculos, absque rudimento tertii. (C. y. *) Var. Calycibus tri & quadrifloris (3. 4.) saepe legi in pratis humentibus, hinter dem Homberg. Serius florens, Augusto

60. *AIRA*, flexuosa, foliis setaceis, culmis subnudis, panicula divaricata, pedunculis flexuosis. *Linn. Spec. 96. (Avena. Hall. 1486. var. β.)*

H. in sylvaticis montosis, muscosis Am Homberg rarius; am Beilstein, copiose. Floret Julio.

- T. V. f. 1. Radix ramosa, fibrosa, perennis. Culmi 1-2 pedales, subfoliati, erecti, 2-f. 3-nodes, laves. Folia setacea: radicalia vaginis a bidis nitidis, varie curvata, lavis, culmea recta, subscabra. Ligula ovata, obtusa, bifida. Vagina subscabra, rufescentes. Panicula pauciflora. Pedunculi & Pedicelli gemini, angulati, divaricati, cum internodiis flexuosi. Glumæ subfusca, nitentes. Calyx inaequalis. (a A) Flosculus inferior sessilis, superior brevissime pedicellatus; uterque albidus, 4-nervius, basi pilosus, apice quadrifidus: (c. C.) Aristam supra basin exserens rectam, dein geniculo reflexam, tortilem, (X c. f.) corolla paulo longiorem. Valv. inerior vix brevior. (C*)

61. *AIRA*, *montana*, foliis setaceis, panicula angustata, flosculis basi pilosis aristatis: aristâ tortili longiore. *Linn. Spec.* 96? (*Avena* - *Hall.* 1486. var. α .)

H. in montosis apricis, in *Beilstein* copiose. Floret Junio.

- T. V. f. 2. Specimina mea certe precedentis sunt varietates: Foliis radicalibus longioribus, erectis; Culmis aggregatis, purpureis; Panicula magis & pulchrius colorata, splendens; Pedunculis rectis, nec undulatis; Floribus numerosioribus; Calycibus sub florescentia magis niantibus; Flosculis basi pilosioribus, (C c) longius aristatis, (C. S.) vix differunt.

62. *AIRA*, *caryophyllæa*, foliis setaceis, panicula divaricata, floribus aristatis distantibus. *Linn. Spec.* 97. (*Avena*. *Hall.* 1482.)

H. in campis apricis arenosis, in der *Hörre*, versus *Dreisbach* frequens. Floret Majo, Junio.

- T. V. f. 7. Radix densa, fibrosa, perennis? Culmi dodrantes, erecti, foliati binodes laeves. Folia radicalia setacea, vix ultra pollicaria, laevia: plura basi in fasciculos subbulbosos, tunicatos, collecta. F. culm ea setacea, breviora, recta, scabra. Ligula oblonga, bifida. Vaginæ scabra: suprema amplior, paniculam ante florescentiam basi obvolvens. Paniculae Pedunculi gemini, longi, Pedicellis brevibus. Calyx subinæqualis, albidus, purpureo-maculatus, nitidus. Flosculi 2, calyce fere breviores, basi subpilosi, apice subtrifidi, superior pedicellatus, distans. Utriusque Aristâ ex basi prodeit, recta purpurea, apice alba, subtortilis, (c. f.) vix calyce longior.

MELICA. G. P. 82.

Cal. 2-valvis, 2-florus. Rudimentum floris inter flosculos. S. N. 92.

63. *MELICA*, *nutans*, petalis imberbibus, panicula nutante simplici. *Linn. Spec.* 98. (*Poa*, *Hall.* 1472.)

H. in sylvaticis montosis am *Homburg*; *Beilstein*; in rupibus am *Geistlichenberg*. Floret Majo.

- T. III f. 4. Radix subrepens. Culmus 1 - 2-pedalis, erectus, compresso-tetragonus, tri-f. quadrinodis: ad basin squamis vaginantibus, alternis, acutis, fuscis, dein ultra medium usque Vaginis foliorum tetragonis, scabris, vestitus. Folia culmea 3 f. 4; quorum inferiora breviora, convexa, superiora subcarinata, latiuscula, pagina superiore pubescentia, margi-

marginibus & partim carina scabra. Ligulæ loco, margo brevis, membranaceus, fuscus. Panicula secunda, subnutans: vel simplicissima, racemiformis, pedicellis alternis, flexuosis, uni - s. bi-floris; vel ramosa: Pedunculo uno alterove inferiore longiore, patente, 3 s. 4. flo. Calycis valvulæ purpurascens, albido-marginata, (a A) exterior 3 - interior 5 - nervia. Cor. V. exterior flavescens, 7 - nervia. (c. C) Nectarium monophyllum, horizontale, orbiculatum, planum, foveola excavatum, pro Germinis insertionem. (l. L) Filamenta basi connata. (n. N.) Antheræ flavæ. (m) Germen obovatum, turbinatum. (N) Styli infra medium nudi. Stigmata plumulosa. (o) Semen fuscum, hinc convexum, inde sulco notatum. (f) Ex pedicello elongato Stylus inter flosculos prominens, capitulo turbato, (†) seu tertii (sæpe & quarti) flosculi rudimento, demum bivalvi, (†) terminatus.*

*** Flores multiflori, vagi.

BRIZA. G. P. 84.

Cal 2-valvis, multiflorus. Spicula disticha: valvulis cordatis, obtusis: interiore minuta. S. N. 94.

64. BRIZA, *media*, spiculis ovatis, calyce flosculis (7) brevior. Linn. Spec. 103. (Poa. Hall. 1448.)

H. in pratis, inque sylvis passim. Floret Junio.

- T. VII. f. 2. Radix perennis. Culmus 1 - 2 - pedalis, erectus, foliatus, bi-rarius trinodis, lavis. Folia erecta, angusta, breviter, superiora utrinque scabra. Ligula brevis, truncata, prominula. Vaginæ laeves. Panicula triangularis pauci- (20-30) flora. Pedunculi gemini, patentes, longi, violacei. Pedicelli capillares, flexuosi. Spiculæ 7 - flora, ovato-cordata, glabra, nitidæ, colorata, nutantes, tremula, Cal Valvulæ 3 - nervia. (a) Corollæ Valv. exterior calyce major, subviolacea, margine

B 5

albido,

*albido, scarioso ultra basin producto. (C) V. interior inclusa, minima, apice retusa. (C. *) Nectaria 2, oblonga, apice truncata, crenulata, margine exteriori unidentata. (L) Styli penduli, longi, basi nudi. (O) Semen hinc excavatum. (S.) Spiculis minus coloratis albidis, 9-11 floris, saepe ludis in sylvis Am Homberg, & Beilstein.*

POA. G. P. 83.

Cal. 2-valvis, multiflorus. Spicula ovata: valvulis margine scariosis acutiusculis. S. N. 92.

65. POA, *aquatica*, panicula diffusa, spiculis sexfloris linearibus. *Linn. Spec. 98. (Hall. 1454.)*

H. ad ripas *Labna* circa *Dietz*. Floret Junio.

Paniculam tantum examinavi; ipse gramen hoc nondum legi.

T. V. f. 5. *Paniculae Ramus. Panicula maxima. Pedunculi triquetri, scabri, superne flexuosi. Spiculæ ovato-lineares, subcompressa; inferiores 6-floræ, superiores 7-9-10 floræ. Cal. Valvulæ uninervia, interior acutior longitudine corollæ. Rachis levis. (γ) Cor. V. exterior obtusiuscula, striata, nervis 7 parallelis, (per lentem) denticulatis. (c. C.)*

66. POA, *trivialis*, panicula diffusa, spiculis trifloris basi pubescentibus, culmo erecto tereti. *Linn. S. N. 93. Spec. 99. (Confer. Hall. 1464. & 1468.)*

H. in montosis siccis *am Dollberg, & Homberg*; in muris urbis & pontis novi frequens. Floret initio Junii ad finem usque.

T. VI. f. 2. *Radix multiplex. Culmi numerosi, aggregati, paralleli, erecti, stricti, foliati, trinodes, laeves; juxta basin Gemmæ purpurascens ad genicula, pro futuro anno. Folia radicalia subangusta, plana, pagina superiore subscabra, demum involuta. Ligula brevis, truncata. Vaginæ laeves, nervo carinali acutiusculo. Panicula 3-4-pollicaris, angusta, subdiffusa,*

diffusa. Internodia semiteretia, subscabra. Pedunculi scabri, inferiores terni, seu quini, pauci- (5-7-9-) flori, pedicellis brevissimis. Spiculæ trif. quadriflora, ovato-lanceolata, spadiceo-purpurea, nitida, flosculis apice flavis, magis quam in reliquis tribus sequentibus coloratis, dorso & basi subvillosis. (c.C.) Nectaria lanceolata, saepe bifida. (L) Antheræ flavescentes. Stylus inter flosculos nudus; in tri-quadriflorisque spiculis semper praesens. (Y.)*

67. *POA, angustifolia*, panicula diffusa, spiculis quadrifloris pubescentibus, culmo erecto teret. *Linn. Spec. 99. (Hall. 1460.)*

H. ad versuras, fecus vias passim. Floret initio Maji, ad finem usque.

- T. VI. f. 3. *Radix repens. Culmi pedales, fertiliori solo 2-3-pedales, erecti, firmi, stricti, foliati, trinodes, laeves. Folia radicalia erecta, longa, angustissima, pagina superiore subpubescentia, demum involuta, filiformia. Fol. culmea latiuscula, plana, obtusiuscula, firma, laevia, subtus striata, glabra: nervo carinali in superioribus partim scabra. Ligula brevis, truncata. Vaginæ longæ, striatae, glabra. Panicula 3-4-5-pollicaris, triangularis, diffusa, ante & post florescentiam copiosissimis spiculis quasi imbricata. Internodia inferiora laevia. Pedunculi inferiores plerumque quinque plures. Spiculæ ovata, acuta, compressa, 4-flora, rarius 3 f. 5-flora, magnitudine valde variantes; (1. 2. 3.) Semper latiores, pallidius virentes, minus colorata nitentesque, quam in reliquis. Calyx corolla paulo minor. (a A) Flosculi basi & dorso valde villosi. (C.) Nectaria basi connata, gibba, apice brevi acuto. (L) Antheræ erumpentes rubra, mox demisso polline e viridi flavescentes. Flosculi maturo semine decedentes, villis coherent vagi, penduli. (f.) Stylus inter flosculos, (y*) si quini, nullus. Junio Mense Gramen hoc omne defloratum reperitur; Folia radicalia hinc inde enascentia, praecedentibus multo latiora, brevioraque observantur.*

68. *POA,*

68. *Poa, pratensis*, panicula diffusa, spiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti. *Limn. Spec. 99. (Hall. 1462.)*

H. in pratis nostratibus infrequens; *Unter der neuen Brücke; an der Mühlbach, & alibi parcius occurrit. Floret Julio ad finem usque.*

- T. VI. f. 4. *Radix multiplex, subrepens. Culmi 3-4-pedales, erecti, stricti, firmi, foliati, 5 s. 6-nodes. Folia radicalia pauca, emarsida. F. culmea latiuscula, plana, utrinque scabra. Ligula brevis, truncata, saepe fissa. Vaginæ striata, glabra. Panicula semipedalis, subdivaricata, mutica, scabra. Internodia teretia. Pedunculi longi, patentes, valde hispidi, inferiores quini s. sens. Pedicelli divaricati, breves. Spiculæ lanceolata, acuta, compressa, margine acuto, 3-4-5-flora in eadem saepe panicula: angustiores, minus copiose, magis distantes, magisque e luteo-virentes, quam in precedentibus & sequente; deflorata subfusca, apicibus flosculorum luteis, nitidis. Calycis valvulæ trinerviae, dorso scabra, exterior mucronata. (A) Flosculi dorso & basi subvillosi. (C) Nectaria 2, apice bifida. (L.) Antheræ violaceæ, carulescentes, dein ochroleucæ. Ex geniculis inferioribus saepe fasciculi foliorum breves, & Culmi serius florentes enascuntur. Paniculæ pars superior, uti-racemi inferiores, ob tenuitatem & pondus spicularum, saepissime cernua, subnutans.*

69. *Poa, dubia*, panicula diffusa, spiculis ovatis obtusis subtrifloris basi pubescentibus, vaginis foliisque subtus scabris. (*Confer. Hall. 1465.*)

H. in pratis humidiusculis ubique frequens; ad fossas; *an der Dilla, & Mühlbach* copiose; etiam siccioribus locis gramineis pervulgaris. Floret fine Junii in Septembrem usque.

- T. VI. f. 5. *Culmi pars infima terram humidam profunde perforans, sub terra, & partim extra terram, Radiculas ex nodis emittit numerosas. Culmus supra*

pra terram 3 f. 4 - pedalis, erectus, foliatus, teres, superne nudus, scaber. Geniculi 3 f. 4, subcylindracei, scabriusculi. Folia radicalia emarcida. F. culmea latiuscula, plana, pagina superiore subscabra, inferiore marginibusque scaberrima. Ligula oblonga, prominens, culmum semiobvolvens, obtusa, saepe fissa. Vaginæ subcompressa, striata, undique imprimis carinali nervo scabra. Panicula semi-sape pedalis, diffusa, patens; vel tota viridis, vel uno latere tantum, vel tota e violaceo-nigricans. Internodiateretia, subscabra. Pedunculi verticillati, longi, angulati, patentes, flexuosi, subflorescentia horizontales, recti. Singuli basis incrassato-calloso, cum culmi nodo coalita. Spiculæ exigua, exacte ovata, margine & apice obtusissima, subnutantes, bi- seu triflora. Flosculi obtusiusculi, basi & dorso villosi, calyce (A) paulo majores. (c. C) Nectaria 2, triangularia, acuta. (L) Antheræ violaceæ, deincinerea. Calyce diutius persistente, flosculi maturis seminibus decedentes, villis coherent penduli. (c. f.) An POA palustris Linn. Spec. 89 ? secundum descriptionem Scheuchzeri plurimis notis convenit.

70. POA, annua, panicula diffusa angulis rectis, spiculis obtulis, culmo obliquo compresso. Linn. Spec. 99. (Hall. 1466.)

H. in cultis, ad vias passim. Floret Aprili in hyemem usque.

- T. VI. f. 1. Radix annua. Culmi semi- & pedales, declinati, obliqui, compressi, foliati, binodes, laeves. Folia latiuscula, plana, levia, partim carinali nervo scabra. Ligula oblonga, acuta, saepe crenulata. Vaginæ compressa, fissa, albido-marginata, laeves. Panicula triangularis, patentissima, diffusa, subsecunda. Pedunculi gemini, angulati, laeves, horizontales, dein subreflexi. Spiculæ ovato-lineares, compressa, obtusissima, 3-4-5-flora, virentes, sem in aliis ex purpureo-albido-viridique colore pulchre variegata. Flosculi basi subvillosi, margine apicem

cem versus dentato-laceri. (C.) *Nectaria 2, ovato-acuta, saepe bidentata.* (L.)

71. *Poa, compressa, panicula secunda coarctata, culmo obliquo compresso.* *Linn. Spec. 101.* (*Hall. 1455.*)

H. in muris coemeterii, urbis, & pontis novi; in arvis arenosis ubique frequens. Floret Julio, Augusto.

- T. V. f. 4. *Radix subrepens. Culmi pedales, declinati, obliqui, adscendentes, foliati, compressi, 4 s. 5. nodes, firmi, laeves. Folia angusta, erecta, plana, subcarinata, pagina superiore subscabra. Ligula obtusa. Vaginae compressae, laeves. Panicula 1 - 2 - pollicaris, coarctata, secunda. Pedunculi breves, gemini. Pedicelli brevissimi. Spiculae subsessiles, approximate, lanceolato-lineares, acutiusculae, 5 - 6. seu 7 - 9 - florae, saepe coloratae. Flosculi basi subvillosi.* (C.)

72. *Poa, nemoralis, panicula attenuata, spiculis subbifloris mucronatis scabris, culmo incurvo.* *Linn. Spec. 102.* (*Hall. 1469.*)

β. *Gramen cirrhosa & villosa spongia, ad singula genicula donatum, paniculatum alpinum.* *Schenckz. Agr. 165.*

H in dumetis am *Homburg*, & *Geistlichenberg* frequens; β, in nemorosis im *Beilstein*, prope viam publicam. Floret Julio.

- T. V. f. 3. *Radix subrepens. Culmi 1 - 2 - pedales, infirmi, foliati, 4 - s. 5 - nodes, erecti, apice cum panicula antrorsum curvati. Folia angustissima, plana, pagina superiore scabra. Ligula obtusa, brevissima. Vaginae subcarinatae, inferiores subscabrae. Panicula angusta, elongata, nutans, coarctata, sub florescentia patens. Internodia scabra. Pedunculi subflexuosi, tenues, pauciflori. Spiculae bi - rarius triflorae, dilute fuscae, lutescentes. Calyx longitudine (±) (si duo) flosculorum, mucronatus, scaber. (A) Flosculi mucronati, scabri, basi subvillosi.* (C)

Varietas major: *Culmo tripedali, magis incurvo, saepe ramoso; Panicula majore, multiflora; Pedunculis*

culis pluribus, inferioribus quinis, s. senis, magis patulis; Spiculis tri- s. 4- floris; annuatim provenit am Homberg. Poæ prætensi (mea) nimis adfinis.

Varietas β. Gramen omnibus partibus minus. Culmus vix pedalis, erectus. Panicula suberecta, fere racemosa, pauciflora. Spiculæ exigua, biflora, demum rufescentes. Flosculi plerumque steriles. Ex inferioribus Geniculis, & quidem e' culmi fissura, fibræ enascuntur numerosa, purpurascens, glomeratim arte implexa, nodum & culmi partem undique ambientes. (k) Non est insectorum opus. In his spongiolis, cultello sapissime examinatis, nunquam vestigia ullius Insecti detegere potui, uti in Bedeguar Rosæ. Vera sunt excrecentia fibrarum radicalium, (†) a nimio succo nutritivo enata, quibus deciduis Gramen forte propagatur.

73. Poa, cristata; panicula spicata, calycibus subpilosis subquadrifloris pedunculo longioribus, petalis aristatis. Linn. S. N. 94. *Aira cristata*. Spec. 94. (Festuca. Hall. 1444.)

H. in montosis apricis ficcis passim. Floret Julio.

- T. V. f. 6. Radix multiplex, densa. Culmi 2-3-pedales, erecti, stricti, subfoliati, basi subbulbosa Vaginis albidis, aphyllis vestiti, bi s. trinodes, ultra medium enodes, nudi, infra & inter paniculam subtomentosi. Folia radicalia angusta, plana, utrinque pubescentia, marginibus pilis albidis ciliata. Fol. culmea latiuscula, plana, supra pubescentia, subtus nuda, marginibus scabris, subciliatis. Ligula brevissima, truncata, subfusca, subciliata. Vaginæ inferiores subvillosa, superiores longa, nuda, scabra. Panicula florens spiculis divergentibus patula, ut culmi internodia subtomentosa, & pedunculi visui pateant: ante & post florescentiam in spicæformam contracta, subcolorata, mutica. Pedunculi breves, pubescentes, scabri, inferiores gemini s. terni. Pedicelli brevissimi, alterni, inferiores triflori.

flori. Spiculæ bi - tri - rarius quadrifloræ. Calyx inaequalis, scariosus, compressus, carinatus pellucidus, mucronatus, superficie punctatus (per lentem) punctis seu feris, carina scaber, subciliatus. (A) Flosculi longitudine calycis, subaristati, dorso scabri. (c. C.) Nectaria 2, apice latiori oblique truncata, crenulata, margine interiore unidentata. (L) Antherae ceruleae, dein flavae.

Variat. α. Panicula semipedali. β. Pedunculo inferiore uno alterove longiore, horizontali. γ. Spiculis nudis, laevibus; forte Hall. 1445?

FESTUCA. G. P. 88.

Cal. 2 - valvis. Spicula oblonga, teretiuscula, glumis acuminatis. S. N. 96.

2. Panicula secunda.

74. FESTUCA, ovina, panicula secunda coarctata aristata, culmo tetragono nudiusculo, foliis setaceis. Linn. Spec. 108.

α. Gramen foliis junceis brevibus majus, radice nigra. Scheuchz. Agr. 279. (Hall. 1442. α.)

β. Gramen capillaceum locustis pennatis non aristatis. Scheuchz. Agr. 276. (Hall. 1442. β.)

H. α, in collibus apricis aridis ubique; β, in montosis sterilibus, auf der Steinseite, & alibi frequens. Floret Majo.

T. VIII. Fig. 3. Radix densa, fibrosissima, nigra. Culmi palmares, dodrantes, erecti, striati, tetragoni, laeves, nudi, duobus geniculis fuscis, totidemque foliis setaceis, brevibus, ad basin instructi. Folia radicalia numerosa, brevia, setacea, subscabra. Ligula brevis, margine prominula. Vaginae laeves. Panicula 1 - 2 - pollicaris, coarctata, secunda. Pedunculi solitarii, breves, uniflori, inferior 3 - f. 4 - florus. Spiculæ teretes, aristatae, subviolaceae, pubescentes, florentes subdistichae, (Fig. infer.) tri - f. quadriflorae. Calyx exiguus, corolla brevior. (α) Flosculi apice aristati, pubescentes, dorso

dorso & margine scabri, saepe ciliati. Nectaria 2, ovata, acuta. (L.)

Fig. 4. ‡. *β*. Panicula angustiore; Spiculis minoribus: Flosculis muticis, differt.

Fig. 4. †. Varietatem hanc legi in sylvis in der Hörre: Folia radicalia copiosissima, filiformia, laevia. Culmus fere pedalis, vix tetragonus, laevis. Panicula secunda, patula, minime contracta. Spiculae exiguae, virides, glabrae, muticae.

Ovibus gratissimum pabulum.

75. *FESTUCA, duriuscula*, panicula secunda oblonga, spiculis oblongis laevibus, foliis setaceis. *Linn. S. N. 96. Spec. 108? (Hall. 1437.)*

H. in pascuis ficcis auf dem Geistlichen Berg; & alibi frequens. Floret Junio.

T. VIII. f. 2. Radix multiplex, densa, fibrosa, fusca. Culmi 1-1 $\frac{1}{2}$ pedales, erecti, stricti, teretes, subsoliati, binodes, laeves. Folia radicalia filiformia, sulco exarata, subtrigona, scabra, uti culmi tenacissima. Folia culinea 2 f. 3, brevius, lateribus conduplicatis setacea, demum planiuscula, angusta, laevia. Ligula brevis, fusca. Vaginae longa, laeves. Panicula 3-4-pollicaris, angusta, oblonga, secunda. Internodia angulata, laevia, dein flexuosa. Pedunculi solitarii, firmi. Spiculae 5-6-flora, oblonga, (†) sub florescentia disticha, (‡) adscendentes, panicula subnutante. Flosculi longius aristati, laeves, vix apice scabri, (C.) An vera?

76. *FESTUCA, rubra*, panicula secunda scabra, spiculis sexfloris aristatis, flosculo ultimo mutico, culmo semitereti. *Linn. Spec. 109. (Hall. 1440.)*

β. Festuca foliis hirsutis latiusculis, locustis paniculatis quinquefloris, aristatis, glabris. *Hall. 1435.*

H. *α*, in montosis sterilibus passim; *β*. in pratis ubique. Floret Junio, Julio.

T. VIII f. 1. Var. *β*. Var. *α*. Radix multiplex, fibrosa. Culmi 1-2-pedales, erecti, stricti, laeves, binodes, inferne subsoliati, teretes, superne longe nuai, altero latere ubi primarii pedunculi prodeunt planiusculi, semiteretes. Folia radicalia setacea, filiformia, subcompressa, scabra. F. culmea duo, subangusta, plana, laevia, pagina superiore molissime albido-villosa. Ligula obesa, brevis. Vaginae striata, laeves. Panicula patula, secunda. Internodia semiteretia, scabra. Pedunculi scabri,

C

pri-

primarii gemini, multiflori. Spiculae 5 f. 6-flora, pubescentes, scabra, destituta cum culmo rufescentes. Flosculi aristati, ultimus semper imperfectus, sterilis, brevius aristatus. Nectaria duo germen cingentia, apice bidentata. (L.)

Fig. I. var. β . Culmis numerosioribus, aggregatis, tripedalibus; Panicula majore, patente, subdiffusa; Spiculis 5-7-floris, majoribus; minus scabris, longius aristatis (C.) differt.

77. *FESTUCA, myurus*; panicula spicata nutante, calycibus minutissimis muticis, floribus scabris, aristis longis. Linn. S. N. 96. Spec. 109. (Hall. 1443.)

H. in arvis, & campis sterilibus, apricis, auf dem Homberg frequens; am Dollberg bey dem Graben rarius. Floret Julio.

T. III. f. 5. Radix fibrosa, annua. Culmi 1-1 $\frac{1}{2}$ pedales, obliqui, foliati, trinodes, teretes. Folia radicalia pauca, brevissima, setacea, laevia. F. culmnea 3. f. 4, involuto-setacea, laevia, vix apice scabra, superiora gradatim longiora. Ligula brevis, subbipartita. Vaginae culmum undique vestientes, subangulata, striata, laeves, subviolacea; superior longissima, amplior, paniculam attingens basi obvolvensque. Panicula fere semipedalis, spicaformis, secunda, nutans. Internodia semiteretia, valde scabra. Pedunculi inferiores gemini s. terni, erecti, spiculis alternis, subsessilibus; superiores solitarii, brevissimi. Spiculae 5-6-8-flora, disticha, scabra, adscendentes. Calyx flosculis duplo minor: Valv. exterior minutissima. (a A) Flosculi striati, hispidiusculi: denticulis setaceis, apice confertioribus, dorso marginibusque subciliati. Arista terminalis recta, tenuissima, scaberrima; demum subflexuosa, flosculo & ipsa saepe spicula longior. (C. c.) Panicula cum culmo, maturo semine, subrufescens.

Variat steriliori solo: Culmo vix spithameo; Folio supremo a spica remotiore; Panicula spicata: Spiculis minoribus, distinctioribusque.

b. Panicula aequali.

78. *FESTUCA, decumbens*, panicula erecta, spiculis subovatis muticis, calyce flosculis majore, culmo decumbente. Linn. Spec. 110. (Hall. 1434.)

H. in pascuis sterilibus am Homberg rarius; in pratis depressis hinter dem Homberg; infra pagum Sinn, frequens. Floret Junio.

T. VII. f. 5. Radix densa, fibrosa, subrepens. Culmi 1-1 $\frac{1}{2}$ pedales, basi subbulbosi, foliati, trinodes, decumbentes; florentes obliqui

obliqui, adscendentes. Folia radicalia longa, subangusta, plana, supra, imprimis basi pilosa. F. culmea similima, breviora. Ligulae membrana brevissima, villosa, margine prominula. Vaginae striatae, superne villosae. Panicula simplicissima. Pedunculi alterni, simplices. Breves, uniflori; infimus longior, unico ramulo biflorus. Spiculae 5-6 f. 7, ovatae, tumidiuscula, erecta, 3-4- rarius 5-flora, colorata. Calycis V. exterior saepe ipsa spicula longior; interior brevior, angustiorque. (a.) Floiculi basi pilosi. Valv. exterior 5- nervia, margine ciliata, apice obtusa, trifida; (c. C) interior plana, aice bi-saepe trifida, (C) Nectaria duo, obtusa. (l. L.) Floiculus ultimus teres, sterilis. (y. *)*

79. *FESTUCA, elatior*, panicula secunda erecta, spiculis subaristatis: exterioribus teretibus. *Linn. Spec. 111. Poa. (Hall. 1451.)*

H. in pratis fertilissimis copiose. Floret Julio & sequ.

- T. VIII. f. 6. *Radix articulata, profunde descendens, fibris ramosissimis subtomentosis, valde luxurians. Culmi 3 f. 4- pedales, erecti, foliati, 3 f. 4-5 nodes, laeves. Folia patentia, lata, saepe involuta, supra subscabra. Ligulae loco, margo brevis adnatus. Vaginae striatae, laeves. Panicula semipedalis: e vagina erumpens coarctata, nutans: florens patula, erecta, secunda, pedunculis strictioribus divergentibus. Internodia semiteretia, scabra. - Pedunculi gemini, compressi, semiteretes hispidi, superiores solitarii. Pedicelli brevissimi. Spiculae teretes, rectae, seu varie curvatae, coloratae: florentes compressae, exsiccatione distichae, squamosae, 5-6- fertiliori solo, 9-11-florae. Calyx corolla minor: (a) V. exterior exigua. Floiculi mutici, saepe apice subaristati. (+) Nectaria duo, lanceolata, acuminata. (l. L.) Bobus et equis pabulum praebet praestantissimum. Variat steriliori solo: Culmo vix ultrapedali; Panicula spicata: spiculis subsessilibus, alternis, patentibus, inferioribus geminis; forte HALL. 1452.*

80. *FESTUCA, fluitans*, panicula ramosa erecta, spiculis subsessilibus teretibus muticis. *Linn. Spec. 111. (Poa. Hall. 1453.)*

H. in fossis & aquis stagnantibus passim. Floret Junio & sequ.

Hujus Graminis (Mannæ) Semina, *Schvraden* dicta, a nonnullis in cibum recipiuntur salidissimum.

- T. VIII. f. 5. *Culmi basis crassa, terram humidam profunde perforans, ex nodis gemmas, radículasque emittit filiformes. Culmi 3-4 pedales, foliati, compressi, 4 l. 5- nodes, laeves, inferne ramosi, obliqui, suberecti; in aquis stagnantibus natantes,*

82. *BROMUS*, *mollis*, panicula erectiuscula, spiculis ovatis pubescentibus: aristis rectis, foliis molliissime villosis. *Linn. S. N.* 97. *Spec.* 112. (*Hall.* 1504.)

H. in agris inter *Hordeum*; in ruderatis, secus vias, ubique frequens. Floret Junio & sequ.

- T. XI. f. 1. Gramen totum molle, albedo-pubescent. Radix in arvis annua, locis desertis minustritis, biennis. Culmi 1-2 pedales, erecti, foliati, superne subtomentosi: Geniculis tribus incrassatis, subcylindraceis, villosis. Folia latiuscula plana, 7-nervia, utrinque, supra magis, molliissime albedo-villosa. Ligula brevis, semimultifida. Vaginæ striatæ, inferiores villosæ. Panicula erecta, subcoarctata. Internodia compressa, subtomentosa. Pedunculi breves, erecti, depressi, pubescentes, simplices, uniflori, rarius biflori. Spiculæ erectæ, ovatæ, subcompressæ, pubescentes, 5-7-floræ. Valv. Cor. exterior apice acute bifida. (C) Arista tenuis, recta, corolla fere longior. Nectaria 2, ovata, obtusa. (L) Germen superne villosum. (N.) Styli infra apicem inserti, reflexo-patentes. (O) Semen corolla adnatum, (c. f.) exsiccatione duplo angustius, teretiusculum, uti in precedente.

Varietas in pratis sterilibus: Culmo vix spithameo; spiculis 3-4-floris, flavescentibus, larvibus, duabus s. unica tantum ex apice culmi pendulis; primo aspectu diversissimum, tamen idem Gramen.

83. *BROMUS*, *sterilis*, panicula patula, spiculis oblongis distichis, glumis subulato-aristatis. *Linn. Spec.* 113. (*Hall.* 1505.)

H. ad margines agrorum, in arvis, ad sepes, auf dem Schiesplatz frequens. Floret Junio, Julio.

- T. XI. f. 4. Radix annua. Culmi 1-2-3-pedales, erecti, foliati, Geniculis 3-4, subcylindraceis. Folia latiuscula, plana, striata, basi subscabra, inferiora pagina superiore subvillosa. Ligula triangularis, denticulato-ciliata. Vaginæ inferiores albedo-villosa. Panicula semipedalis, patens, pauci-(10-20) flora. Pedunculi longi, filiformes, patentes, compressi, hispidi, uniflori; inferiores quini, basi nodosi, uno alterove longiore, bifloro, pedicellis divergentibus flexuosis. Spiculæ magna, lineari-oblonga, nuda, scabræ, septiflora, nutantes: (♂) sub anthesi distichæ, ultimo flosculo brevius aristato, sterili. Calyx & flosculi subangulati. (a. c.) Cor. V. exterior 7-nervia: nervis parallelis, viridibus, scaberrimis; albedo-marginata, apice acutissime bifida. Arista infra fissuram

prodit recta longitudine corolla. Nectaria 2, ovata, margine interiore crenulata. (L) Semina rarius ad maturitatem perveniunt. (c. f.)

Variat Culmo proceriori; Foliis latioribus, omnibus villosis; Panicula pedali, multiflora; Spiculis minoribus, brevius aristatis, undique pubescentibus, pendulis. (forse Hall. 1507?) intermedium quasi inter BROM. sterilem & tectorum. Habitat in Zuvinger frequens.

84. BROMUS, arvensis, panicula nutante, spiculis ovato-oblongis. Linn. Spec. 113. (Hall 1509.)

H. ad margines agrorum, in der Lue; am Dollberg; alibique frequens. Floret Julio.

T. XI. f. 3. Radix annua. Culmi obliqui, adultiore erecti, foliati, tri-f. 4-pedales: Geniculis, 3, incrassatis, interioribus subvillosis. Folia latiuscula, plana, pagina inferiore marginibusque scaberrima, superiore albo-villosa. Ligula acutiuscula, multifida. Vaginae striatae, villosae, superiores subnuda. Panicula fere pedalis. Pedunculi longi, filiformes, compressi, hispidi, basinodosi; vel simplices, unijori; vel pauciores ex infimis subramosi, bi s. triflori: Pedicellis longis, flexuosis, ad ramificationes nodosis, folioloque brevi, subulato. (saep) bracteatis Spiculae longa, ovato-lineares, teretiuscula, 7-9-10-flora, nutantes, colorata. hinc griseo-viridescentes, inde spadiceo-purpureae, glabra, (per leniem) pubescentes. Arista corolla paulo longior, recta. Nectaria 2, ovata. (L) Antherae rubrae dein favae.

Variat spiculis minoribus, magis coloratis, (+) pubescentibus. Confer. Hall. 1503?

85. BROMUS, tectorum, panicula nutante, spiculis linearibus. Linn. Spec. 114. (Hall. 1508.)

H. in collibus siccis, am hohlen Weg, bey dem dicken Thurm; in muris pontis novi; et alibi frequens Floret Majo.

T. X. f. 2. Radix annua. Culmi spithamasi s. pedales, tenues, erecti, foliati, tri-f. quadrinodes; deflorati terra incumbentes, rufescentes. Folia angusta, plana, pagina inferiore pubescentia, superiore albidovillosa, marginibus versus basin ciliata. Ligula truncata, seminuclisilla. Vaginae inferiores villosae, rufescentes. Panicula ex vagina erumpens erectiuscula, demum nutans. secunda. Pedunculi capillares, laxi, cum internodiis pubescentes, scabri, inferiores quini. Spiculae pendulae, lineari oblongae, pubescentes, quinqueflorae; maturo semine, flosculis apice divergentibus subquarrose. (c f) Floscali superiores plerumque steriles. Arista longitudine corolla, tenuissima, recta.

86. *BROMUS, giganteus*, panicula nutante, spiculis quadrifloris: aristis brevioribus. *Linn. Spec.* 114. (*Hall.* 1510. & forte 1506? *secund. Descr.*)

H. locis umbrosis humentibus, ad lepes im Winkel bey dem Klingelborn; an der Mühlbach bey dem Sieghaus-Brückgen; & alibi frequens. Floret Julio.

- T. X. f. 1. Radix perennis. Culmus fere orgyalis, erectus, firmus, foliatus, lavis; Articulo supremo longissimo; Geniculis quatuor, incrassatis, fuscis. Folia longa, latissima, plana, basi utrinque membrana cartilaginea, acuta, aurata; pagina superiore, & apice inferioris scabra. Ligula brevissima, truncata, fusca. Vaginae sulcata, subcompressa, inferiores scabra. Panicula ultrapedalis, nutans. Internodia longa, levia. Pedunculi ad singulum nodum gemini, patentes, longi, angulato-compressi, scabri, ultra medium indivisi. Spiculae teretiusculae: florentes lineari-lanceolatae, subcompressae, demum oblongae; (†) tri quadriflorae, in nostrate sapissime 6-7-florae. Calyx corolla minor, mucronatus, (a) valvula exteriori exigua. Cor. V. exterior 5-nervia, albido-marginata, apice, subvisida. Arista infra apicem prodis capillo tenuior, subflexuosa, longitudine corolla, saepe tota spicula longior. (c. c.) V. interior lanceolata, (C*) longitudine exterioris, saepe longior. Nectaria 2, lanceolata, acuta. (L 1) Semen hinc convexum, inde planum, subexcavatum. (f)

87. *BROMUS, pinnatus*, culmo indiviso, spiculis alternis subsessilibus teretibus subaristatis. *Linn. S. N.* 98. *Spec.* 115. (*Triticum.* *Hall.* 1431.)

H. in montosis sylvaticis am Homburg, & alibi copiosissime. Floret Julio.

- T. X. f. 3. Radix multiplex, teres, articulata, squamata, fibrosa. Culmus tri- s. quadripedalis, erectus, strictus, foliatus, superne lavis; Geniculis tribus subvillofis. Folia flavo-viridia, lata, plana, medio latiora, supra, subsus, marginibusque subpilosa. Ligula brevis, obtusa. Vaginae striata, mollissime villosa. Spica terminalis. Receptaculum subflexuosum, denticulis remotis spiculas adfigens. Spiculae novem, alternae, bifariae, teretiusculae, pubescentes, 9-11-13-florae: Superiores sessiles, inferiores brevissime pedunculatae; ante & post florescentiam erectae, commissuris glumarum s. latere planiusculo Receptaculo adpressae: florentes horizontales, (†) s. ad angulum rectum a receptaculo discedentes; terminali semper erecta, directione lateralibus contraria, (‡) uti in Triticeis. Calyx & Flosculi striati; pubescentes, margine subciliati: (a. c.) Arista terminalis, recta, brevis, maturo semine longior. (c. f.) Nectaria

2, apicem versus latiora, oblique truncata, multifido - ciliata. (l. L.) Antheræ flavæ. Styli cum apice Germinis toti villosi (N. O)

AVENA. G. P. 91.

Cal. 2-valvis, multiflorus; arista dorsali contorta. S. N. 99.

88. AVENA, elatior, paniculata, calycibus bifloris, flosculo hermaphrodito submutico, masculo aristato. Linn. S. N. 99. Spec. 117. (Hall. 1492.)

H. in pratis, pomariis, ad sepes, ubique frequens. Floret Junio & sequ.

T. X. f. 4. Radix perennis. Culmus fere orgyalis, erectus, foliatus; quadrinodis, laevis. Folia lata, striata, plana, supra subvillosa, utrinque scabra. Ligula brevis, truncata, fissâ Vaginæ striatae, laeves, inferiores subvillosa. Panicula semipedalis & longior, coarctata, nitida; florens patula, subnutans. Pedunculi tenues, primariis squamula acuta, brevi, involucriati. Calyx tenuis, pellucidus, mucronatus, coloratus. (2 A) Flosculi duo, subæquales, vix calycem superantes: (1. 2. 3.) quorum inferior Masculus, sessilis; (♂) superior Hermaphroditus subpedicellatus: (♀) uterque basi pilosus, septinervius, coloratus, muticus. Masculi Valv. exterior supra basin aristata: Arista colorata, geniculo tortili, flosculo duplo longiore. (♂. x) Nectaria duo, exigua. (♂. l.) Germen minimum. (♂. n.) Styli brevissimi, villosi. (n. ♂) Semen abortiens. (♂. c. f.)

Hermaphroditi arista sub apice prodit brevissima, recta. (♀. x) Nectaria duo, lineari-lanceolata, acuminata. (l. L. ♀) germine longiora. Stamina tria uti in Mare. Germen obovatum, apice villosum. (♀. n) Styli toti villosi, erectiusculi, (n. ♀) demum patentes. (l. m) Semen compressum, acutum, sulco notatum, (♀. f.) Corollæ adnatum. (♀. c. f.)

Bobus & equis bonum præbet pabulum. Gallorum Fromental; Anonnullis perperam Raygras dictum, quod LOL. perenne.

Variat:

Variat : α . Radicalibus fibris nodosis. Linn. var. β .
Hall. α .

β . Flosculo Hermaphrodito & Masculo, inermi, f.
utroque arista destituto. (2)

γ . Arista in utroque flosculo longiore. (3)

δ . Arista in Hermaphrodito nulla.

89. AVENA, dubia, paniculata, calycibus subtrifloris :
flosculo infimo terminali arista recta ; reliquis
apice biaristatis, dorsali arista reflexa.

H. in collibus siccis, apricis, in arvis sterilibus passim.
Floret Junio.

Gramen mihi dubium. : AN AVENA Loefflingiana,
LINN. S. N. 99. Spec. 118 ? cum LINNAEI
Charactere specifico non exacte convenit, nec in
Schenchzero, nec HALLERI Opere, simile Gramen
detegere possum.

T. IX. f. 3. Radix fibrosa, annua. Culmi spitha-
mai, varius pedales, erecti, foliati, tennes,
leves ; tribus Articulis, supremo longissimo, Geni-
culisque fusco - purpureis intercepti. Folia radicalia
pauca, brevissima, angustissima, striata, plana, nuda.
Folia culmi conduplicato-subulata, subscabra. Ligula
oblonga, acuta, subbifida, longe prominens. Vaginæ te-
retes, striatae, laeves, inferiores rufescentes, superior
tripto longior, ampliorque. Panicula pauciflora, flo-
rens patens. Internodia teretia, subscabra. Pedun-
culi filiformes, longi, patentes, subscabri, simplices,
uniflori, pauciores biflori, varius terminali similes,
triflori ; Glumis apicem versus alternatim pedun-
culo adpressis, subsessilibus : Pedicellis exiguis, val-
de incrassatis. Glumæ oblonga, subteretes, albida,
subfusca, maculis sanguineis nitentes, bi- (±) varius
trifloræ : (±) Flosculis omnibus fertilibus. Cal V.
exterior 5 - nervia ; interior duplo major, 7 - ner-
via : nervis parallelis, virgibus, scabris ; utraque
acuminata, albido-marginata. (a A.)

Flosculus inferior (1) sessilis, basi nudus, (1. C. *)
longitudine calycis. Cor. V. exterior teres, subula-
ta,

ta, 5 - nervia, punctata; Arista terminalis, recta longitudine corollae. (1) Valv. interior duplo brevior, plana apice bifida. (c. C. *)

Flosculus superior (2) brevissime pedicellatus, basi pilosus, (2. C. y.) priori similis, at apice & dorso aristatus; (2. C.) Aristae terminales duae, capillo tenuiores, rectae, parallelae, longitudine corollae; (2-3.) Arista dorsalis paulo supra medium prodis, geniculata, tortilis, gluma duplo longior. (‡) Stylus inter flosculos; in glumis bifloris, nudus, in trifloris: tertio flosculo, secundo simillimo, apice & dorso aristato, instructus. (3) Singuli Flosculi Stamina tria; Antherae ochroleuca, exiguae; (m M) Nectaria duo, ovata; (L.) Germen obovatum; (n N.) Styli toti villosi; (O) Semen corollae adnatum, (c. f.) teres, acutum, hinc sulco notatum, (f.)

90. AVENA, fatua, paniculata, calycibus trifloris, flosculis omnibus basi pilosis: aristis totis laevibus. Linn. Spec. 118. (Hull. 1495.)

H. in agris, vitium pervulgare, inter segetes nimis frequens. Floret Junio, Julio.

Eradicatur 1) Stipulis accensis, requiescente diutius agro, & arando post germinationem. LINN.

2) Repetita per plures annos seminatione graminum perennantium. SCHREBER.

T.IX, f. 4. Radix annua. Culmus 3 f. 4- pedalis, erectus, firmus, foliatus, quadrinodis, lavis. Folia latissima, longa, striata, undique scabra. Ligula obtusa, fissa, brevis. Vaginae striatae, laeves. Panicula pedalis, patens. Pedunculi filiformes, patentes, compressi, scabri, uniflori, rarius biflori, inferiores quini; solo fertiliori plures, ramosiores, multiflori. Glumae subtriflorae, nutantes. Calyx flosculis major: V. exterior 9 - nervia, interior 11 - nervia. Rachis pilosa. (y) Flosculi basi et dorso pilosi, (c) 7 - nervii, dorso scabri, acuminati, apice lacerti; tertio duplo minore, (c. 3.) saepe deficiente: Singuli Arista

Arista dorsalis, geniculata, reflexa, tortilis, lavis, (per lentem scabra,) (X. ♂.) flosculo duplo longior. Nectaria 2, ovato-acuminata. (L.) Semen pilosum. (c. f. f.)

91. *AVENA, pubescens*, subspicata, calycibus subtrifloris, basi pilosis, foliis planis pubescentibus. *Linn. S. N. 99. Spec. 1665. (Hall. 1498.)*

H. in pratis siccioribus an der Dille, am Sieghause; & aubi frequens Floret initio Junii.

- T. IX. f. 2. *Radix substolonifera*. Culmi pauci, 3 - 4 - f. § pedales, erecti, foliati, laeves, geniculis tribus subrotundis. Folia radicalia angusta, plana, supra, subtus, marginibusque pilosa. Fol. culmea latiuscula, obtusa, utrinque tactu mollia, pubescentia, marginibus praesertim carinali nervo scabra: supremo brevissimo, nudo. Ligula magna, obtusa, subcrenulata. Vaginae teretes, striatae, laeves, inferiores villosae. Panicula semipedalis, coarctata: florens patula, multiflora. Internodia teretia, laevia. Pedunculi tenuis, compressi, scabri, 1 - 2 - 3 - flori, inferiores quini. Glumae tri-rarius biflorae, albedo-purpurascens, nitidae. Calyx acuminatus. (a) Rachis pubescens. (y) Flosculi basi valde pilosi, (c. y.) § - nervii, apice lacerti, multifidi, calycis longitudine. *Arista dorsalis, albedo-violacea, demum tortilis, unicolor, subfusca. Nectaria 2, apice oblique truncata, tridentata, (L.) longitudine Germinis. Semina rarissime ad maturitatem perveniunt. (f.)*

92. *AVENA, pratensis*, subspicata, calycibus quinquefloris. *Linn. S. N. 99. Spec. 119. (Hall. 1499.)*

H. in montosis sterilibus, & collibus apricis passim. Floret medio Junii.

- T. IX. f. 1. *Radix multiplex, lata spatia occupat valde luxurians. Culmi numerosi, tripedales; erecti, stricti, subfoliati, f. ultra medium nudis, rufescentes,*

tes, scabri : Geniculis duobus basi propioribus. Folia radicalia numerosa, longa, angusta, plana, nuda, marginibus scaberrima; dein involuta s. conduplicata, filiformia, extus lævia, Vaginis *basi scabris*. F. culmea angusta, *brevia, plana, obtusa*, supra incana, scabra, subtus lævia: *omnia uti radicalia, apice purpurea*. Ligula *oblonga*, subfissa. Vaginæ subcompressæ, scabræ, purpureo-maculatæ. Panicula spicata, contracta, pauciflora. Internodia semiteretia, subflexuosa, scabra. Pedunculi breves, compressi, stricti, hispidi, simplices, alterni, uniflori, culmo adpressi, subflorescentia ad angulum acutum discedentes; inferiores gemini, uno longiore bifloro. Glumæ s. floræ, *varius trifloræ, magis colorata*, scaberrimæ, *precedentis majores*. Calyx flosculis paulo brevior. (a) Flosculi basi subpilosi, (c. y) apice acuto, bifido. (c) Arista *dorsalis longior*, (x) inferne tetragona recta, verticolar: dein tortilis, albo nigroque colore variegata. Nectaria 2, lanceolata, acuminata, germine longiora, (L.) margine exteriori unidentata. Semen *fuscum, saepe abortiens*. (c. f.)

93. AVENA, *flavescent*, panicula laxa, calycibus trifloris brevibus; flosculis omnibus arietatis. *Linn. Spec. 118. (Hall. 1497.)*

H. in pratis & pomariis frequens. Floret Junio & sequ.

- T. X. f. 5. Radix perennis. Culmi 2-3 pedales, erecti, foliati, *laeves*: Geniculis *tribus, subvillosis, remotis*. Folia *latuscula, pagina superiore subvillosa*. Ligula *brevis, truncata, subcrenata*. Vaginæ *subvillosæ*. Panicula *flavescent*. Pedunculi *verticillati*. Calyces *bi- tri-varius quadriflori, ultimo flosculo semper sterili*. (a) Flosculi *calyce paulo longiores, basi pilosi, apice bifidi*: Arista *dorsalis, tenuis, flosculo longior*. (c. C.) Nectaria *ovato-lanceolata*. (L.) Semen *flavescent*. (c. f.)

Variat.

Variat in sylvis : Panicula angustata, coarctata, calycibus (Majo) bisfloris, (Julio) 3- & 4-floris

Varietatem Viviparam legi singularem unter der neuen Brücke: Panicula spicata, squarrosa, germinibus in fasciculos foliorum excrescentibus villosos, undique divergentes.

ARUNDO. G. P. 97.

Cal. 2-valvis. Flosculi congesti, lana cincti. S. N. 100.

94. ARUNDO, phragmitis, calycibus quinquefloris, panicula laxa. Linn. Spec. 120. (Hall. 1515)

H. ad ripas Lahna, circa Dietz. Floret Julio, Augusto.

T. VII f. 1. Panicula pedalis, laxa. Pedunculi verticillati, numerosi, angulati, scabri. Spiculæ quinqueflora, rarius 4-6-flora. Calyx inequalis: Valvulis trinerviis, muticis; exteriore duplo fere minore. (a) Cor. Valv. exterior uninervia, subulato-mucronata, Calyce longior; (c, C) Valv. interior triplo brevior, plano-concava, apice retusa. (C*) Semen villis (†) longitudine corollae cinctum, (l)

**** Flores multiflori, insidentes receptaculi elongati dentibus.

TRITICUM. G. P. 99.

Cal. 2-valvis, solitarius, subtriflorus. Flos obtusiusculus, acutus. S. N. 102.

95. TRITICUM, repens, calycibus quadrifloris subulatis acuminatis, foliis planis. Linn. S. N. 102. Spec. 128. (Hall. 1426.)

H. in agris & cultis nimis frequens. Floret Julio: Pharm. GRAMINIS Radix. Verno tempore colligenda.

T. XII. f. 3. Radix maxime repens. Culmus bipedalis, erectus, foliatus, trinodis, laevis. Folia latiuscula, plana, viridia, basi utrinque membrana aucta, supra pubescentia. Ligulae margo brevis, truncatus. Vaginae laeves. Spica palmaris. Receptaculum flexuosum, alternatim hinc convexum, inde excavatum, scabrum,

scabrum, dentibus interceptum. (V) Spiculæ trif. quadriflora, sessiles, latere plano receptaculo obversa: terminali lateralibus directione contraria. Calycis Valvulæ subæquales, (a) 5-nervia, acutæ. Cor. V. exterior 5-nervia, punctata, mucronata. (c) V. interior plana, marginibus inflexis, ciliatis, apice bifida. (c. *) Nectaria ovato-lanceolata. (L. L) Antheræ rubra, dein flava. Semen discedens. (c. f.)

Non amplius dubitandum, quin hujus Radix sit antiquorum vera GRAMINIS RADIX dulcis, homines pecudesque alens.

ELYMUS. G. P. 96.

Cal. lateralis, 2-valvis, aggregatus, multiflorus. S. N 100.

96. ELYMUS, caninus, spica nutante arcta, spiculis rectis involucri destitutis: infimis geminis. Linn. Spec 124. (*Triticum* Hall. 1426. var. 3.)

H. ad sepes passim. Floret Julio & seq.

Gramen nostrum paucis notis a Tritico repente diversum, certe ejusdem Varietas est constans Persll. LINNAEUS olim ipse vocavit: *Triticum calycibus subulatis quadrifloris aristatis* Spec. Pl. Edit. I. p. 86. Ob Radices maxime repentes, nostrum non est *Triticum* HALL. 1429.

T. XII. f. 4. II. Radix precedentis. Culmi 4-5-pedales, erecti, foliati, quadrinodes. Folia latiora, glaucescentia, supra subpubescentia, marginibus scabrioribus, magis basi auriculatis. Spica 5-6-pollicaris; ob tenuitatem Receptaculi, & pondus spicularum, maturo semine, ultra medium usque nutans. Spiculæ majores, oblonga, teretiuscula, minus disticha, aristata, in primario dente sæpe gemina: (+) Calyx ideoque duplex s. tetraphyllus, (a. +) subaristatus. Flores precedentis: Arista terminalis recta, longitudine gluma seu brevior; Cor. Valv. interior magis ciliata (c) Nectaria basi hemispherica. (L) Antheræ flava. In reliquis cum Trit. repente exacte convenit.

T. XII.

T. XII. f. 4. 1. Hanc Varietatem legi locis incultis *am Homberg*. Radix *multiplex*, densa, vix repens. Culmi aggregati, erecti, stricti, orgyales, crassitie inferne digiti minoris. Folia latissima, glauca, scaberrima, nuda. Spica fere pedalis, pollicis inferne crassitie, stricta, semper erecta, nec absoluta florescentia nutans. Spiculæ majores, approximate, disticha, 7-9-flora, aristata: superiores solitaria, inferiores ad spica medium usque gemina, infima saepe terna In reliquis notis a priore non diversum. In hortum transplantatum, insequenti anno in priorem transit, ob Radicem valde repentem vix eradicandum.

LOLIUM. G. P. 95.

Cal. 1 - phyllus, fixus, multiflorus. S. N. 100.

97. LOLIUM, perenne, spicâ muticâ: spiculis compressis multifloris. Linn. Spec. 122. (Hall. 1416.)

β. Gramen loliaceum, spica lata ex plurimis spicis duplici versu dispositis constante. Schenckz. Agrost. 29. Hall. var. γ, l. c.

H. in pascuis, pratis, ad vias passim; β. ad versuras in der Aue, infrequens. Floret æstate.

T. XII. f. 1. Anglorum verum est Ray - Grass. Gramen hoc pro cespite denso æqualique aptissimum, repetito & junius demessum, Bobus optimum præbet pabulum. Radix *multiplex*, densa, fibrosa, perennis. Culmi obliqui, florentes erecti, 1 s. 2. pedales, foliati, trinodes, leves. Folia radicalia angustissima, plana, levia; culmea angusta, plana, supra scabra. Ligula truncata, multifida Vaginæ leves. Spica 6-9-pollicaris, plana, disticha. Receptaculum flexuosum leve: hinc alternatim convexum, inde excavatum, dentibus interceptum. (V) Spiculæ alterna, compresso-plana, disticha, 7-9-11 flora, leves: vel lanceolata, calyce longiores; vel rhomboidea, longitudine calycis. Calyx monophyllus: (a) (terminalis spicula diphyllus, subæqualis,) (a*) Gluma nervosa, mutica, levis, (a) Receptaculo excavato, alterius Valvulae vicem gerenti, opposita. (a. fig. infer.) Cor. V. exterior

5 - ner-

5 - nervia, mutica, calyce minor. (c.) Nectaria duo, ovata, obtusa. (l. L.) Semen discedens, (c. f.)

T. XII. f. 1. ♀. Var. β. Spica Receptaculo differt ramoso: Ramis spicatis; Spiculis magis approximatis, 11 - 13. floris, ad basin singuli rami geminis.

98. LOLIUM, temulentum, spica aristata, spiculis compressis multifloris. Linn. S. N. 100. Spec. 122. (Hull. 1420.)

H. in agris, inter Hordeum nimis frequens, Floret Junio, Julio.

Gramen inter omnia unicum noxium, Semen temulentos vertiginososque reddit Homines; magis adhuc in pane calido, potissimum in potu cerevisia. Etiam equis, canibus, suis, aliisque animalibus noxium, saepe lathale.

T. XII. f. 2. Radix annua, fibris submentosis. Culmi 2 - 3 pedales, erecti, firmi, foliati, trinodes, scabri. Folia lata, plana: pagina superiore scabra, inferiore glabra. Ligula brevis, subcrenulata. Vaginae striata, scabra. Spica semi-f. pedalis, plana, disticha. Receptaculum praecedentis, crassius, firmitusque, scabrum. Spiculae alterna, lineari-oblonga, compressa, scabra, aristata; in eodem plano cum culmo, dentibus adfixa, 5-7-9 flora. Calyx monophyllus, (a) (terminalis spicula diphyllus,) (a*) nervosus, muticus, longitudine spicula, Receptaculo oppositus; (V. a.) in spiculis inferioribus, saepe secunda Calycis Valvula, multo minor, oblonga, obtusa, convexa, subbifida, (2. ♀.) Receptaculi cavitatione impressa, observatur. (V. a. ♀) Cor. V. exterior calyce duplo brevior, nervosa, albido-marginata: sub apice membranaceo Aristam exferens rectam, duplo longiorem. (c. x.) Nectaria 2; ovata. (l. L.) Styli basi nudi. (n. o.) Semen corolla inclusum, valvula interiori adnatum, non discedens. (c. f.)

CYNOSURUS. G. P. 87.

Cal. 2-valvis, multiflorus; Receptaculum proprium unilaterale, foliaceum, S. N. 95.

99. CYNO-

99. *CYNOSURUS, cristatus*, bracteis pinnatifidis. *Linn. Spec. 105. (Hall, 1345.)*

H. in pratis passim. Floret Junio.

- T. VII. f. 4. Radix perennis. Culmi 1 - f. 2 - pedales, erecti, stricti, foliati, quadrinodes, laeves. Folia angusta, plana, utrinque laevia, vix marginibus scabra. Ligula brevis, tenuis, truncata, fissa, margine prominula. Vaginæ striata, laeves. Spica composita: florens semiteres, secunda, obesa; deflorata interrupta, mutica. Rachis flexuosa, (y) torta, lavis. Pedunculi breves, solitarii, alterni, duplici serie unilaterales; spiculis tribus, rarius quinque, Bracteisque semper tribus instructi. Bractee pennata, convexo-plana, subsessiles: ex axi subflexuoso, & pinnulis 7 f. 9, composita; (b) Singula per lentem spiculam refert disticham: valvulis subulatis, alternis, compressis, aristatis, scabris. (B. C.) Spiculæ bi-rarius triflora, bracteis minores. (c. a) Calyx subinaqualis, carinatus, mucronatus: (a) Valvula exteriori basi ab altera remota, sursum arcuata, magis scabra. (A) Floiculi subaristati. (c. C) Nectaria ovata, acuta. (L.) Antheræ rubra, seu violacea. Styli basi nudi. (o) Ovisbus præbet optimum pabulum.

C. T R I G Y N I A.

HOLOSTEUM. G. P. 104.

Cal. 5 - phyllis. Petala 5. Caps. 1 - locularis, subcylindræa, apice dehiscent. S. N. 103.

100. *HOLOSTEUM, umbellatum*, floribus umbellatis. *Linn. Spec. 130. (Alfing. Hall. 879.)*

H. in agris, arvis, & campis sterilibus passim. Floret Majo & sequ.

Stamina semper tria, semel tamen quinque numeravi. Petala apice tri rarius bidentata. Capsula apice sexualvi dehiscit, valvulis revolutis. Receptaculum columnare, Semina scabra filis adfigens.

MONTIA. G. P. 101.

Cal. 2 - phyllis. Cor. 1 - petala, irregularis. Caps. unilocularis, trivalvis. S. N. 103.

101. MONTIA, *fontana*, Linn. Spec. 129. (Hall. 191.)
H. fecus rivulos ad Breitscheid, & Laugenaubach. Floret Majo. ✕

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

A. MONOGYNIA.

- *Florès monopetali, monospermi, superi.*
Aggregati.

DIPSACUS. G. P. 114.

Cal. commun. polyphyllus; proprius superus.

Recept. paleaceum. S. N. 111.

102. DIPSACUS, *fullonum*, foliis sessilibus serratis.
Linn. Spec. 140. (Hall. 198.)

β. Dipsacus sativus, aristis fructus hamatis. Sauv. monsp. 156.

H. α, ad vias, in sterilibus siccis passim; β. copiose apud nos feritur, pro usu Textorum tibialium; unde sæpe spontanea occurrit am Homberg. Floret Julio, Augusto.

β. Paleis differt multo robustioribus hamatis, qua in α, debiliores, recta sunt.

103. DIPSACUS, *pilosus*, foliis petiolatis apendiculatis. Linn. Spec. 141. (Hall. 199.)

H. in sterilibus am Dollberg; in muris pomœrii; ad sepes Leydenen Sieghaus's Gärten, rarius. Floret Julio, Augusto.

• Receptaculum subovatum. Paleæ lanceolatae. In hoc uti in præcedente, Stigma sæpissime bifidum, lobo infimo brevior.

SCABIOSA. G. P. 115.

Cal. communis polyphyllus; proprius duplex, superus. Recept. paleaceum f. nudum.

S. N. 112.

104. SCABIOSA, *succisa*, corollulis quadrifidis æqualibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. Linn. S. N. 112. Spec. 142. (*Succisa*-Hall. 201.)

H. in pratis subhumidis frequens; Hinter dem Homberg; im Guldners Grund, copiose. Floret Augusto.

• Pharm. SUCCISAE f. MORBUS DIABOLI Radix.

Folia sæpe subserrata. Corollæ lacinia superior non raro emarginata.

Calyx feminis proprius exterior 4-dentatus; interior sessilis quinque-

quesidus; laciniis setaceis aequalibus. Receptaculum ovatum, paleaceum : Paleis lanceolatis.

105. SCABIOSA, *arvensis*, corollulis quadrifidis radiantibus, foliis pinnatifidis incisis, caule hispido.

Linn. S. N. 112. Spec. 143. (Scabiosa. Hall. 206.)

H. ad versuras, in pratis ficcis; secus vias frequens. Corollis rubris & caeruleis ludit. Floret Junio, Julio.

Pharm. SCABIOSAE Herba. & Flores.

Receptaculum viscosum: villis 16-20 basi coalitis, radiantibus, singuli seminis basin vestientibus. Cal. sem. proprius exterior 4-dentatus, brevissimus; interior subpedicellatus, 10-fidus, laciniis 5, alternis setaceis, 5. latioribus.

**** Flores monopetali, monocarpi, inferi.**

PLANTAGO. G.P. 142.

Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida: limbo reflexo.

Stamina longissima. Caps. 2-locularis, circumscissa. S. N. 122.

106. PLANTAGO, *major*, foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica flosculis imbricatis. *Linn. Spec. 163. (Hall. 660.)*

H. ad vias, in pratis ficcis; ad versuras auf dem Schlüssel; am Rosenwalden copiose. Floret Junio, Julio.

Pharm. PLANTAGINIS Herba. Radix. Semina.

Spica teres, gracilis, saepe pedalis. Stamina flosculo vix duplo longiora. Capsula hexasperma.

107. PLANTAGO, *media*, foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica, scapo tereti. *Linn. Spec. 163. (Hall. 659.)*

H. in pratis, ad vias publicas passim. Floret Majo, Junio.

Spica brevior, densior, crassiorque. Capsula hexasperma.

108. PLANTAGO, *lanceolata*, foliis lanceolatis, spica subovata nuda, scapo angulato. *Linn. Spec. 164. (Hall. 656.)*

H. ad vias, in pratis macilentis nimis frequens. Floret Majo.

Spica ovato-oblonga. Calyx inaequaliter 4-fidus. Capsula dissperma. Varietatem hujus singularem legi, in agris requietis am Homberg: Foliis ultrapedalibus, subdentatis, 5-nerviis; Scapis bipedalibus, profunde sulcatis; Spicis palmaribus crassis, flexuosis, basi in duas seu tres spicas laterales, divisis.

***** Flores monopetali, monocarpi, superi.**

SANGVISORBA. G. P. 146.

Cal. 2 - phyllus. *Germen* inter calycem corollamque S. N. 124.

109. SANGVISORBA, *officinalis*, spicis ovatis. *Linn. Spec.* 169. (*Pimpinella* - Hall. 705.)

H. in pratis depressis passim. Floret Julio, Augusto.

Pharm. SANGVISORBAE S. PIMPINELLAE ITALICAE Radix.

- **** Flores monopetali, dicocci, superi. Stellatae.

GALIUM. G. P. 125.

Cor. 1 - petala, plana. Sem. 2, subrotunda. S. N. 117.

a. Fructu glabro.

110. GALIUM, *palustre*, foliis quaternis obovatis inæqualibus, caulibus diffusis. *Linn. Spec.* 153. (*Hall.* 719.)

H. ad rivulos pratorum, in fossis, im *Judenwueyher* copiose; An der *Mühibach* frequens. Floret Junio.

Folia caulina semper inæqualia, obtusissima: inferiora saepe quinque vel sena; superiora quaterna, floralia bina. Planta exsiccatione nigrescit.

111. GALIUM, *montanum*, foliis subquaternis linearibus lævibus, caule debili scabro, seminibus glabris. *Linn. Spec.* 155. (*Hall.* 714.)

H. in sylvaticis montosis am *Beilstein*. Floret Junio. †

112. GALIUM, *uliginosum*, foliis senis lanceolatis retrorsum ferrato - aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu majoribus. *Linn. Spec.* 153. (*Hall.* 713. & 715?)

H. ad rivulos, locis umbrosis im *Wiesengrund hinter dem Homberg*; & alibi frequens. Floret Junio; Julio.

113. GALIUM, *spurium*, foliis senis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis simplicibus, fructibus glabris. *Linn. Spec.* 154. (*Hall.* 724.)

H. in agris inter segetes hinter dem *Schloß*, frequens; in arenosis unter der neuen *Brücke*, rarius. Floret Junio.

Differt a G. Aparine: Caulibus vix pedalis diffusis; Geniculis aequalibus, nudis; Foliis inferne senis, superne quaternis; Fructu glabro, demum rugoso, fusco.

114. *GALIMUM*, *verum*, foliis octonis linearibus sulcatis, ramis floriferis brevibus. *Linn. Spec.* 155. (*Hall.* 720.)

H. in arvis, pascuis, pratis siccis, passim. Floret Junio.

Pharm. GALII LUTEI Herba, & Flores.

115. *GALIMUM*, *Mollugo*, foliis octonis ovato-linearibus subserratis patentissimis mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus. *Linn. Spec.* 155. (*Hall.* 711.)

H. Varietas latifolia, ubique in dumetis & ad sepes; V. angustifolia, in sylvaricis montosis *am Homberg*. Floret Junio.

116. *GALIMUM*, *sylvaticum*, foliis octonis lævibus subtus scabris; floralibus binis, pedunculis capillaribus, caule lævi. *Linn. Spec.* 155. (*Hall.* 712.)

H. in sylvis frequens, *im Mühlberg* infra pagum *Sinn* copiose. Floret Junio, Julio.

Caulis teres, subtetragonus, lavis, geniculis incrassatis. Folia sæpe sena tantum, marginibus, non carina scabra. Flores exigui, ante explanationem plures simul nutantes. Corollæ alba, laciniis latissimis, acutis. Stylus brevissimus. Semen nigrum, rugosum, plerumque unicum ad maturitatem pervenit.

b. *Fructu hispido.*

117. *GALIMUM*, *Aparine*, foliis octonis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructibus hispidis. *Linn. S. N.* 118. *Spec.* 157. (*Hall.* 723.)

H. ad sepes, in cultis, inter segetes nimis frequens. Floret Majo, Junio.

ASPERULA. G. P. 121.

Cor. 1. petala, infundibuliformis. *Sem.* 2, globosa. *S. N.* 116.

118. *ASPERULA*, *odorata*, foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis peduncularis. *Linn. Spec.* 150. (*Hall.* 728.)

H. in sylvis, & nemoribus frequens. Floret Majo.

Pharm. MATRISYLVA^s, f. HEPATICÆ STELLATÆ Herba.

SHERARDIA. G. P. 120.

Cor. 1. petala, infundibuliformis. *Sem.* 2, tridentata. *S. N.* 116.

119. *SHERARDIA, arvensis*, foliis omnibus verticillatis, floribus terminalibus. *Linn. Spec.* 149. (*Hall.* 734.)

H. in agris passim, in arvis auf dem Schießplatz copiose. Floret Junio, Julio.

Calyx sex- (nec 4.) *dentatus*, uti fructus. Semina unilocularia.

***** *Flores tetrapetali, superi.*

CORNUS. G. P. 149

Involucrum 4-phyllum sæpius. *Petala* supera

4. *Drupa* nucleo biloculari. S. N. 124.

120. *CORNUS, sanguinea*, arborea, cymis nudis, ramis rectis. *Linn. S. N.* 125. *Spec.* 171. (*Hall.* 816.)

H. in sepibus, dumetis, & sylvis vulgaris. Floret Majo,

***** *Flores incompleti, inferi.*

ALCHEMILLA. G. P. 165.

Cal. 8-fidus. *Cor.* 0. *Sem.* 1. S. N. 129.

121. *ALCHEMILLA, vulgaris*, foliis lobatis. *Linn. Spec.* 178. (*Hall.* 1566.)

H. in pratis & pomariis, ubique vulgaris. Floret Junio, Julio.

Pharm. *ALCHEMILLÆ* Herba. Radix.

122. *ALCHEMILLA, Apbanes*, hirsuta, foliis trilobatis, lobis tripartitis & bipartitis. *Hall.* 1569. *Apbanes arvensis.* *Linn. Spec.* 179.

H. in agris & arvis arenosis, auf dem Dollberg, & alibi frequens. Floret Junio, Julio.

Floris structura omnibus partibus *Alchemillæ* simillima: Calyx certe octo-fidus: (*quadrifidus* *SYST. NAT. H.* III. 236.) *Lacinia* alterna quatuor licet minutissimæ, semper tamen imprimis explicato flore, præsentas; *Seta* 6, in laciniiis maioribus, duplo pauciores, in minoribus. *Stylus* unicus. *Semen* unicum, nunquam duò, centies repetita fructus anatome numeravi.

B. DIGYNIA.

CUSCUTA. G. P. 170.

Cal. 4-f. 5-fidus. *Cor.* 1-petala, 4-f. 5-fida.

Caps. 2-locularis. S. N. 129.

123. *CUSCUTA, europæa*, floribus sessilibus. *Linn. Spec.* 180. (*Hall.* 654.)

a. Cu-

α. *Cuscuta major*. *Bauh. Pin.* 219. (funiformis.)

β. *Epithymum* f. *Cuscuta minor*. *Bauh. Pin.* 219. (filiformis.)

H. *α*, in sepibus *unter der neuen Brücke* & alibi frequens.

β, locis gramineis, inter *Festucam decumbentem*, *hinter dem Homberg*, copiose. Floret Julio, Augusto.

Pharm. *α*, CUSCUTAE, *β*, EPITHYMI, Herba.

Caulis filiformis, (*β capillaris*), tertragonus, tortus, dextrorsum volubilis, subramosus, perasiticus; Radiculas papillares, subsecuriformes, ex internodiis emittens, quibus plantis adhaeretur. & nutrimentum viresque ex iis haurit; demum ad terram perit evanescitque. Folia nulla. Squamula unica ovato-acuta, sub singulo glomere florum; ubi saepe ramum educit. Calyx & Corolla 4. f. 5. fida. Stamina 4. f. 5. Nectaria in primariis floribus fere nulla, in senioribus semibifida; laciniis iterum bifidis, incurvis. Capsulas saepe tri- etiam tetraspermas vidi.

C. TETRAGYNIA.

ILEX. G. P. 172.

Cal. 4-dentatus. Cor. rotata. Stylus o. Bacca 4-sperma. S. N. 130.

124. ILEX, *Aquifolium*, foliis ovatis acutis spinosis. *Linn. Spec.* 181. (*Aquifolium* - *Hall.* 667.)

H. in sylvis, im *Eisemrother Wald*, rarius. Flores nondum sufficienter examinare licuit. Floret Majo.

SAGINA. G. P. 176.

Cal. 4-phyllus. Cor. 4-petala. Caps. 1-locularis, 4-valvis, polysperma. S. N. 131.

125. SAGINA, *procumbens*, ramis procumbentibus. *Linn. S. N.* 131. *Spec.* 185. (*Alsine* - *Hall.* 861.)

H. in agris & arvis passim; secus rivulos pratorum *hinter dem Homberg* copiose. Floret tota fere aestate.

POTAMOGETON. G. P. 174.

Cal. o. Cor. 4-petala. Stylus o. Sem. 4. S. N. 130.

56 TETRANDRIA TETRAGYNIA.

126. *POTAMOGETON*, *natans*, foliis oblongo-ovatis petiolaris natantibus. *Linn. Spec.* 182. (*Hall.* 843.)

H. in stagnis versus *Burgk* rarius; in piscinis ad *Driedorff*, alibique frequens. Floret Junio.

127. *POTAMOGETON*, *crispum*, foliis lanceolatis alternis undulatis ferratis. *Linn. Spec.* 183. (*Hall.* 848.)

H. in fossis, stagnis, & rivulis, passim. Floret Majo.

128. *POTAMOGETON*, *compressum*, foliis linearibus obrusis, caule compresso. *Linn. Spec.* 183. (*Hall.* 851.)

H. in fossis, im *Wassergraben auf der Herren Wiese*, versus *Burgk*, copiose. Floret Junio.

129. *POTAMOGETON*, *pustillum*, foliis linearibus oppositis alternisque distinctis: basi patentibus, caule tereti. *Linn.* 184? (*Hall.* 852.)

H. in stagnis, unter der neuen Brücke, auch bey der untern *Walchmühle*, rarius. Floret Junio.

Caulis crassitie fili, teres. Folia vix pollicaria: inferiora opposita, superiora alterna. Stipulae oblongae, obtusissima, apice subserrulatae. Pedunculi pollicares, teretes, caule fere crassiores. Spicae pauci- (3-4.) flora. Flores exigui. Semina gibba, obtusa.

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

A. MONOGYNIA.

* Flores monopetali, inferi, tetraspermi. Asperifoliae.

ECHIUM. G. P. 191.

Cor. irregularis, fauce nuda. S. N. 148.

130. *ECHIUM*, *vulgare*, caule tuberculato-hispido, foliis caulinis lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus. *Linn. Spec.* 200. (*Hall.* 603.)

H. ad vias; in rudertis, inuis vetustis, passim. Floret Junio, Julio.

PULMONARIA. G. P. 184.

Cor. infundibuliformis, fauce pervia, nuda.

Cal. prismatico-5-gonus. S. N. 146.

131. PULMONARIA, *officinalis*, foliis radicalibus ovato-cordatis scabris. *Linn. Spec.* 194. (*Hall.* 597.)

H. foliis maculatis, ad sepes & in dumetis, *am Homberg; am Sieghaus;* foliis non maculatis, *auf dem Westerwald.* Floret Aprili, Majo.

LITHOSPERMUM. G. P. 181.

Cor. infundibuliformis, fauce perforata, nuda. Cal. 5-partitus. S. N. 145.

132. LITHOSPERMUM, *officinale*, seminibus lævibus, corollis calycem vix superantibus, foliis lanceolatis. *Linn. Spec.* 189. (*Hall.* 595.)

H. in hortis variis; a nonnullis feritur pro succedaneo Theæ, hinc quasi indigena facta, *auf dem Hinterland*, rarius. Floret Junio, Julio.

Pharm. MILII SOLIS, Semina.

133. LITHOSPERMUM, *arvense*, seminibus rugosis, corollis vix calycem superantibus. *Linn. Spec.* 190. (*Heliotropium* - *Hall.* 594.)

H. in agris inter segetes *hinter dem Schloß*; in ruderalis & cultis *auf dem Hinterland*, frequens. Floret Majo, Junio.

SYMPHYTUM. G. P. 185.

Corollæ limbus tubulato-ventricosus: fauce clausa radiis subulatis. S. N. 147.

134. SYMPHYTUM, *officinale*, foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. *Linn. Spec.* 195. (*Hall.* 600.)

H. ad fossas, & ripas *Dilla*, frequens. Varietas corollis purpureis apud nos vulgarissima est. Floret Majo, Junio.

Pharm. CONSOLIDAE MAIORIS s. SYMPHYTI, Radix. Folia.

BORAGO. G. P. 188.

Corolla rotata: fauce radiis clausa. S. N. 147.

135. BORAGO, *officinalis*, foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. *Linn. Spec.* 197. (*Hall.* 607.)

H. in cultis, & rejectamentis hortorum non infrequens. Exotica Planta indigena facta. Floret Junio.

Pharm. BORAGINIS Herba. Flores.

LYCOPSIS. G. P. 190.

Corollæ tubus incurvatus. S. N. 148.

136. LYCOPSIS, *arvensis*, foliis lanceolatis hispidis,
D 5 caly-

calycibus florescentibus erectis. *Linn. Spec. 199.*
(*Hall. 605.*)

H. in agris inter segetes; in cultis & arvis auf dem Schießplatz, frequens. Floret æstate.

CYNOGLOSSUM. G. P. 183.

Cor. infundibuliformis, fauce clausa fornicibus. Semina depressa, interiore tantum latere stylo affixa. S. N. 146.

137. CYNOGLOSSUM, officinale, staminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis tomentosis sessilibus. *Linn. Spec. 192.* (*Hall. 587.*)

H. in ruderatis, auf dem Hintersand; ad muros urbis, bey dem Thurm; ad viam publicam oberhalb Burck, copiose. Floret Majo, & sequ.

Pharm. CYNOGLOSSI Radix, Herba.

MYOSOTIS. G. P. 180.

Cor. hypocrateriformis, 5-fida, emarginata: fauce clausa fornicibus. S. N. 144.

138. MYOSOTIS, scorpioides, feminibus nudis, foliorum apicibus callosis. *Linn. Spec. 188.*

α. Myosotis, arvensis, foliis hirsutis. *Linn. Hort. Cliff. 46.*
(*Scorpiurus Hall. 590.*)

β. Myosotis, palustris, foliis glabris. *Linn. Hort. Cliff. 46.*
(*Scorpiurus Hall. 591.*)

H. α. in arvis, agris, ruderatis, ad vias; var β ad rivulos, in pratis humidis; Corollis cœruleis, albis, & carneis ludit. Floret æstate.

Var. α. Radix fibrosa, annua. Caulis ramosus. Folia hirsuta. Calyx profundius 5-fidus, maturo semine clausus. Pecora plantam intactam relinquunt.

Var. β. Radix repens, perennis. Caulis subramosus. Folia glabra. Calyx maturo semine patulus. Ovibus noxia, sape lethalis.

** Flores monopetali, inferi, angiospermi.

ANAGALLIS. G. P. 206.

Cor. rotata. Caps. circumscissa. S. N. 153.

139. ANAGALLIS, arvensis, foliis indivisis, caule procumbente. *Linn. Spec. 211.*

α. Anagallis phœniceo flore. *Bauh. Pin. 252.* (*Hall. 625.*)
β. Ana-

β. *Anagallis cœruleo flore.* *Bauh. Pin.* 252. (*Hall.* 626.)

H. in agris, arvis, & cultis ubique. *Var. β.* in agris *am Homberg*, vulgaris. Floret æstate.

Pharm. α. ANAGALLIDIS (flore phœniceo) Herba.

Var. β. in hortum introducta, faciem, & corollæ pulcherrimum colorem, per plures annos non mutavit. Folia angustiora, longiora, sæpe terna, quaterna. In *α* & *β*, Corolla crenulata.

α. Ad Insaniam, Maniamque valere, dicitur; & in ipsa Hydrophobia a nuperis laudatur. Utinam verum, non dubium esset specificum!

LYSIMACHIA. G. P. 205.

Cor. rotata. *Caps.* globosa, mucronata, 10-valvis. S. N. 152.

140. *LYSIMACHIA*, *vulgaris*, paniculata: racemis terminalibus. *Linn. Spec.* 209 (*Hall.* 630.)

H. ad ripas *Dillæ* frequens. Floret Julio, Augusto.

Filamenta *basi coalita*, *altitudine inæqualia*. Folia *sæpe terna, quaterna*.

141. *LYSIMACHIA*, *nemorum*, foliis ovatis acutis, floribus solitariis, caule procumbente. *Linn. Spec.* 211. (*Hall.* 628.)

H. in sylvis, *im Hirschberg* frequens. Floret Junio, Julio.

142. *LYSIMACHIA*, *Nummularia*, foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente. *Linn. Spec.* 211. (*Hall.* 629.)

H. locis humidis depressis umbrosis, ad scrobes passim. Floret Junio, Julio.

Pharm. NUMMULARIÆ Herba.

PRIMULA. G. P. 197.

Involutrum umbellulæ. *Corollæ* tubus cylindricus: ore patulo. S. N. 150.

143. *PRIMULA*, *veris*, foliis dentatis rugosis. *Linn. Spec.* 204.

α. *Primula officinalis*, limbo corollarum concavo. *Linn. Spec.* 204. (*Hall.* 610.)

β. *Primula elatior*, limbo corollarum plano. *Linn. Spec.* 204. (*Hall.* 609.)

H. α. in pratis & pomariis, copiose; in sylvaticis montosis: scapo altiore, multiflora; *var β.* Corollis pallidioribus, inodoris, in pratis siccis *bey Langenbach*, frequens. Floret Aprili, Majo.

Pharm.

Pharm. α, PARALYSIS, f. PRIMULAE VERIS
Radix, Flores.

MENYANTHES. G. P. 202.

Cor. hirsuta. *Stigma* 2-fidum. *Capsf.* 1-locu-
laris. S. N. 152.

144. MENYANTHES, *trifoliata*, foliis ternatis. *Linn.*
Spec. 208. (*Hall.* 633.)

H. in pratis uliginosis, infra pagum *Sinn*, copiose. Floret Ma-
jo, Junio.

Pharm. TRIFOLII FIBRINI f. AQUATICI. Radix.
Herba.

CONVOLVULUS. G. P. 215.

Cor. campanulata, plicata. *Stigm.* 2. *Capsf.*
2-locularis : loculis dispermis. S. N. 155.

145. CONVOLVULUS, *arvensis*, foliis sagittatis utrin-
que acutis, pedunculis subunifloris. *Linn.* S. N.
155. *Spec.* 218. (*Hall.* 664.)

H. in agris, arvis & cultis ubique frequens. Floret Junio &
seq.

Pedunculus *tetragonus*, *infra florem ceres*, *sape biflorus*. *Fructus*
mutatis.

146. CONVOLVULUS, *sepium*, foliis sagittatis posti-
ce truncatis, pedunculis tetragonis unifloris.
Linn. *Spec.* 218. (*Hall.* 663.)

H. in sepibus frequens. Floret Julio, Augusto.

Capsulæ dissipationem utrinque laterale, dimidiatum.

DATURA. G. P. 246.

Cor. infundibuliformis, plicata. *Cal.* tubu-
losus, angulatus, deciduus. *Capsf.* 4-val-
vis. S. N. 170.

147. DATURA, *Stramonium*, pericarpis spinosis ere-
ctis ovatis, foliis ovatis glabris. *Linn.* *Spec.*
255. (*Stramonium* - *Hall.* 586.)

H. in cultis oleraceis passim. Floret Julio, Augusto.

Pharm. DATURAE f. STRAMONII, Herba. Semina.

HYOSCYAMUS. G. P. 247.

Cor. infundibuliformis, obtusa. *Stam.* incli-
nata. *Capsf.* operculata, 2-locularis. S. N. 170.

148.

148. *HYOSCYAMUS*, *niger*, foliis amplexicaulibus. sinuatis, floribus sessilibus. *Linn. Spec.* 257. (*Hall.* 580.)

H. fecus vias, in ruderalis, auf dem Hintersand, copiose. Floret Junio, Julio.

Pharm. *HYOSCYAMI* Herba. Semina.

VERBASCUM. G. P. 245.

Cor. rotata, subinæqualis. *Caps.* 2 - locularis, 2 - valvis. *S. N.* 169.

149. *VERBASCUM*, *Thapsus*, foliis decurrentibus utrinque tomentosis, caule simplici. *Linn. S. N.* 169. *Spec.* 252. (*Hall.* 581.)

H. in sterilibus glareosis am Dollberg; Rehberg; & alibi frequens. Floret Julio, Augusto.

Pharm. *VERBASCI* Radix, Herba, Flores.

Filamenta duo inferiora reliquis longiora, nuda, tria superiora albidulo-villosa.

Corollatum Infusum gratum & præstantissimum resolvens; in morbis pectoris, Phthisi, Tussi sicca & humida, sub nomine BOUILLON BLANC, optimo cum successu, eo utuntur Galli.

150. *VERBASCUM*, *Lychnitis*, foliis cuneiformi-oblongis. *Linn. Spec.* 253. (*Hall.* 583.)

H. in sterilibus siccis, vulgaris; Corollis albidis minoribus, auf der Höhe. Floret Julio & sequ.

151. *VERBASCUM*, *nigrum*, foliis cordato-oblongis petiolatis. *Linn. S. N.* 169. *Spec.* 253. (*Hall.* 584.)

H. in ruderalis, secus vias ubique. Floret Julio & sequ.

Filamenta uti in precedente aequalia, omnia villosa, in hoc purpurea.

VINCA. G. P. 295.

Contorta. *Folliculi* 2, erecti. *Semina* nuda. *S. N.* 189.

152. *VINCA*, *minor*, caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis. *Linn. Spec.* 304. (*Pervinca.* *Hall.* 572.)

H. ad sepes, am Heiligenfloss; am Dollberg, vulgaris. Floret Aprili, Majo.

Pharm. *VINCAE PERVINCAE* Herba.

Caules repentes. Rami adscendentes, simplices, uniflori; Antheræ apice barbata. Folliculi dispermi, semper in nostrate.

SOLA-

SOLANUM, G. P. 251.

Cor. rotata. *Antheræ* subcoalitæ, apice poro gemino dehiscences. *Bacca* 2 - locularis. S. N. 172.

153. SOLANUM, *Dulcamara*, caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. *Linn. Spec.* 264. (*Hall.* 575)

H. ad fossas, & tipas Dilla; an der Mühlbach, vulgaris. Floret Junio, Julio.

Pharm. DULCAMARÆ Radix cum stipitibus.

Radix & caulium pars inferior inter sanguinem purificantis efficacissima. SASSAPARILLÆ americanæ, qua facile carere possemus, præstantissimum succedaneum europæum.

154. SOLANUM, *nigrum*, caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato - angulatis, racemis distichis nutantibus. *Linn. S. N.* 173. *Spec.* 266. (*Hall.* 576.)

H. fecus vias, in cultis, ubique vulgaris. Floret Julio, Augusto.

Pharm. SOLANI NIGRI Herba.

ATROPA, G. P. 249

Cor. campanulata. *Stamina* distantia. *Bacca* globosa, 2 - locularis. S. N. 171.

155. ATROPA, *Belladonna*, caule herbaceo, foliis ovatis integris. *Linn. Spec.* 260. (*Belladonna.* *Hall.* 579.)

H. in sylvis in der Hölze; im Hirschberg; im Thiergarten, copiose. Floret Junio, Julio.

Pharm. BELLADONNÆ Herba.

*** Flores monopetali, superi.

PHYTEUMA, G. P. 220.

Cor. rotata, 5 - partita: laciniis linearibus. *Stigma* 2 - f. 3 - fidum. *Caps.* 2 - f. 3 - locularis, infera, perforata. S. N. 162.

156. PHYTEUMA, *spicata*, spica oblonga, capsulis bilocularibus, foliis radicalibus cordatis. *Linn. Spec.* 242. (*Rapunculus.* *Hall.* 684.)

H. in pratis sylvaticis, am Hirschberg; auf der Kehe; in pomariis, in der untern Pitze. Corollis albis, purpureisque variat. Floret Majo.

Val-

Valvulae 5, conniventes, Receptaculum tegentes, apice in Filamenta desinentes, uti in Campanula. Stigma saepius 2 - quam 3-fidum.

CAMPANULA. G. P. 218.

Cor. campanulata, fundo clauso, valvis stamini-feris. Stigma 3-fidum. Caps. infera, poris lateralibus dehiscens. S. N. 159.

a. Foliis levioribus angustioribus;

157. CAMPANULA, *rotundifolia*, foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus. *Linn. Spec.* 232.

α. Caule unifloro. *Hall.* 700.

β. Caule multifloro. *Hall.* 701.

H. α. in collibus siccis *am Stützelberg*; β. in muris & arvis, passim. Floret aestate.

158. CAMPANULA, *Rapunculus*, foliis undulatis: radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula coarctata. *Linn. Spec.* 232. (*Hall.* 699.)

H. in arvis & pratis sylvaticis, *am Homberg*; & alibi frequens. Floret Junio, Julio.

Radices cum primariis foliis, a nostratibus primo vere in acetaria, Rapunzeln dicta, recipiuntur.

159. CAMPANULA, *persicifolia*, foliis radicalibus obovatis, caulinis lanceolato-linearibus subserratis sessilibus remotis. *Linn. Spec.* 232. (*Hall.* 697.)

H. in sylvarum asperis *am Homberg*; *Dollberg*; *im Beilstein* frequens. Floret Julio.

b. Foliis scabris latioribus.

160. CAMPANULA, *latifolia*, foliis ovato-lanceolatis, caule simplicissimo tereti, floribus solitariis pedunculatis, fructibus cernuis. *Linn. Spec.* 233. (*Hall.* 691.)

H. in sylvaticis montosis, ad sepes, *bey Langenaubach*; & *Erbach*. Floret Julio.

161. CAMPANULA, *rapunculoides*, foliis cordato-lanceolatis, caule ramoso, floribus secundis sparsis, calycibus reflexis. *Linn. Spec.* 234. (*Hall.* 692.)

H. ad versuras, *am Homberg*; *Dollberg*, rarius; ad viam publicam *am Beilstein* copiose. Floret Julio & sequ.

162. CAMPANULA, *Trachelium*, caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. *Linn. Spec.* 235. (*Hall.* 690.)

H. in sylvis, *am Homberg*, rarius; *am Rehberg*; in nemorosis circa *Erbach*, frequens. Floret Julio, Augusto.

163. CAMPANULA, *glomerata*, caule angulato simplici, floribus sessilibus, capitulo terminali. *Linn. Spec.* 235. (*Hall.* 685.)

H. ad sepes *im Rosenwäldgen*, rarius. Floret Junio, Julio.

LONICERA. G. P. 233.

Cor. 1-petala, irregularis. *Bacca* polysperma, 2-locularis, infera. S. N. 165.

164. LONICERA, *Periclymenum*, capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus distinctis. *Linn. Spec.* 247. (*Caprifolium.* *Hall.* 673.)

H. in dumetis ad pagos *Schönbach & Frohnhausen*. Floret Junio.

165. LONICERA, *xylosteum*, pedunculis bifloris, bacis distinctis, foliis integerrimis pubescentibus. *Linn. Spec.* 248. (*Caprifolium.* *Hall.* 677.)

H. in sepibus, & dumetis, *in der Callenbach*, & alibi frequens. Floret Majo.

**** *Flores pentapetali, inferi.*

RHAMNUS. G. P. 265.

Cal. tubulosus: squamis stamina munientibus. Cor. nulla. *Bacca* rotunda. S. N. 178.

166. RHAMNUS, *catharticus*, spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis, caule erecto. *Linn. Spec.* 279. (*Hall.* 824.)

H. in sepibus *hinter dem Schloß*: Mas cum Femina. Floret Majo.

Maris Flores Germine imperfecto: Feminae squamis duplo minoribus, Antherisque polline destitutis, instructi sunt. Stigma 4-fidum. *Bacca* 4-locularis, 4-sperma.

Pharm. SPINAE CERVINAE *Bacca*.

167. RHAMNUS, *Frangula*, inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis. *Linn. Spec.* 280. (*Hall.* 821.)

H. in sylvis *am Homberg*; *im Bellstein*. Floret Majo, Junio.

Bacca

Bacca 2-locularis: Semina 2, rarius 3.

Pharm. FRANGULÆ Cortex.

EVONYMUS. G. P. 271.

Cor. 5-petala. Caps. 5-gona, 5-locularis, 5-valvis, colorata. Sem. calyptrata. S. N. 181.

168. EVONYMUS, *europæus*, (*tenuifolius*,) floribus plerisque quadrifidis. Linn. Spec. 286. (Hall. 829.)

H. ad sēpes am Dollberg, alibique vulgaris. Floret Majo.

Flores pentapetali in nostrate rarissimi.

***** Flores pentapetali, superi.

RIBES. G. P. 281.

Cor. 5-petala. Stamina calyci inserta. Stylus bifidus. Bacca polysperma, infera. S. N. 184.
a. Ribesia inermis.

169. RIBES, *rubrum*, inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. Linn. Spec. 290. (Hall. 818.)

H. in sepibus interhortensibus vulgaris. Floret Aprili, Majo.

Stylus bipartitus, reflexus. Petala bifida.

Pharm. RIBIUM RUBRORUM Bacca.

170. RIBES, *nigrum*, inerme, racemis pilosis, floribus oblongis. Linn. Spec. 291. (Hall. 819.)

H. in sepibus interhortensibus, über der neuen Brücke. Floret Majo.

Petala obtusa. Stylus simplex, vix sulco semidivisus. Stigma bifidum.

Hoc & præcedens, alias non spontanea; nonnunquam vero occurrunt, forte ab aviculis disseminata, in truncis arborum emortuis im Beilstein.

171. RIBES, *alpinum*, inerme, racemis erectis: bracteis flore longioribus. Linn. Spec. 291. (Hall. 817.)

H. Frutex in nostra regione constanter dioicus: Mas in dumetis & sepibus passim; Femina circa pagum Beilstein tantum, cum mare, rarius. Floret Martio, Aprili.

Maris Glandula petiolares hyalina. Racemi multiflori. Bractæ longitudine florum. Flores approximati, planiusculi. Calyx patens, Petala flavescentia, Antheræ pollinifera. Germen nullum

nullum, vix rudimentum calyce concretum. Stylus erectus, brevis. Stigmata emarcida. Fructus nullus.

Feminae Glandulae petiolares purpureae. Racemi 3-4-5-flori. Bractea floribus longiores. Flores remoti, oblongi. Calyx reflexus. Petala rubra. Antherae polline destituta. Germen corolla fere majus. Stylus semibifidus, staminibus longior. Stigmata sublobosa, reflexa. Baccae erectae, pentaspermae, rubrae, insipidae.

b. *Grossularia aculeata*.

172. RIBES, *Grossularia*, ramis aculeatis, petiolorum ciliis pilosis, baccis hirsutis Linn. Spec. 291?

H. in pomariis & sepibus interhortensibus auf der Schafelle rarius. Floret Aprili.

Rami cortice levi, aculeati: aculeis deciduis. Petiolorum pili villosi, fere pennati, non desiccanti Gemmae capitati. Flos unicus, rarissime geminus, nutans. Bractea tripartita. R. uvae crispae duplo major. Bacca magna, pubescens, rubra. An R. reclinati varietas?

173. RIBES, *Uva crispa*, ramis aculeatis, baccis glabris, pedicellis bractea monophylla. Linn. Spec. 292. (Hall. 820.)

H. ad sepes passim; in sylvis am Beilstein, & Homberg frequens. Floret Aprili.

HEDERA. G. P. 283.

Petala 5, oblonga. Bacca 5-sperma, calyce cincta. S. N. 184.

174. HEDERA, *Helix*, foliis ovatis lobatisque. Linn. Spec. 292. (Hall. 826.)

H. Junior sterilis, Foliis aetate varians, in sylvis am Homberg; im Beilstein; & alibi frequens; Arbor fructificans, ad murum Urbis vor dem Schloßpförger. Floret Septembri. Fructus subsequenti Aprili maturescunt.

Pharm. HEDERAE ARBOREE Folia, Baccæ, Gummi.

B. D I G Y N I A.

* Flores monopetali, inferi.

ASCLEPIAS. G. P. 306.

Contorta. Nectaria 5, ovata, concava, corniculum exferentia. S. N. 193.

175. ASCLEPIAS, *Vincetoxicum*, foliis ovatis basi barbaris, caule erecto, umbellis proliferis. Linn. Spec. 314. (Hall. 571.)

H. In

H. in sylvaticis montosis *am Homberg*; in der *Callenbach*; auf der *Steinseite* copiose. Floret Junio, Julio.

Pharm. VINCETOXICI. s. HIRUNDINARIÆ Radix.

GENTIANA. G. P. 322.

Cor. 1 - petala. Caps. 2 - valvis, 1 - locularis: Receptaculis 2, longitudinalibus. S. N. 199.

176. GENTIANA, *verna*, corolla quinquefida infundibuliformi caulem excedente, foliis radicalibus confertis majoribus. *Linn. Spec. 331.* (*Hall. 644.*)

H. in pratis versus *Burgk*, & *Hirschberg*. Floret Majo. ♀

177. GENTIANA, *Centaurium*, corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo, pistillo simplici. *Linn. S. N. 200. Spec. 332.* (*Hall. 648.*)

β. Gentiana corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule brevissimo ramosissimo. GERARD. *Prov. 311.*

H. α, in montosis sylvaticis *am Homberg*; *Dollberg*; hinter dem *Beilstein*, alibique vulgaris; β. auf dem *Säurviegen* rarius. Floret Julio. Augusto.

Antheræ sparso polline, spiraliter tortæ.

Pharm. α, CENTAURI MINORIS Herba cum Floribus.

178. GENTIANA, *Amarella*, corollis quinquefidis hypocrateriformibus fauce barbatis. *Linn. Spec. 334.* (*Hall. 650.*)

H. in pratis montosis *am Beilstein*, vix *digitalis*; in juniperetis auf dem *Rehberg* & *Homberg*, fere *bipedalis*, *ramosissima*. Floret Septembri.

Calyx inæqualis. Corollæ faucibus squamis quinque triangularibus, conniventibus, longissima ciliatis, clausa.

179. GENTIANA, *cruciata*, corollis quadrifidis imberbibus, floribus verticillatis sessilibus. *Linn. Spec. 334.* (*Hall. 643.*)

H. in sterilibus montosis *am Beilstein* rarius. Floret Julio, Augusto.

Denticuli Corolla laciniis interjecti bifidi, interne decurrentes. Stigmata revoluta.

.. Flores incompleti.

CHENOPODIUM. G. P. 309.

Cal. 5 - phyllus, 5 - gonus. Cor. 0. Sem. 1, lenticulare, superum. S. N. 194.

a. *Foliis angulosis.*

180. CHENOPODIUM, *Bonus Henricus*, foliis triangulari - sagittatis integerrimis, spicis compositis aphyllis axillaribus. *Linn. S. N. 194. Spec. 318. (Hall. 1578.)*

H. ad vias, juxta parietes, ad pagos frequens. Floret Junio, Julio.

Pharm. BONI HENRICI Herba.

181. CHENOPODIUM, *rubrum*, foliis cordato - triangularibus obrufiusculis dentatis, racemis erectis compositis subfoliosis, caule brevioribus. *Linn. S. N. 195. Spec. 318. (Hall. 1583.)*

H. in ruderatis, & cultis passim. Floret Julio, Augusto.

Pharm. ATRIFLIGIS SYLVESTRIS Herba.

182. CHENOPODIUM, *album*, foliis rhomboideo-triangularibus erosis postice integris; summis oblongis, racemis erectis. *Linn. Spec. 319. (Hall. 1579.)*

H. in hortis & cultis *auf dem Hintersand*, alibique frequens. Floret Julio.

183. CHENOPODIUM, *viride*, foliis rhomboideis dentato - sinuatis, racemis ramosis subfoliatis. *Linn. Spec. 319. (Hall. 1580.)*

H. in cultis *in der Pitze*; *auf dem Schießplatz* copiose. Floret Julio, Augusto.

184. CHENOPODIUM, *hybridum*, foliis cordatis angulato - acuminatis, racemis ramosis nudis. *Linn. Spec. 319. (Hall. 1581.)*

H. in sterilibus & cultis passim. Floret Julio, Augusto.

185. CHENOPODIUM, *glaucum*, foliis ovato - oblongis repandis, racemis nudis simplicibus glomeratis. *Linn. Spec. 320. (Hall. 1584.)*

H. in agris *am Dollberg*, & *Homberg*; *auf dem Hintersand* rarius. Floret Augusto.

186. CHENOPODIUM, *urbicum*, foliis triangularibus subdentatis, racemis confertis strictissimis cauli approximatis longissimis. *Linn. Spec. 318.*

H. in cultis oleraceis *in der untern Pitze*; *auf dem Schlüssel* rarius. Floret Julio, Augusto. ✕

b. *Foliis*

b. *Folius integris.*

187. CHENOPODIUM, *Vulvaria*, foliis integerrimis rhomboideo-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. *Linn. Spec. 321. (Hall. 1577.)*

H. unico in loco *im breiten Fahrweg, vor dem untern Thor.*
Floret Julio.

Pharm. VULVARIAE Herba.

188. CHENOPODIUM, *polyspermum*, foliis integerrimis ovatis, caule decumbente, cymis dichotomis aphyllis axillaribus. *Linn. Spec. 321. (Hall. 1576.)*

H. in cultis & hortis *vor dem untern Thor; auf dem Schießplatz; an der Mühlbach* frequens. Floret Junio, Julio.

Racini *florentes ramosi, spicati; fructiferentes cymosi, dichotomi.*

HERNIARIA. G. P. 308.

Cal. 5-partitus. Cor. o. Stamina 5 sterilia.

Caps. 1-sperma. S. N. 194.

189. HERNIARIA, *glabra*, glabra herbacea. *Linn. Spec. 317. (Hall. 1552.)*

H. in arvis sterilibus apricis *am Dollberg; auf dem Schießplatz* parcius; *auf der Sandvviese* copiose. Floret Junio & sequ.

Pharm. HERNIARIAE f. MILLEGRANAE Herba.

Calyx *sape 4-partitus*, Staminibus *quatuor*. Filamenta *Antheris destituta* reliquis *tenuiora*, *albidioraque*. Styli *duo*, *breves*: Stigmata *subglobosa*. Capsula *membranacea; digitis compressa*. Semen *atropurpureum, nitidum, apice profunde emarginatum, basi demissens.*

ULMUS. G. P. 316.

Cal. 5-fidus. Cor. o. Bacca *exsucca*, compresso-membranacea. S. N. 198.

190. ULMUS, *campestris*, foliis duplicato-ferratis: basi inaequalibus. *Linn. Spec. 327. (Hall. 1586.)*

H. circa pagum *Erbach* frequens. Floret Aprili.

Pharm. ULMI Cortex medius.

*** Flores *pentapétali, superi, dispermi.*
Umbellatae.

a. *Involucro universali, partialique.*

SANICULA. G. P. 326.

Umbellae *confertae, subcapitatae. Fructus scaber. Flores disci abortientes.* S. N. 202.

191. *SANICULA*, *europæa*, foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus. *Linn. Spec.* 339. (*Hall.* 737.)

H. in sylvis umbrosis, *am Rehberg*; *im Hirschberg*; *in der Hoerre* copiose. Floret Majo; Junio.

Pharm. *SANICULÆ* Herba.

HERACLEUM. G. P. 345.

Fructus ellipticus, emarginatus, compressus, striatus, marginatus. *Cor.* difformis, inflexo-emarginata. *Involucrum* caducum. S. N. 210.

192. *HERACLEUM*, *sphondylium*, foliolis pinnatifidis lævibus, floribus uniformibus. *Linn. S. N. II.* 210. (*vid. Errata.*) *Spec.* 358. (*Sphondylium-Hall.* 809.)

H. in pratis humidis, ubique frequens. Floret Junio & sequ.

Pharm. *BRANCÆ VRSI* Herba. (*male pro Acântho.*)

Foliorum lobi in planta serius florente (*Augusto*) multo minores, magisque divisi. Umbella radiata: Corollis ante expansionem purpureis seu viridibus, demum albis; inequalibus, duplo majoribus in radio; subequalibus in disco, centralibus saepe abortientibus.

OENANTHE. G. P. 352.

Flosculi difformes: in disco sessiles, steriles.

Fructus calyce coronatus. S. N. 212.

193. *OENANTHE*, *fistulosa*, stolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fistulosis. *Linn. Spec.* 365. (*Hall.* 755.)

H. in pratis paludosis circa pagum *Sinn.* Floret Junio.

CAUCALIS. G. P. 331.

Cor. radiatæ; disci masculæ. *Petala* inflexo-emarginata. *Fructus* fetis hispidus. *Involucra* integra. S. N. 205.

194. *CAUCALIS*, *daucoides*, umbellis trifidis aphyllis, umbellulis trispermis triphyllis. *Linn. S. N.* 205. (*Hall.* 739.)

CAUCALIS leptophylla. *Linn. Spec.* 347.

H. inter segetes *am Dollberg* copiose, albique frequens. Floret Julio, Augusto.

Radix

Radix fusiformis, annua. Caulis pedalis, erectus, sulcato-angulatus, ramosus, lavis: geniculis albidis-fetosis. Folia supradecomposita: Petiolis ut Folia subius setis albidis, raris adspersis, basi membranaceis; Pinnulis pinnatifidis, angustis, obsusiusculis, apice bi- s. trifidis. Umbella universalis radiis tribus, firmis, tetragonis; partialis radiis 5-7-9: quorum semper exteriores tres robustiores, fructiferi; centrales tenuiores, steriles. Involucrum variis foliolis unicum, lanceolatum, plerumque nullum; ejus loco, seta albida congesta. Involucellum dimidiatum, triphyllum, patens: foliis lanceolatis, longitudine flosculorum. Flores tres extimi majores, Hermaphroditi, fertiles; centrales 2-4-6, Masculi; steriles. Calycis lacinia lanceolata, extimis duobus reliquis majoribus. Petala, obcordata, emarginata, subpurpureascentia, inaequalia, aximo triplo majore. Stamina longitudine petalarum. Germen scabrum: Maris nudum, Calyce laxo. Singula Umbellula Fructus tres, distantes, oblongi, magni, Calyce coronati. Semen sulcatum, setis inaequalibus sursum hamatis-hispidum; nucleum oblongum condens.

DAUCUS. G. P. 333.

Cor. subradiata, omnes hermaphroditæ. Fructus pilis hispidus. S. N. 206.

195. DAUCUS, *Carota*, seminibus hispidis, petiolis subtus nervosis. *Linn. Spec. 348. (Hall. 746.)*

H. in sterilibus am. Galgenberg copiose, alibique frequens. Florer Junio, Julio.

Pharm. DAUCI SYLVESTRIS Semina.

TORDYLIUM. G. P. 330.

Cor. radiata, omnes hermaphroditæ. Fructus suborbiculatus, margine crenatus. Involucra longa, indivisa. S. N. 204.

196. TORDYLIUM, *Antbriscus*, umbellis confertis, foliis ovato-lanceolatis pinnatifidis. *Linn. Spec. 346. (Caucalis. Hall. 741.)*

H. secus vias passim; ad sepes am. Dollberg copiose. Floret Junio & sequ.

Seta in caule deorsum, in radiis umbella sursum adpressa. Involucr. univ. polyphyllum, Umbella brevius. Involucr. part. polyphyllum, longitudine Umbellula. Flosculi rubentes. Semina ovato-oblonga, trifurca, satis rigidis, hamatis, hispida.

PEUCEDANUM. G. P. 339.

Fructus ovatus, utrinque striatus, ala cinctus. Involucra brevissima. S. N. 208.

197. PEUCEDANUM, *Silaus*, foliolis pinnatifidis : laciniis oppositis, involucri universali diphylo. *Linn. Spec. 354. (Hall. 797.)*

H. in pratis humidiusculis auf dem Westervald inter Ober- und Nieder-Rosbach frequens. Floret Julio.

Radix perennis. Caulis bipedalis, brachiatus, sulcato-angulatus.

Folia supradecomposita, pinnulis petiolatis, subpinnatifidis: foliolis oppositis, lanceolatis, margine coarctato-carinatis, obtusiusculis, mucrona cartilagineo; extimis 2 f. 3, basi coadunatis.

Umbellae inaequales, radiis 10. Umbellulae aequales, planae.

Involucrum rarissime 1 - f. 2. phylum, plerumque nullum.

Involucella acaphylla: foliolis lineari-lanceolatis, margine membranaceis, longitudine Umbellulae. Corollae luteae, extus pallidiores: Petala lanceolata, acuta, apice inflexo, adnata,

nervo longitudinali. Filamenta corollae duplo fere longiora.

Germen 6-fidum, sulcatum. Styli brevissimi, petalis decedentibus longiores. Stigmata capitata. Semina ovato-oblonga, trinervia, depressiuscula, odorata.

198. CONIUM. G. P. 336. (Linn. Spec. 349.)

Involucella dimidiata, subtriphylla. Fructus subglobosus, 5-striatus, utrinque crenatus. S. N. 206.

198. CONIUM, *maculatum*, feminibus striatis. *Linn. Spec. 349. (Cicuta. Hall. 766.)*

H. in ruderatis hinc et dem Schloß; ad versuras am *Homburg; in cultis auf dem Hintersand, alibi frequens. Floret Julio.

Pharm. CICUTA (titius CORNIF). Herba.

Radix biennis, fusiformis, albida. Caulis tri- f. quadripedalis, erectus, caenofus, teres, aequalis, fistulosus, glaber, levissime striatus; ultra medium usque maculis purpureascentibus adpersus.

Folia radicalia magna, supradecomposita, nitida; supra obscure viridia, subtus pallidiora. Petioli utriusculi maculati, glabri; fistulosi, succulenti, teretes, supra vix depressiusculi. Folia caulina multo minora: Vaginis membranaceis, nervosis, margine membranula tenui, albida, acuta apice prominula, auctis; Pinnulis teneris, subpinnatifidis, inciso-dentatis, extimis confluentibus.

Umbella planiuscula: radiis 10-12, erecto-patulis. Umbellulae confimiles, radiis 15-16. Involucrum 3-5. phylum: foliolis ovato-lanceolatis, acutis, basi coalitis, inaequalibus, reflexis, ultra medium usque albido marginatis, saepe unidentatis. Involucella monophylla, dimidiata, reflexo-patula, semitri-raris quadrifida: Laciniis inaequalibus, ovatis, acutis.

Flosculi

Flosculi aequales, omnes fertiles. Calyx nullus. Cor. Petala alba, inflexo cordata, inequalia, nervo intermedio supra eminentiore. Stamina longitudine corollae. Germen subrotundum, striatum, Styli reflexi, brevissimi. Stigmata vix incrassata. Fructus subglobosus, striatus; Striis undulato-flexuosis. Semina duo, hemisphaerica, nervis tribus, eminentibus, crenatis. Umbellae in Caulē & Ramis terminali proximae; saepe oppositae. Totius Plantae odor si digitis conquassetur, nauseosus, ingratus, Urina murina non absimilis.

Licet Planta haec pervulgaris sit, tamen ejus Descriptionem accuratorem dare volui; ut ad preparationem **EXTRACTI CONDI** (CYCUTAE Clar. STOERCKII) vera ac genuina Planta, his notis ab aliis facillime distinguenda, non falsa, ut saepe fieri solet, adhibeatur. Hujus **Extracti** rite preparati praestantiam, in plurimis morbis difficillimis, imprimis in **Cancro exulcerato** expertus sum. Inter alios, Rusticus quidam incola Herborn-Seelbacensis *Joannes Jacobus Grafe*, qui pessimo cancro exulcerato, per plures annos in parte oris sinistra laboraverat, Anno 1769, ad me venit. Exulceratio cancrosum in labio superiore, inferiore, & gena, adeo se extendebat, ut dentes inaequales canini & molares, maxillaque gingiva erosa denudata, visui horribili aspectu paterent; ichore foetidissimo manante. Solo hujus Plantae Extracto puro crassius inspissato, absque foliorum pulvere admixto, paucisque intermixtis evacuantibus rhabarbarinis, spatio quinque mensium, horribilem istum Cancrum felicissime extirpavi; ita quidem, ut os pristinam formam exacte reciperet, barbaque novae partes tegerentur. Et quod mirandum erat: una hoc remedio, Ulcus antiquum sinuosum manans, in colli sinistra parte, quo hic vir per viginti annos affectus fuerat, se consolidavit, & penitus evanuit. Adhuc dum scribo (1774.) in vivis est, & incorrupta fruitur valetudine.

Remedium certe innocuum tutissimumque. Continuat & sensim augenda dosi, audaci non timida manu porrigendum. Dosi a granis quinque, usque ad dragmas duas & ultra, bis de die, auxi. Etiam aegroti sensibiliores, a nimie hujus Extracti aucta dosi, nihil aliud ab initio sentiebant, quam lenissimas tensiones spasticas fugaces in artubus; alique saepe scintillas igneas, per aëra ante oculos sese moventes observarunt, absque ullo alio damno subsequente.

BUNIAM. G. P. 335.

Cor. uniformis. Umbella conferta. Fructus ovati. S. N. 206,

199. *BUNIUM, Bulbocastanum.* Linn. Spec. 349.
(*Bulbocastanum* - Hall. 783.)

H. inter segetes *bey dem Kalkofen*; in agris *hinter dem Homberg* copiose; *am Galgenberg* frequens. Floret Julio.

BUPLEURUM. G. P. 328.

Involucra umbellulæ majora, pentaphylla.
Petala involuta. *Fructus* subrotundus, compressus, striatus. S. N. 203.

200. *BUPLEURUM, rotundifolium*, involucris universalibus nullis, foliis perfoliatis. Linn. Spec. 340.
(Hall. 767.)

H. in cultis *auf dem Hintersand* rarius; in hortis variis *vor dem untern Thon* frequens. Floret Junio, Julio.

Rharm. PERFOLIATA Herba, Semina.

SIUM. G. P. 348.

Fructus subovatus, striatus. *Involucrum* polyphyllum. *Petala* cordata. S. N. 211.

201. *SIUM, latifolium*, foliis pinnatis, umbella terminali. Linn. Spec. 361. (Hall. 777.)

H. in fossis & rivulis pratorum *im Pulversgrund*, *am Beilstein* rarius. Floret Julio.

202. *SIUM, angustifolium*, foliis pinnatis, umbellis axillaribus pedunculatis, involucro universalis pinnatifido. Linn. S. N. 211. Spec. 1672.

H. in rivulis pratorum *im Fischweyhergrund*. Floret Augusto. *Foliolorum* paria inferiora, a sequentibus remotissima, pinnis utrinque auriculatis, fere hastatis. Folia caulina, pinnis angustioribus, subauriculatis, serratis; serraturis latiusculis, acuminatissimis. Umbella oppositifolia, pedunculata. *Involucr. universale* 5-7. phyllum, inaequale: foliolis plerisque pinnatifidis, unico semper reliquis longiore. *Involucella* simillima, etiam pinnatifida.

203. *SIUM, nodiflorum*, foliis pinnatis, umbellis axillaribus sessilibus. Linn. Spec. 361. (Hall. 778.)

H. cum præcedente rarius *im Guldnersgrund*. Floret Julio, Augusto. †

SELINUM. G. P. 337.

Fructus ovali-oblongus, compresso-planus, in medio striatus. *Involucrum* reflexum. *Petala* cordata, æqualia. S. N. 207.

204. *SELINUM*, *Carvisfolia*, caule sulcato acutangulo, involucrio universali caduco, pistillis fructus reflexis. *Linn. Spec.* 350. (*Hall.* 802)

H. in pratis humidiusculis, im *Fischweyhergrund* rarius; circa pagum *Sinn* copiose. Floret Julio.

Radix perennis, fusiformis, superne ramosa, odorata. Caulis 2- f. 3- pedalis, subramosus, erectus, striatus, 10- sulcatus; angulis membranaceis, ad ramificationes, praeterea sub Umbella, undulato-flexuosis. Folia erecta, angustata, triplicato pinnata: Petiolis subtepragonis, supra sulco exaratis, basi membranaceis, nervosis; Foliolis oppositis, bi f. trilobis; lobis lanceolato-acuminatis, mucrone albedo cartilagineo. Umbella plana, aequalis, maturo fructu convexa: Radiis numerosis, sulco superne exaratis. Involucrum in virginis Umbellis (loco natali) polyphyllum, in florentibus monophyllum: Foliolis lanceolato-subulatis, unico excepto, mox deciduis. Involucella polyphylla, patentia: foliolis subulatis. Flores ante explicationem purpurascens, dein albi, extimi paulo majores. Calyx nullus. Petala subaqualia, inflexo-cordata, erectiuscula. Stamina Corolla duplo longiora. Styli erecti, breves, demum longiores, reflexi, persistentes. Fructus ovalis, compressus: apice purpureo; Stylusque reflexis coronatus. Semina matura lateribus a se invicem discedentia hiant, nervi dorsales tribus, eminentibus, notata.

ANGELICA. G. P. 347.

Fructus subrotundus, angulatus, solidus, stylis reflexis. Corollae aequales: petalis incurvis. S. N. 211.

205. *ANGELICA*, *Archangelica*, foliorum impari lobato. *Linn. Spec.* 360. (*Hall.* 807.)

H. ad sepes interhortenses am *Pitzbrücken* frequens; Quasi indigena valde luxurians. Floret Julio.

Pharm. ANGELICAE SATIVAE Radix.

206. *ANGELICA*, *sylvestris*, foliolis aequalibus ovato-lanceolatis serratis. *Linn. Spec.* 361. (*Hall.* 806.)

H. in fossis, & pratis humidiusculis frequens. Floret Julio.

Pharm. ANGELICAE SYLVESTRIS Radix.

b. Involucris partialibus; Universali nullo.

AETHUSA. G. P. 355.

Involucella dimidiata, 3-phylla, pendula. Fructus striatus. S. N. 213.

207. *AETHUSA*, *Cynapium*. *Linn. Spec.* 367. (*Hall.* 765.)

H. in cultis inter olera frequens. Floret æstate.
Involucella sæpe 5-phylla.

SCANDIX. G. P. 357.

Cor. radiata. Fructus subulatus. Petala emarginata. Flosculi disci sæpe masculi. S. N. 213.

208. *SCANDIX*, *odorata*, feminibus sulcatis angulatis. *Linn. Spec.* 368. (*Myrrbis. Hall.* 753.)

H. in pomariis *am Homberg unter der Lithau*, alibique frequens. Floret Majo, Junio.

209. *SCANDIX*, *Pecten veneris*, feminibus rostro longissimo. *Linn. S. N. 213. Spec.* 368. (*Myrrbis. Hall.* 754.)

H. inter segetes *auf dem Dollberg* frequens. Floret Junio.
Involucella apice bifida. Semen nucleum condens, uti in precedente. Rostrum scabrum.

210. *SCANDIX*, *Cerefolium*, feminibus nitidis ovato-subulatis, umbellis sessilibus lateralibus. *Linn. Spec.* 368. (*Cerefolium. Hall.* 747.)

H. in cultis, ruderatis, & ad sepes frequens. Floret Majo & sequ.

Pharm. CEREFOLII Herba.

211. *SCANDIX*, *Anthriscus*, feminibus ovaris hispidis, corollis uniformibus, caule lævi. *Linn. Spec.* 368. (*Caucalis. Hall.* 743.)

H. in arvis inter segetes, *am Galgenberg*; olim lecta, nunc rarissima planta. Floret Julio.

Invol. universale sæpe monophyllum. Involucella 5-phylla: foliolis lanceolatis, mucronatis, ciliatis. Fructus singula umbellula 5, rarius 6, ovati, hispidi, bicornes.

CHÆROPHYLLUM. G. P. 358.

Involuerum reflexum, concavum. Petala inflexo-cordata. Fructus oblongus, lævis. S. N. 214.

212. *CHÆROPHYLLUM*, *sylvestre*, caule lævi striato, geniculis tumidiusculis. *Linn. Spec.* 369. (*Cerefolium. Hall.* 748.)

F. in pratis, pomariis, ad sepes, ubique vulgaris. Floret Majo, Junio.

Pharm. CICUTARIAE Herba.

213. CHAEROPHYLLUM, *bulbosum*, caule geniculis tumido, basi hirsuto. Linn. S. N. 214. Spec. 370. (*Myrrbis*. Hall. 752.)

H. in sylvis, in der Hölle frequens. Floret Julio.

214. CHAEROPHYLLUM, *temulum*, caule scabro: geniculis tumidis. Linn. Spec. 370. (*Myrrbis*. Hall. 750.)

H. ad sepes passim. Floret Junio, Julio.

Flosculi disci abortientes, centrali excepto, qui saepe fertilis.

215. CHAEROPHYLLUM, *hirsutum*, caule aequali, foliolis incisus acutis, fructibus biaristatis. Linn. S. N. 214. Spec. 371. (*Myrrbis*. Hall. 751.)

H. in sylvaticis montosis circa Langenaubach infrequens. Floret Junio, Julio.

PELLANDRIUM. G. P. 353.

Flosculi disci minores. Fructus ovatus, laevis, coronatus perianthio & pistillo. S. N. 213.

216. PHELLANDRIUM, *aquaticum*, foliorum ramificationibus divaricatis. Linn. Spec. 366. (Hall. 757.)

H. in fossis Urbis am Judenweyher. Floret Junio, Julio.

Calycis lacinia 2 exteriores, reliquis duplo longiores.

c. Involucro nullo; nec universali, nec partialibus.

CARUM. G. P. 365.

Fructus ovato-oblongus, striatus. Involucrum 1. phyllum. Petala carinata, inflexo-emarginata. S. N. 216.

217. CARUM, *Carvi*. Linn. Spec. 378. (Hall. 789.)

H. in pratis passim; auf der Sandwiese copiose. Floret Majo, Junio.

Pharm. CARVI Semina.

PASTINACA: G. P. 362.

Fructus ellipticus, compresso-planus. Petala involuta, integra. S. N. 216.

218. PASTINACA, *sativa*, foliis simpliciter pinnatis. Linn. Spec. 376. (Hall. 808.)

H. in cultis auf dem Hintersand; & alibi frequens. Floret Julio.

Pharm. PASTINACAE Radix, Semina.

ANE-

ANETHUM. G. P. 364.

Fructus subovatus, compressus, striatus.

Petala involuta, integra. S. N. 216:

219. ANETHUM, *graveolens*, fructibus compressis.
Linn. Spec. 377.

H. in cultis, inter olera frequens. Floret Julio.

Pharm. ANETHI Herba, Semina.

220. ANETHUM, *Feniculum*, fructibus ovatis. *Linn. Spec.* 377. (*Feniculum. Hall.* 760.)

H. in cultis oleraceis bey dem dicken Thurm; vor dem Sand - Thor parcius. Floret Julio.

Pharm. FOENICULI Radix, Herba, Semina.

ÆGOPODIUM. G. P. 368.

Fructus ovato-oblongus, striatus. S. N. 217.

221. ÆGOPODIUM, *Podagraria*, foliis caulinis summis ternatis. *Linn. Spec.* 379. (*Podagraria. Hall.* 759.)

H. ad sepes passim. Floret Julio.

APIUM. G. P. 367.

Fructus ovatus, striatus. *Involucr.* 1 - phyl-
lum. Petala æqualia. S. N. 217.

222. APIUM, *Petroselinum*, foliis caulinis linearibus, involucellis minutis. *Linn. Spec.* 379.

H. in cultis am Sieghaus; auf dem Hintersand; ali-
 que infrequens. Floret Julio.

Pharm. PETROSELINI Radix, Herba, Semina.

223. APIUM, *graveolens*, foliis caulinis cuneiformi-
 bus. *Linn. Spec.* 379. (*Hall.* 784.)

H. in fossis, an der Mühlbach, unter der Walck-
 mühle rarius. Floret Julio.

Pharm. APII Radix, Semina.

PIMPINELLA. G. P. 366.

Fructus ovato oblongus. *Petala* inflexa. *Stig-
 mata* subglobosa. S. N. 217.

224. PIMPINELLA, *saxifraga*, foliis pinnatis, folio-
 lis radicalibus subrotundis; summis linearibus.
Linn. Spec. 378.

minor,

minor, α . *Pimpinella saxifraga minor*. *Baub. Pin.*
160. (*Tragofelinum* Hall. 786.)

major, β . *Pimpinella saxifraga major*, umbella can-
dida. *Baub. Pin.* 159. (*Hall.* 785.)

H. α . in pratis & pascuis siccis auf der Sandvviese;
 β . Foliis triplo majoribus, in pratis bey Sinn co-
piose. Floret Julio.

Pharm. PIMPINELLAE ALBAE Radix.

225. PIMPINELLA, *bircina*, foliis duplicato-pinnatis,
pinnulis profundissime lobatis. (*Tragofelinum*.
Hall. 787.)

Pimpinella saxifraga, *bircina* var. ϵ . *Linn.*
Spec. 378.

H. in collibus siccis passim. Floret Junio & seq.

C. TRIGYNIA.

* Flores superi.

VIBURNUM. G. P. 370.

Cal. 5-partitus, superus. *Cor.* 5-fida. *Bacca*
1-sperma. S. N. 218.

226. VIBURNUM, *Lantana*, foliis cordatis ferratis ve-
nosis subtus tomentosis. *Linn. Spec.* 384
(*Hall.* 669.)

H. in dumetis & ad sepes am Gälgenberg, versus
Burgk frequens. Floret Junio.

227. VIBURNUM, *Opulus*, foliis lobatis, petiolis glan-
dulosis. *Linn. Spec.* 384. (*Opulus.* *Hall.* 668.)

H. ad sepes & ripas Dilla, auf der Weissgärber
Wiese; & alibi vulgaris. Floret Junio.

SAMBUCUS. G. P. 372.

Cal. 5-partitus. *Cor.* 5-fida. *Bacca* 3-sper-
ma. S. N. 219.

228. SAMBUCUS, *Ebulus*, cymis tripartitis, stipulis
foliaceis, caule herbaceo. *Linn. S. N.* 219. *Spec.*
385. (*Hall.* 671.)

H. in

H. in nemorosis ad pagum *Erbach* & *Sinn.* Floret Junio.

Pharm. *EBULI* Radix, Baccæ, Semina.

Corolla subpurpurea: Lacinia concava, ovata, acuta, apicibus incurvis: Antheræ oblongæ. Semina receptaculo columnari affixa.

229. *SAMBUCUS*, nigra, cymis quinquepartitis, caule arboreo. *Linn. Spec.* 385. (*Hall.* 670.)

H. ad sepes passim. Floret Junio.

Pharm. *SAMBUCI* Flores, Baccæ.

Corolla alba: Lacinia convexa, obtusissima.

230. *SAMBUCUS*, racemosa, racemis compositis ovatis, caule arboreo. *Linn. Spec.* 386. (*Hall.* 672.)

H. in nemorosis bey denen Steinkammern circa *Erbach* frequens. Floret Martio, Aprili.

Corolla exigua, viridis: Lacinia concava. Baccæ rubra.

** Flores inferi.

STAPHYLEA. G. P. 374.

Cal. 5-partitus. Petala 5. Caps. inflatæ, connatæ. Sem. 2, globosa cum cicatrice. S. N.

219.

231. *STAPHYLEA*, pinnata, foliis pinnatis. *Linn. Spec.* 386. (*Hall.* 831.)

H. in sylvaticis montosis auf der Schindgrube; ad sepes am *Homberg* rarius. Floret Majo, Junio.

Styli duo, sapias tres. Caplula trilocularis. Semina constanter duo in majoribus loculamentis, tertio abortiente.

ALSINE. G. P. 380.

Cal. 5-phyllus. Petala 5, æqualia. Caps. 1-locularis, 3-valvis. S. N. 221.

232. *ALSINE*, media, petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. *Linn. Spec.* 389. (*Hall.* 88c.)

H. in cultis & agris copiosissime. Floret tota fere æstate.

D. TETRAGYNIA.

PARNASSIA. G. P. 384.

Cal. 5-partitus. Petala 5. Nectaria 5, cordata,

data, ciliata apicibus globosis. *Caps.* 4. valvis. S. N. 221.

233. PARNASSIA, *palustris*. Linn. Spec. 391. (Hall. 832.)

H. in pratis humidis, ad pagos *Enderoth*, *Emmerichenhayn*, & *Erbach* frequens. Floret Augusto.

E. P E N T A G Y N I A.

LINUM. G. P. 389.

Cal. 5. phyllus. *Petala* 5. *Caps.* 5. valvis, 10. locularis. *Sem.* solitaria. S. N. 223.

234. LINUM, *usitatissimum*, calycibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subsolitario. Linn. Spec. 397. Hall. 836.)

H. in arvis auf dem Schießplatz; am Homberg; Dollberg; infrequens. Floret Julio.

Pharm. LINI Semina.

235. LINUM, *catharticum*, foliis oppositis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. Linn. Spec. 401. (Hall. 839.)

H. in pratis ficcis passim. Floret Junio, Julio.

Pharm. LINI CATHARTICI Herba

Filamenta basi connata, germen vestientia; interjectis denticulis alternis, exiguis, acutis. (Geranii.)

236. LINUM, *Radiola*, foliis oppositis, caule dichotomo, floribus tetrandris tetragynis. Linn. Spec. 402. (Hall. 840.)

H. in arenosis humidis, circa *Langenaubach*; ipse nondum legi. Floret aestate +.

DROSERA. G. P. 391.

Cal. 5. fidus. *Petala* 5. *Caps.* 1. locularis: apice 5. valvis. *Sem.* plurima. S. N. 225.

237. DROSERA, *rotundifolia*, scapis radicatis, foliis orbiculatis. Linn. Spec. 402. (Rorella. Hall. 834.)

H. in pratis udis, circa *Mademühlen*; *Hohenroth*. Floret Julio.

Pharm. RORELLAE f. RORIS SOLIS Herba.

238. *DROSER*, *longifolia*, scapis radicatis, foliis oblongis. *Linn. Spec.* 403. (*Rorella. Hall.* 833.)
H. cum precedente rarius, cujus forte varietas est. Floret Julio.

F. POLYGYNIA.

MYOSURUS. G.P. 394.

Cal. 5 - phyllus, basi adnatus. *Nectaria* 5, subulata, petaliformia. *Sem.* numerosa.
S. N. 227.

239. *MYOSURUS*, *minimus*. *Linn. Spec.* 407. (*Hall.* 1159.)

H. in agris arenosis *am Dollberg*; in cultis in *der untern Pitze* frequens. Floret Majo.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

A. MONOGYNIA.

* *Flores calyculati, calyce corollaque instructi.*

BERBERIS. G. P. 442.

Cal. 6 - phyllus. *Petala* 6: ad ungues glandulis 2. *Stylus* 0. *Bacca* 2 - sperma. S. N. 252.

240. *BERBERIS*, *vulgaris*, pedunculis racemosis. *Linn. Spec.* 471. (*Hall.* 828.)

H. ad sepes *binter dem Schloß* rarius; ad pagos *Flühbach & Greiffenstein* frequens. Floret Junio.

Pharm. *BERBERIDIS* Fructus.

** *Flores spathacei f. glumacei.*

LEUCOJUM. G. P. 402.

Cor. campaniformis, 6 - partita, apicibus incrassata. *Stigma* simplex. S. N. 234.

241. *LEUCOJUM*, *vernum*, spatha uniflora, stylo clavato. *Linn. Spec.* 414. (*Galanthus. Hall.* 1253.)

H. in pratis *an der Dille*, *unter dem Sieghaus*; in nemorosis *ad Erbach*; im *Thiergarten* copiose. Floret Martio.

NARCIS-

NARCISSUS. G. P. 403.

Petala 6: Nectario infundibuliformi, 1-phyllo. Stam. intra nectarium. S. N. 234.

242. NARCISSUS, *poëticus*, spatha uniflora, nectario rotato brevissimo scarioso crenulato. *Linn. Spec. 414. (Hall. 1250.)*

H. in pomariis & pratis *am Siebause* rarius. Floret Majo.

243. NARCISSUS, *Pseudo-Narcissus*, spatha uniflora, nectario campanulato erecto crispo æquantem petala ovata. *Linn. Spec. 414. (Hall. 1252.)*

H. in pomariis & pratis *am Siebause* copiose. Floret Martio.

ALLIUM. G. P. 409.

Cor. 6 partita, patens. Spatha multiflora. Umbella congesta. Caps. supera. S. N. 237.

244. ALLIUM, *carinatum*, caule planitolio bulbifero, staminibus subulatis. *Linn. Spec. 426. (Hall. 1224.)*

H. in sylvaticis montosis *am geistlichen Berg* Floret Julio.

245. ALLIUM, *vincale*, caule teretifolio bulbifero, staminibus tricuspидatis. *Linn. Spec. 423. (Hall. 1221.)*

H. in sylvaticis montosis *bey dem Fühlenhause*. Floret Julio.

246. ALLIUM, *oleraceum*, caule teretifolio bulbifero, foliis scabris semiteretibus subtus sulcatis, staminibus simplicibus. *Linn. Spec. 429. (Hall. 1223.)*

H. in pomariis & pratis siccis passim. Floret Julio.

*** Flores nulli

CONVALLARIA. G. P. 425.

Cor. 6-fida. Bacca maculosa. 3-locularis. S. N. 246.

247. CONVALLARIA, *majalis*, scapo nudo. *Linn. Spec. 451 (Polygonatum. Hall. 1241.)*

H. in montosis *am der Sternseite*; *in der Callenbach*; in pratis sylvaticis *bey Langenbach*; alibique frequens. Floret Majo. *Pharm. LILII CONVALLII flores.*

248. CONVALLARIA, *verticillata*, foliis verticillatis. *Linn. Spec. 451. (Hall. 1244.)*

H. in sylvaticis montosis *im Hirschberg, auf dem Westervald*
circa *Willingen*. Floret Junio.

249. CONVALLARIA, *Polygonatum*, foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunifloris. *Linn. Spec. 451. (Hall. 1242.)*

H. in sylvis; *im Hirschberg* frequens. Floret Majo.

Pharm. SIGILLI SALOMONIS Radix.

250. CONVALLARIA, *multiflora*, foliis alternis amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis axillaribus multifloris. *Linn. Spec. 452. (Hall. 1243.)*

H. in sylvis, *in der Höre; im Hirschberg & Thiergarten* frequens; in dumetis *am Homberg* parcius. Floret Majo.

251. CONVALLARIA, *bifolia*, foliis cordatis, floribus retrandris. *Linn. S. N. 247. Spec. 452. (Unifolium. Hall. 1240.)*

H. in pratis sylvaticis asperis, *im Hirschberg; in der Höre*; vulgaris. Floret Majo, Junio.

Pedicelli *gemini*. Corolla 4-partita. Stamina quatuor. Stigma *bifidum*. Bacca *bilocularis*; *disperma*.

• ANTHERICUM. G. P. 422.

Cor. 6-petala, patens. Caps. ovata. S. N. 244.

252. ANTHERICUM, *Liliago*, foliis planis, scapo simplicissimo, corollis planis, pistillo declinato. *Linn. Spec. 445. (Pbalangium. Hall. 1207.)*

H. in montosis sylvaticis *im Beilstein* frequens. Floret Junio.

ORNITHOGALUM. G. P. 418.

Cor. 6-petala, erecta, persistens, supra medium patens. Filamenta alterna basi dilatata. S. N. 242.

253. ORNITHOGALUM, *luteum*, scapo anguloso diphylo, pedunculis umbellatis simplicibus. *Linn. Spec. 439. (Pbalangium. Hall. 1213.)*

H. in pratis & pomariis *unter der neuen Brücke*, alibique copiose. Floret Martio, Aprili.

254. ORNITHOGALUM, *minimum*, scapo angulato diphylo, pedunculis umbellatis ramosis. *Linn. Spec. 440. (Hall. 1214.)*

H. in agris *in der Aue; am Dollberg* parcius. Floret Aprili.
Scapo

Scapo subtereti, Umbella brevior, Involucris foliis pluribus, longioribus; Pedunculis teretibus, subramosis, pubescentibus; Corollae petalis 6-8-9, aurea flavedine nitentibus, patentissimis, acutioribus; tribus exterioribus obtusioribus, satius pubescentibus; Pistillo subvillosa, plerumque abortiente; Bulbali congestis, axillaribus, bracteatis, quibus planta propagatur, a precedente distinguitur.

255. ORNITHOGALUM, pyrenaicum, racemo longissimo, filamentis lanceolatis, pedunculis floriferis patentibus aequalibus: fructiferis scapo approximatis. Linn. Spec. 440. (Hall. 1210.)

H. in pomariis am Sieghaus rarius; dubia civis ex hortis augea. Floret Majo.

SCILLA, G. P. 419.

Cor. 6-petala, patens, decidua, Filamenta filiformia. S. N. 243.

256. SCILLA, amoena, floribus lateralibus alternis subnutantibus, scapo angulato. Linn. S. N. 243. Spec. 443. (Phalangium. Hall. 1211 ?)

H. in pomariis am Sieghause rarius; planta exoticæ originis. Floret Majo.

ASPARAGUS, G. P. 424.

Cor. 6-partita, erecta: petalis tribus interioribus apice reflexis. Bacca 3-locularis: 2-sperma. S. N. 245.

257. ASPARAGUS, officinalis, caule herbaceo tereti erecto, foliis setaceis, stipulis paribus. Linn. S. N. 245. Spec. 448. (Hall. 1239.)

H. in pomariis am Sieghause; ad muros pontis novi; alibique rarius. Floret Junio, Julio.

Pharm. ASPARAGI Radix, Semina.

Nostra Planta culta & spontanea, semper est dioica. Maris Corolla duplo major; Stamina perfecta; Pistillum imperfectum, exiguum, abortiens. Feminae Corolla apicibus omnibus erectis; Stamina castrata s. Antheris destituta. Pistillum longitudine rubi corolla; Stigma crassiusculum, trifidum. Bacca hexasperma.

LILIUM, G. P. 410.

Cor. 6-petala, campanulata: linea longitu-

distali nectarifera. *Caps.* valvulis pilo cancellato connexis. S. N. 240.

258. LILIUM, *Martagon*, foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Linn. Spec.* 435. (*Hall.* 12. 3.)

H. in pomariis *am Sieghause* varius. Floret Junio.

TULIPA. G. P. 415.

Cor. 6-petala, campanulata. *Stylus* 0. S. N. 241.

259. TULIPA, *sylvestris*, flore subnutante, foliis lanceolatis. *Linn. Spec.* 438 (*Hall.* 1. 36.)

H. in pratis & pomis *unter der neuen Brücke*; alibique copiosissime. Floret Majo.

Petala omnia apice, tria, interiora etiam basi villosa.

**** Flores incompleti.

ACORUS. G. P. 434.

- T. XII. f. 12. *Spadix* cylindricus, rectus flosculis.

Cor. 6-petala, (c. C. M.) nuda. *Stylus* 0. *Caps.* (p). 3-locularis. (r). S. N. 249.

260. ACORUS, *Calamus*. *Linn. Spec.* 462. (*Hall.* 1307.)

H. in fossis *bey der obern Papiermühle*; *am steinern Waag* rarius. Floret Junio.

Pharm. CALAMI AROMATICI Radix.

JUNCUS. G. P. 437.

Cal 6-phyllus. Cor. 0. *Caps.* 1-locularis. S. N. 250.

a. Culmis nudis. *Capsulis* polyspermis.

261. JUNCUS, *conglomeratus*, culmo nudo stricto, capitulo laterali. *Linn. Spec.* 464. (*Hall.* 1312.)

H. in pratis uliginosis, *hinter dem Homberg*; in der *Callenbach*; & alibi frequen. Floret Junio

- T. XIII. f. 1. Radix horizontalis, densa, oblique descendens, squamis vestita ovatis; radicalibus fibris filiformibus, longissimis. Culm 1- f. 2- petalos; erectis, strictis, teretes; glabri, nudi; fardi medulla spongiosa; Vaginis ad basin vestiti striatis, obtusis, apiculis, aristatis; suprema triplo longiore. folia radicalia pauca, culmo similia. Capitalium subrotundum, solitarium, rarius geminum, floribus glomeratis compositis.

2579,

tum; ex fissura culmi, marginibus dilatatis membranaceis, infra apicem rectum erumpens. Pedunculi breves, numerosi, conferti, subdivisi; uti in reliquis, ad basin vaginula vestiti, squamulaque lanceolato-acuminata bracteati. Calycinae squamae duae exiguae. (a) Cor. Petala sex, ovato-acuminata. (c. C.) Stamina in hoc, saepius repetita floris anatomicè, constanter tria, nunquam sex, reperire potui. (C. M.) Capsula longitudine petalorum, trigona, angulis acutis apice prominulis, stylo brevi terminata. (p. P.) Semina obverse conica, acutiuscula, albidula. (f. S.)

262. *IUNCUS, effusus*, culmo nudo stricto: panicula laterali. *Linn. Spec. 464. (Hall. 1311. var. β.)*

H. in fossis passim; in der Altbach; an der Niesbach, bey der untern Walckmühle frequens. Floret Julio.

- T. XIII. f. 2. Radix, Culmi, Folia radicalia. & Pedunculi praecedentis; at majora omnia. Culmus tripedalis, crassior, rastro mollior, facile rumpendus, medulla densa ad lampades aptissima factus. Panicula lateralis, plus minusve sparsa: Pedunculis confertis, inaequalibus, ramosis, sursum deorsumque vergentibus; Bracteis oblongis aristatis. Flores subfusci. Petala aequalia. (A. C.) Capsula obovata, subtrigona, obtusissima, longitudine petalorum. (p. P.) Semina fusca. (f. S.)

263. *IUNCUS, inflexus*, culmo nudo: apice membranaceo incurvo, panicula laterali. *Linn. Spec. 464. (Hall. 1311. α.)*

H. iisdem in locis cum praecedente, et alibi frequens. Floret Julio.

- T. XIII. f. 3. Squamis Culmi basin vestientibus purpureis, nitidis; Culmo filiformi, longiore, tenuiore, firmiore, striato, tenacissimo, minus recto, supra paniculam longius producto, apice emarcido, acutiore, incurvo, maturo fructu, inflexo; Panicula majori; Pedunculis & Pedicellis longioribus, strictioribus, omnibus sursum nec deorsum vergentibus. Floribus ante explicationem exacte subulatis, cum Calycibus & Bracteis spadiceo-purpureis nitidis; Petalis longioribus, subulatis, interioribus tribus reliquis paulo brevioribus; (c) & Capsula Petalis brevior, acutiore, (p. P.) a precedente facile dignosci potest.

264. *IUNCUS, filiformis*, culmo nudo filiformi nutante, panicula laterali. *Linn. Spec. 465. (Hall. 1313.)*

- T. XIII. f. 4. Radix obliqua, teres, squamata; fibris capillaribus. Folia radicalia pauca, filiformia, brevina, erecta. Culmi plures, sesquipediales, infirmi, filiformes, compressi, striati, ad basin squamati; ad paniculam usque erecti, supra paniculam duplo longiores,

arcuatim deorsum flexi, apice acuto emarcido. Panicula simplicissima, pauciflora, ex fissura culmi, infra medium erumpens. Penniculi 5 l. 7, simplices, uniflori, rarius biflori; foliolo lanceolato, aristato, ad basin bracteati. Calycis foliola albida, ovata acuminata, majora quam in precedentibus. (a) Petala subulata pavo viridia: tria interiora paulo breviora. (c) Germen obtusum, purpureum. Capitulas nondum vidi.

b. Culmis foliosis.

265. *JUNCUS, articulatus*, foliis nodoso-articulatis, petalis obtusis. *Linn. Spec. 465.*

α. *aquaticus*. Juncus foliis compressis, articulatis, panicula semel ramosa. *Hall. 1322.*

β. - - - Gramen junceum, folio articulofo, cum utriculis. *Schenckz. Agr. 333.*

γ. *sylvaticus*. Juncus foliis teretibus articulatis, panicula repetito-ramosa. *Hall. 1323.*

H α. in pratis uliginosis passim; β, in pratis humentibus *am steinern Waag* rarius; γ, in pratis sylvaticis udis *am Beilstein*; *im Guldners- & Fischweyer Grund*. Floret Julio & seq.

T. XIII. f. 6. α. Radix horizontalis, lignosa, teres, fibrosa. Folia radicalia ultrapedalia, compresso-teretia, glabra, fistulosa, interne isthmis intercepta, (1) exsiccatione nodoso-articulata. (2) Culmus 2- f. 3- pedalis, erectus, teres, glaber, foliatus; geniculis 4 f. 5, vaginis occultatis, interceptis. Folia culmea bifaria, alterna, patentia, recta, radicalibus sumillima: Vaginis longis, subcompressis, glabris, culmum ultra medium vestibentibus; inferioribus aphyllis, obtusis, aristatis. Panicula terminalis. Pedunculi pauci, alterni, erecti, inaequales, dichotomoramosi; quorum inferior folio florali subulato, erecto, longitudine fere panicula instructus; reliqui squamis lanceolato-acuminatis, bracteati. Flores subcapitati, congesti, exigui, axillares, terminalesque. Calycina duo foliola ovato-acuminata, membranacea. Petala subulata, acuta, subfusca, dein subpurpurea. Capsula trigona, acuminata, purpurascens, petalis longior. (p. p.)

Var β. vivipara: Culmo breviori; Floribus vel omnibus, vel paucis in fasciculos foliorum viridi-purpureos excrecentibus; rarius autumno occurrit, in pratis inundatis.

Var. γ. differt: Foliis teretibus; Culmis altioribus; Panicula ramosiore, supradecomposita; Capitulis multifloris, majoribus.

Flo-

Floribus purpureis, nitidis. Petalis acutissimis, interioribus tribus paulo brevioribus; in reliquis vix differt.

266. LUNCUS, bulbosus, foliis linearibus canaliculatis, capsulis obtusis. Linn. Spec. 466. (Hall. 1318. & forte var. minor. 1320.)

H. in pascuis humentibus. ad vias passim; Var junior bey der obern Walkmühle; major, unter der neuen Brücke. & alibi frequens. Floret Julio.

- T. XIII. f. 7. Radix densa fibrosissima, horizontalis. Culmus spithameus seu pedalis, erectus, subfoliatus, glaber, compressus: uno latere convexo, altero planiore; Geminalis duobus interceptus: quorum inferius (rarius duo,) radici propius, vaginis testum, alterum infra paniculam nudum. Folia bifaria, linearia, canaliculata, glabra, subtus striata, subvaginantia, culmo breviora: Vaginis ad culmi basin congestis, compressis, carinatis, membrana tenuissima, albida, apice prominula, utrinque auctis.

Folia floralia duo culmeis simillima, erecta: quorum inferius longitudine Corymbi, superius brevius. Panicula erecta, inaequalis, maturo fructu corymbosa. Pedunculi 3, f. 4, subdivisi; primario semper reliquis longiore: Bracteis lanceolato-setaceis. Flores solitarii, exigui, colorati; terminales saepius terni: in medio axillari, sessili. Calycinae squamæ ovata, albida. (A.) Cor. Petala oblonga, obtusissima, sub florescentia erectiuscula; interiora tria tenuiora, purpurascens. (c. C.) Stigmata supra Corollam longe prominentia. (O) Capsulae subglobosae, fere ovales, fuscae, nitidae, petalis longiores, stylo vix manifesto terminata. (p. P.) Semina fulva, pellucida. (f. S.)

267. LUNCUS, bufonius, culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus solitariis sessilibus. Linn. Spec. 466. (Hall. 1319.)

β. Gramen nemorosum calyculis palcaceis, species altera procerior. Schenchz. Agr. 328.

H. α. locis inundatis, ad vias ubi aquae pluviales stagnarunt, cum praecedente bey der Walkmühle copiosissime; β. in sylvaticis udis im Stübers - & Fischvveyher - Grund frequens. Floret Junio & seq.

- T. XIII. f. 8. α. Radix annua, fibrosa, Culmi spithamæ f. dodrantes, erecti, teretiusculi, glabri, dichotomi. Folia culmea pauca, subvaginantia, linearia, carinata. Bractea lanceolato-setacea, inferiores foliiformes. Flores solitarii, sessiles; unico semper in omnibus culmi divisionibus axillari, reliquis

ANETHUM. G. P. 364.

Fructus subovatus, compressus, striatus.

Petala involuta, integra. S. N. 216.

219. ANETHUM, *graveolens*, fructibus compressis.
Linn. Spec. 377.

H. in cultis, inter olera frequens. Floret Julio.

Pharm. ANETHI Herba, Semina.

220. ANETHUM, *Feniculum*, fructibus ovatis. Linn.
Spec. 377. (*Feniculum*. Hall. 760.)

H. in cultis oleraceis bey dem dicken Thurm; vor dem Sand - Thor parcius. Floret Julio.

Pharm. FOENICULI Radix, Herba, Semina.

ÆGOPODIUM. G. P. 368.

Fructus ovato-oblongus, striatus. S. N.
217.

221. ÆGOPODIUM, *Podagraria*, foliis caulinis summis ternatis. Linn. Spec. 379. (*Podagraria*. Hall. 759.)

H. ad sepes passim. Floret Julio.

APIUM. G. P. 367.

Fructus ovatus, striatus. *Involucr.* t - phyl-
lum. *Petala* æqualia. S. N. 217.

222. APIUM, *Petroselinum*, foliis caulinis linearibus, involucellis minutis. Linn. Spec. 379.

H. in cultis am Sieghaus; auf dem Hintersand; ali-
que infrequens. Floret Julio.

Pharm. PETROSELINI Radix, Herba, Semina.

223. APIUM, *graveolens*, foliis caulinis cuneiformi-
bus. Linn. Spec. 379. (Hall. 784.)

H. in fossis, an der Mühlbach, unter der Walck-
mühle rarius. Floret Julio.

Pharm. APII Radix, Semina.

PIMPINELLA. G. P. 366.

Fructus ovato-oblongus. *Petala* inflexa. *Stig-
mata* subglobosa. S. N. 217.

224. PIMPINELLA, *saxifraga*, foliis pinnatis, folio-
lis radicalibus subrotundis; summis linearibus.
Linn. Spec. 378.

minor,

minor, α. *Pimpinella saxifraga minor*. *Bauh. Pin.* 160. (*Tragofelinum* Hall. 786.)

major, β. *Pimpinella saxifraga major*, umbella candida. *Bauh. Pin.* 159. (*Hall.* 785.)

H. α. in pratis & pascuis siccis auf der Sandvviese; β. Foliis triplo majoribus, in pratis bey Sinn copiose. Floret Julio.

Pharm. PIMPINELLÆ ALBÆ Radix.

225. PIMPINELLA, *bircina*, foliis duplicato-pinnatis, pinnulis profundissime lobatis. (*Tragofelinum*. Hall. 787.)

Pimpinella saxifraga, *bircina* var. ε. *Linn. Spec.* 378.

H. in collibus siccis passim. Floret Junio & seq.

C. TRIGYNIA.

* Flores superi.

VIBURNUM. G. P. 370.

Cal. 5-partitus, superus. *Cor.* 5-fida. *Bacca* 1-sperma. S. N. 218.

226. VIBURNUM, *Lantana*, foliis cordatis ferratis venosis subtus tomentosis. *Linn. Spec.* 384 (*Hall.* 669.)

H. in dumetis & ad sepes am Gälgenberg, versus Burgk frequens. Floret Junio.

227. VIBURNUM, *Opulus*, foliis lobatis, petiolis glandulosis. *Linn. Spec.* 384. (*Opulus*. Hall. 668.)

H. ad sepes & ripas Dilla, auf der Weissgärber Wiese; & alibi vulgaris. Floret Junio.

SAMBUCUS. G. P. 372.

Cal. 5-partitus. *Cor.* 5-fida. *Bacca* 3-sperma. S. N. 219.

228. SAMBUCUS, *Ebulus*, cymis tripartitis, stipulis foliaceis, caule herbaceo. *Linn. S. N.* 219. *Spec.* 385. (*Hall.* 671.)

H. in

H. in nemorosis ad pagum *Erbach* & *Sinn.* Floret Junio.

Pharm. ERULI Radix, Baccæ, Semina.

Corolla subpurpurea: Lacinie concave, ovate, acutæ, apicibus incurvis; Antheræ oblongæ. Semina receptaculo columnari affixa.

229. SAMBUCUS, nigra, cymis quinquepartitis, caule arboreo. *Linn. Spec.* 385. (*Hall.* 670.)

H. ad sepes passim. Floret Junio.

Pharm. SAMBUCE Flores, Baccæ.

Corolla alba: Lacinie convexæ, obtusissimæ.

230. SAMBUCUS, racemosa, racemis compositis ovatis, caule arboreo. *Linn. Spec.* 386. (*Hall.* 672.)

H. in nemorosis bey denen Steinkammern circa *Erbach* frequens. Floret Martio, Aprili.

Corolla exigua, viridis: Lacinie concava. Baccæ rubra.

** Flores inferi.

STAPHYLEA. G. P. 374.

Cal. 5-partitus. Petala 5. Caps. inflatæ, connatæ. Sem. 2, globosa cum cicatrice. S. N. 219.

231. STAPHYLEA, pinnata, foliis pinnatis. *Linn. Spec.* 386. (*Hall.* 831.)

H. in sylvaticis montosis auf der Schindgrube; ad sepes am *Homberg* rarius. Floret Majo, Junio. Styli duo, sepia tres. Capsula trilocularis. Semina constanter duo in majoribus loculamentis, tertio abortiente.

ALSINE. G. P. 380.

Cal. 5-phyllus. Petala 5, æqualia. Caps. 1-locularis, 3-valvis. S. N. 221.

232. ALSINE, media, petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. *Linn. Spec.* 389. (*Hall.* 88c.)

H. in cultis & agris copiosissime. Floret tota fere æstate.

D. TETRAGYNIA.

PARNASSIA. G. P. 384.

Cal. 5-partitus. Petala 5. Nectaria 5, cordata,

data, ciliata apicibus globosis. *Capsf.* 4. valvis. S. N. 221.

233. PARNASSIA, *palustris*. Linn. Spec. 391. (Hall. 832.)

H. in pratis humidis, ad pagos *Enderoth*, *Emmerichenhayn*, & *Erbach* frequens. Floret Augusto.

E. P E N T A G Y N I A.

LINUM. G. P. 389.

Cal. 5. phyllus. *Petala* 5. *Capsf.* 5. valvis, 10. locularis. *Sem.* solitaria. S. N. 223.

234. LINUM, *usitatissimum*, calycibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subfolitario. Linn. Spec. 397. Hall. 836.)

H. in arvis auf dem Schießplatz; am *Hornberg*; *Dollberg*; infrequens. Floret Julio.

Pharm. LINI Semina.

235. LINUM, *catharticum*, foliis oppositis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. Linn. Spec. 401. (Hall. 839.)

H. in pratis siccis passim. Floret Junio, Julio.

Pharm. LINI CATHARTICI Herba

Filamenta basi connata, germen vestientia; interjectis denticulis alternis, exiguis, acutis. (Geranii.)

236. LINUM, *Radiola*, foliis oppositis, caule dichotomo, floribus tetrandris tetragynis. Linn. Spec. 402. (Hall. 840.)

H. in arenosis humidis, circa *Langenaubach*; ipse nondum legi. Floret aestate ☙.

DROSERA. G. P. 391.

Cal. 5. fidus. *Petala* 5. *Capsf.* 1. locularis: apice 5. valvis. *Sem.* plurima. S. N. 225.

237. DROSERA, *rotundifolia*, scapis radicatis, foliis orbiculatis. Linn. Spec. 402. (Rorella. Hall. 834.)

H. in pratis udis, circa *Mademüblen*; *Hohenroth*. Floret Julio.

Pharm. RORELLAE f. RORIS SOLIS Herba.

238. DROSERA, *longifolia*, scapis radicatis, foliis oblongis. *Linn. Spec. 403. (Rorella. Hall. 833.)*
H. cum precedente rarius, cujus forte varietas est. Floret Julio.

F. P O L Y G Y N I A.

MYOSURUS. G. P. 394.

Cal. 5 - phyllus, basi adnatus. *Nectaria 5*,
subulata, petaliformia. *Sem. numerosa.*
S. N. 227.

239. MYOSURUS, *minimus*. *Linn. Spec. 407. (Hall. 1159.)*

H. in agris arenosis *am Dollberg*; in cultis *in der untern Pitze* frequens. Floret Majo.

CLASSIS VI.

H E X A N D R I A.

A. M O N O G Y N I A.

• *Flores calyculati, calyce corollaque
instructi.*

BERBERIS. G. P. 442.

Cal. 6 - phyllus. Petala 6: ad ungues glandulis 2. Stylus 0. Bacca 2 - sperma. S. N. 252.

240. BERBERIS, *vulgaris*, pedunculis racemosis. *Linn. Spec. 471. (Hall. 828.)*

H. ad sepes *hinter dem Schloß* rarius; ad pagos *Flühbach & Greiffenstein* frequens. Floret Junio.

Pharm. BERBERIDIS Fructus.

** *Flores spathacei f. glumacei.*

LEUCOJUM. G. P. 402.

Cor. campaniformis, 6 - partita, apicibus incrassata. Stigma simplex. S. N. 234.

241. LEUCOJUM, *vernum*, spatha uniflora, stylo clavato. *Linn. Spec. 414. (Galanthus. Hall. 1253.)*

H. in pratis *an der Dille*, *unter dem Sieghaus*; in nemorosis *ad Erbach*; *im Thiergarten* copiose. Floret Martio.

NARCIS-

NARCISSUS. G. P. 403.

Petala 6: Nectario infundibuliformi, 1-phyllo. Stam. intra nectarium. S. N. 234.

242. NARCISSUS, *poëticus*, spatha uniflora, nectario rotato brevissimo scariofo crenulato. *Linn. Spec. 414. (Hall. 1250.)*

H. in pomariis & pratis *am Siezhanse* rarius. Floret Majo.

243. NARCISSUS, *Pseudo-Narcissus*, spatha uniflora, nectario campanulato erecto crispo æquantem petala ovata. *Linn. Spec. 414. (Hall. 1252.)*

H. in pomariis & pratis *am Siezhanse* copiose. Floret Martio.

ALLIUM. G. P. 409.

Cor. 6 partita, patens. Spatha multiflora. Umbella congesta. Caps. supera. S. N. 237.

244. ALLIUM, *carinatum*, caule planitolio bulbifero, staminibus subulatis. *Linn. Spec. 426. (Hall. 1224.)*

H. in sylvaticis montosis *am geistlichen Berg* Floret Julio.

245. ALLIUM, *vincale*, caule teretifolio bulbifero, staminibus tricuspидatis. *Linn. Spec. 425. (Hall. 1221.)*

H. in sylvaticis montosis *bey dem Fühlenhause*. Floret Julio.

246. ALLIUM, *oleraceum*, caule teretifolio bulbifero, foliis scabris semiteretibus subtus sulcatis, staminibus simplicibus. *Linn. Spec. 429. (Hall. 1223.)*

H. in pomariis & pratis siccis passim. Floret Julio.

... Flores nulli

CONVALLARIA. G. P. 425.

Cor. 6-fida. Bacca maculosa. 3-locularis. S. N. 246.

247. CONVALLARIA, *majalis*, scapo nudo. *Linn. Spec. 451 (Polygonatum. Hall. 1241.)*

H. in montosis *am der Steinseite; in der Callenbach; in pratis sylvaticis bey Langenbach; alibique frequens. Floret Majo. Pharm. LILII CONVALLII Flores.*

248. CONVALLARIA, *verticillata*, foliis verticillatis. *Linn. Spec. 451. (Hall. 1244.)*

H. in sylvaticis montosis *im Hirschberg, auf dem Westervald*
circa *Willingen*. Floret Junio.

249. CONVALLARIA, *Polygonatum*, foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunifloris. *Linn. Spec. 451. (Hall. 1242.)*

H. in sylvis; *im Hirschberg* frequens. Floret Majo.

Pharm. SIGILLI SALOMONIS Radix.

250. CONVALLARIA, *multiflora*, foliis alternis amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis axillaribus multifloris. *Linn. Spec. 452. (Hall. 1243.)*

H. in sylvis, *in der Förre; im Hirschberg & Thiergarten* frequens; in dumetis *am Homberg* parcius. Floret Majo.

251. CONVALLARIA, *bifolia*, foliis cordatis, floribus retrandris. *Linn. S. N. 247. Spec. 452. (Unifolium. Hall. 1240.)*

H. in pratis sylvaticis asperis, *im Hirschberg; in der Hörre*; vulgaris. Floret Majo, Junio.

Pedicelli *gemini*. Corolla 4-partita. Stamina quatuor. Stigma *bifidum*. Bacca *bilocularis*; *disperma*.

• ANTHERICUM. G. P. 422.

Cor. 6-petala, patens. Caps. ovata. S. N. 244.

252. ANTHERICUM, *Liliago*, foliis planis, scapo simplicissimo, corollis planis, pistillo declinato. *Linn. Spec. 445. (Pbalangium. Hall. 1207.)*

H. in montosis sylvaticis *im Beilstein* frequens. Floret Junio.

ORNITHOGALUM. G. P. 418.

Cor. 6-petala, erecta, persistens, supra medium patens. Filamenta alterna basi dilatata. S. N. 242.

253. ORNITHOGALUM, *luteum*, scapo anguloso diphylo, pedunculis umbellatis simplicibus. *Linn. Spec. 439. (Pbalangium. Hall. 1213.)*

H. in pratis & pomariis *unter der neuen Brücke*, alibique copiose. Floret Martio, Aprili.

254. ORNITHOGALUM, *minimum*, scapo angulato diphylo, pedunculis umbellatis ramosis. *Linn. Spec. 440. (Hall. 1214.)*

H. in agris *in der Aue; am Dollberg* parcius. Floret Aprili.
Scapo

Scapo subtereti, Umbella brevior, Involucris Foliis pluribus, longioribus; Pedunculis teretibus, subramosis, pubescentibus; Corollae petalis 6-8-9, aurea flavedine nitentibus, patentissimis, acutioribus; tribus exterioribus obtusioribus, siccus pubescentibus; Pistillo subvillosa, plerumque abortiente; Bulbalis congestis, axillaribus, bracteatis, quibus planta propagatur, a precedente distinguitur.

255. ORNITHOGALUM, pyrenaicum, racemo longissimo, filamentis lanceolatis, pedunculis floriferis patentibus aequalibus: fructiferis scapo approximatis. *Linn. Spec. 440. (Hall. 1210.)*

H. in pomariis am Sieghaus rarius; dubia civis ex hortis auctuga. Floret Majo.

SCILLA, G. P. 419.

Cor. 6-petala, patens, decidua, Filamenta filiformia. S. N. 243.

256. SCILLA, amoena, floribus lateralibus alternis subnutantibus, scapo angulato. *Linn. S. N. 243. Spec. 443. (Phalangium. Hall. 1211 ?)*

H. in pomariis am Sieghause rarius; planta exoticæ originis. Floret Majo.

ASPARAGUS, G. P. 424.

Cor. 6-partita, erecta: petalis tribus interioribus apice reflexis. Bacca 3-locularis: 2-sperma. S. N. 245.

257. ASPARAGUS, officinalis, caule herbaceo tereti erecto, foliis fetaceis, stipulis paribus. *Linn. S. N. 245. Spec. 448. (Hall. 1239.)*

H. in pomariis am Sieghause; ad muros pontis novi; alibi que rarius. Floret Junio, Julio.

Pharm. ASPARAGI Radix, Semina.

Nostra Planta culta & spontanea, semper est dioica. Maris Corolla duplo major; Stamina perfecta; Pistillum imperfectum, exiguum, abortiens. Feminae Corolla apicibus omnibus erectis: Stamina castrata s. Antheris destituta. Pistillum longitudine tubi corollae; Stigma crassiusculum, trifidum. Bacca hexasperma.

LILIUM, G. P. 410.

Cor. 6-petala, campanulata: linea longitu-

- diſtali neſtarifera. *Capſ.* valvulis pilo cancellato connexis. S. N. 240.

258. LILIUM, *Martagon*, foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Linn. Spec.* 435. (*Hall.* 12, 3.)

H. in pomariis *am Sieghauſe* rarius. Floret Junio.

TULIPA. G. P. 415.

- Cor. 6-petala, campanulata. *Stylus* o. S. N. 241.

259. TULIPA, *ſylveſtris*, flore ſubnutante, foliis lanceolatis. *Linn. Spec.* 438 (*Hall.* 1-36.)

H. in pratis & pomariis *unter der neuen Brücke*; alibique copioſiſſime. Floret Majo.

Petala omnia apice, *tria interiora etiam* baſi villoſa.

.... *ſ. flores incompleti.*

ACORUS. G. P. 434.

- T. XII. f. 12. *Spadix* cylindricus, rectus ſoſculis. Cor. 6-petala, (c. C. M.) nuda. *Stylus* o. *Capſ.* (p). 3-locularis. (r). S. N. 249.

260. ACORUS, *Calamus*. *Linn. Spec.* 462. (*Hall.* 1307.)

H. in ſollis *bey der obern Papiermühle*; *am ſteinern Waag* rarius. Floret Junio.

Pharm. CALAMI AROMATICI Radix.

IUNCUS. G. P. 437.

- Cul 6-phyllus. Cor. c. *Capſ.* 1-locularis. S. N. 250.

• *Culmi nudis. Capſulis polyspermis.*

261. IUNCUS, *conglomeratus*, culmo nudo ſtriſto, capitulo laterali. *Linn. Spec.* 464. (*Hall.* 1312.)

H. in pratis uliginolis, *hinter dem Homberg*; *in der Callenbach*; & alibi frequen. Floret Junio

- T. XIII. f. 1. Radix horizontalis, denſa, oblique deſcendens, ſquamis veſita ovatis; radicalibus ſibris filiformibus, longiſſimis. Culm 1- ſ. 2- petales, erecti, ſtriſti, teretes; glabri, nudi; ſarſti medulla ſpongioſa; Vaginis ad baſin veſiti ſtriſtis, obtuſis, aphyllis, arſtatis; ſuprema triplo longiore. Folia radicalia pauca, culmo ſimillima. Capitulum ſubrotundum. ſolitarium, rarius geminum, floribus glomeratis compoſitum,

zum; ex fissura culmi, marginibus dilatatis membranaceis, infra apicem rectum erumpens. Pedunculi breves, numerosi, conferti, subdivisi; uti in reliquis, ad basin vaginula vestiti, squamulaque lanceolato-acuminata bracteati. Calycinae squamæ duæ exigua. (a) Cor. Petala sex, ovato-acuminata. (c. C.) Stamina in hoc, sæpius repetita floris anatomè, constanter tria, nunquam sex, reperire potui. (C. M.) Capsula longitudine petalorum, trigona, angulis acutis apice prominulis, stylo brevi terminata. (p. P.) Semina obverse conica, acutiuscula, albida. (f. S.)

262. LUNCUS, effusus, culmo nudo stricto: panicula laterali. *Linn. Spec. 464. (Hall. 1311. var. B.)*

H. in fossis passim; in der Altbach; an der Mühlbach, bey der untern Walckmühle frequens. Floret Julio.

T. XIII. f. 2. Radix, Culmi, Folia radicalia. & Pedunculi præcedentis; at majora omnia. Culmus tripedalis, crassior, sæpius mollior, facile rumpendus, medulla densa ad lampades aptissima factus. Panicula lateralis, plus minusve sparsa: Pedunculis confertis, inæqualibus, ramosis, sursum deorsumque vergentibus; Bracteis oblongis aristatis. Flores subfusi. Petala equalia. (A. C.) Capsula obovata, subtrigona, obtusissima, longitudine petalorum. (p. P.) Semina fulva. (f. S.)

263. LUNCUS, inflexus, culmo nudo: apice membranaceo incurvo, panicula laterali. *Linn. Spec. 464. (Hall. 1311. α.)*

H. iisdem in locis cum præcedente, et alibi frequens. Floret Julio.

T. XIII. f. 3. Squamis Culmi basin vestientibus purpureis, nitidis; Culmo filiformi, longiore, tenuiore, firmiore, striato, tenacissimo, minus recto, supra paniculam longius producto, apice emarcido, acutiore, incurvo, maturo fructu, inflexo; Panicula majori; Pedunculis & Pedicellis longioribus, strictioribus, omnibus sursum nec deorsum vergentibus. Floribus ante explanationem exacte subulatis, cum Calycibus & Bracteis spadiceo-purpureis nitidis; Petalis longioribus, subulatis, interioribus tribus reliquis paulo brevioribus; (c) & Capsula Petalis brevior, acutior, (p. P.) a præcedente facile dignosci potest.

264. LUNCUS, filiformis, culmo nudo filiformi nuntante, panicula laterali. *Linn. Spec. 465. (Hall. 1313.)*

T. XIII. f. 4. Radix obliqua, teres, squamata; fibris capillaribus. Folia radicalia pauca, filiformia, brevia, erecta. Culmi plures, sesquipediales, infirmi, filiformes, compressi, striati, ad basin squamati; ad paniculam usque erecti, supra paniculam duplo longiores,

arcuatim deorsum flexi, apice acuto emarcido. Panicula simplicissima, pauciflora, ex fissura culmi, infra medium erumpens. Pedunculi 5 l. 7, simplices, uniflori, rarius biflori; foliolo lanceolato, aristato, ad basin bracteati. Calycis foliola alba, ovata acuminata, majora quam in precedentibus. (a) Petala subulata j.ovo viridia: tria interiora paulo breviora. (c) Germen obtusum, purpureum. Capsulas nondum vidi.

b. *Culmis foliosis.*

265. *JUNCUS, articulatus, foliis nodoso-articulatis, petalis obtusis. Linn. Spec. 465.*

α. *aquaticus. Juncus foliis compressis, articulatis, panicula temel ramosa. Hall. 1322.*

β. - - - Gramen junceum, folio articulofo, cum utriculis. *Scheuchz. Agr. 333.*

γ. *sylvaticus. Juncus foliis teretibus articulatis, panicula repetito-ramosa. Hall. 1323.*

H α. in pratis uliginosis passim; β, in pratis humen-
tibus *am steinern Waag* rarius; γ, in pratis sylvati-
cis udis *am Beilstein*; *im Guldners- & Fischwey-
her Grund.* Floret Julio & seq.

T. XIII. f. 6. α. *Radix horizontalis, lignosa, teres, fibrosa. Folia radicalia ultrapedalia, compresso-teretia, glabra, fistulosa, interne isthmis intercepta, (1) exsiccatione nodoso-articulata. (2) Culmus 2- f. 3- pedalis, erectus, teres, glaber, foliatus; geniculis 4 f. 5, vaginis occultatis, interceptis. Folia culmea bisaria, alterna, patentia, recta, radicalibus simillima: Vagi-
nis longis, subcompressis, glabris, culmum ultra medium vesti-
entibus; inferioribus aphyllis, obtusis, aristatis. Panicula terminalis. Pedunculi pauci, alterni, erecti, inaequales, dichotomo-
ramosi; quorum inferior folio florali subulato, erecto, longitudine
ferè panicula instructus; reliqui squamis lanceolato-acuminatis,
bracteati. Flores subcapitati, congesti, exigui, axillares, ter-
minalesque. Calycina duo foliola ovato-acuminata, mem-
branacea. Petala subulata, acuta subfusca, dein subpur-
purea. Capsula trigona, acuminata, purpurascens, petalis
longior. (p. p.)*

Var β. *vivipara: Culmo breviori; Floribus vel omnibus, vel
paucis in fasciculos foliorum viridi-purpureos excrecentibus;
rarius autumno occurrit, in pratis inundatis.*

Var. γ. *differt: Foliis teretibus; Culmis altioribus; Panicula
ramosiore, supradecomposita; Capitulis multifloris, majoribus.*
Flo-

Floribus purpureis, nitidis. Petalis acutissimis, interioribus tribus paulo brevioribus; in reliquis vix differt.

266. IUNCUS, bulbosus, foliis linearibus canaliculatis, capsulis obtusis. Linn. Spec. 466. (Hall. 1318. & forte var. minor. 1320.)

H. in pascuis humentibus, ad vias passim; Var junior bey der obern Walkmühle; major, unter der neuen Brücke, & alibi frequens. Floret Julio.

- T. XIII. f. 7. Radix densa fibrosissima, horizontalis. Culmus spithameus seu pedalis, erectus, subfoliatus, glaber, compressus: uno latere convexo, altero planiore; Geniculis duobus interceptus: quorum inferius (rarius duo,) radici propius, vaginis testum, alterum infra paniculam nudum. Folia bifaria, linearia, canaliculata, glabra, subtus striata, subvaginantia, culmo breviora: Vaginis ad culmi basin congestis, compressis, carinatis, membrana tenuissima, albida, apice prominula, utrinque auctis.

Folia floralia duo culmeis simillima, erecta: quorum inferius longitudine Corymbi, superius brevius. Panicula erecta, inaequalis, maturo fructu corymbosa. Pedunculi 3, f. 4, subdivisi; primario semper reliquis longiore: Bracteis lanceolato-setaceis. Flores solitarii, exigui, colorati; terminales saporis terni: in medio axillari, sessili. Calycinae squamæ ovata, albida. (A.) Cor. Petala oblonga, obtusissima, sub florescentia erectiuscula; interiora tria tenuiora, purpurascens. (c. C.) Stigmata supra Corollam longe prominentia. (O) Capsulae subglobosae, fere ovales, fuscae, nitidae, petalis longiores, stylo vix manifesto terminata. (p. P.) Semina fulva, pellucida. (f. S.)

267. IUNCUS, bufonius, culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus solitariis sessilibus. Linn. Spec. 466. (Hall. 1319.)

β. Gramen nemorosum calyculis palcaceis, species altera procerior. Scheuchz. Agr. 328.

H. α. locis inundatis, ad vias ubi aquæ pluviales stagnarunt, cum præcedente bey der Walkmühle copiosissime; β. in sylvaticis udis im Stübers - & Fischvveyher - Grund frequens. Floret Junio & seq.

- T. XIII. f. 8. α. Radix annua, fibrosa, Culmi spithamai f. dodrantales, erecti, teretiusculi, glabri, dichotomi. Folia culmea pauca, subvaginantia, linearia, carinata. Bractea lanceolato-setacea, inferiores foliiformes. Flores solitarii, sessiles; unico semper in omnibus culmi divisionibus axillari, reliquis

versus ramorum apicem dispositis, unilateralibus, remotis. Calycinae squamæ ovato-acuminata, albida. (a.) Petala lanceolata-jubulata, (c.) acutissima; (2) tria interiora breviora. (1. c.) Capsula oblonga, subtrigona, obtusissima, fusca, mutua, petalis brevior, (c. p.) trivalvis. (q.) Receptaculum jubulatum, tripartibile: singula lacinia (y) Semina utrinque aequantur numerosa, fusca. (f. S.)

Var. β . differt: Culmo bipedali, erectiusculo, subdiffuso, infirmiore, ad dichotomiam magis nodoso; Foliis numerosioribus, majoribus; Floribus saepe in fasciculos foliorum excrecentibus; Petalis longioribus, aristatis.

c. Capsulis trispermis.

269. IUNCUS, pilosus, foliis planis pilosis, corymbo ramoso Linn. Spec. 468. Var. β . (Hall. 1325. & forte 1324.?)

H. in sylvis frequens; am Homberg, Geistlichenberg, alibique paucius. Floret Majo, Junio.

T. XII. f. 10. Radix dena, fibrosa. Culmi pedales, erecti, teretes, subtrinodes, foliati. Folia vaginantia, lineari-lanceolata, nervosa, lata, plana: duo floralia inaequalia, erecta, corymbo breviora; omnia marginibus, & imprimis Ligulae loco, valde pilosa, apice callosa. Corymbus umbelliformis: Pedunculis 7-9, f. 11, simplicibus, uni- seu bistoris, rarius bifidis, trifloris, basi vaginatis, bracteatisque; primariis erectis, secundariis reflexis. Flores solitarii. Calycinae squamæ duae ovatae, obtusissima. (a.) Cor. Petala ovato-acuminata, aequalia, sp. alba-purpurea, margine albido, dein flavescente, (c.) Capsula subglobosa, stylo terminata, (p.) unilocularis, trivalvis. (r.) semina tria. (f.)

269 IUNCUS, nivicus, foliis planis subpilosis, corymbis folio brevioribus, floribus fasciculatis. Linn. Spec. 468. (Hall. 1328.)

H. in sylvaticis montosis asperis im Beilstein; am Homberg; am Callenbachsberg, & alibi copiose. Floret Janio.

T. XIII. f. 9. Radix lignosa, teres, obliqua, fibris cirrhosis, fuscis. Folia radicalia numerosa, emarcescentia, culmo breviora. Culmus 1- f. 2- pedalis, erectus, teres, striatus, foliatus, 4. f. 5- nodis. Folia culinea vaginantia, latiuscula, nervosa, longissime acuminata, marginibus & imprimis Ligulae loco, valde pilosa. Folia duo floralia, minus pilosa, angustiora, corymbos arcuatim superantia, saepe tantum adaequantia. Pedunculi numerosi, alterni, longi, inaequales, apice in Pedicellum fere capilla-

capillares divisi, & subdivisi. Corymbi subconvexi, erecti, demum nutantes. Flores fasciculati, solitarii & conferti, albidii, pulchre purpureo-maculati, nitidi. Calycis Foliola duo ovata, acuta, subciliata. Corolla calyce triplo major: Petala exteriora tria breviora, ovato-acuta; tria interiora $\frac{1}{2}$ longiora, latiora, tenuioraque, lanceolata. (c. C.) Capsula ovato-globosa, acutiuscula, trisperma. (p. q. S.).

270. *JUNCUS, campestris*, foliis planis subpilosis, spicis sessilibus pedunculatisque. *Linn. Spec.* 468. (*Hall.* 1330.)

β . *Juncoides montanum nemorosum villosum latifolium elatius, capitulis florum candidis & splendentibus.* *Mich. Gen.* 42?

H. α . in pascuis siccis ubique vulgaris. Floret Martio, Aprili. β . in montosis sylvaticis *hinter dem Homburg*. Floret Majo.

- T. XIII. f. 5. Radix lignosa, nodosa, fibrosa, vaginis emarcidis vestita, oblique descendens. Folia radicalia lata, plana, unaque pilosa, apice callosa. Culmus spithameus s. dodranalis, erectus, teres, striatus, subtrinois, foliatus. Vagina striata, nuda. Folia culmea radicalibus breviora, consimilia, marginibus imprimis Ligulae loco, valde pilosa. Folia duo floralia alterna, pilosa, pedunculis breviora. Spicae 3. 4. f. 5, ovata atro-spadicea, nitida; pauciores subsessiles, plures pedunculatae, erectae, demum pendulae, subsecunda. Bractea ovata, acuminata, membranacea, albida. Flores in singula Spica 9-11-13, conferti. Calycinae squamae duae ovatae, albidae. Petala subaequalia, lanceolato-acuminata, atro-spadicea, margine flavescente. (c.) Capsula trisperma. (p. q.)

Var. β . Folia angustiora, longiora, minus pilosa. Culmus ultrapetalis. Pedunculi 7-9, longiores. Spicae oblongiores, tenuiores, albido-ferrugineae, omnes pedunculatae. Flores triplo minores, distinctiores, minus conferti. Petala acuminatissima. In reliquis convenit.

B. T R I G Y N I A.

COLCHICUM. G.P. 457.

Spatha. Cor. 6-partita: tubo radicato. *Capsulae* tres, connexae, inflatae. S.N. 256.

271. *COLCHICUM, autumnale*, foliis planis lanceolatis erectis. *Linn. Spec.* 485. (*Hall.* 1255.)

H. in

H. in pratis humidiusculis passim. Floret Augusto & sequ.

Pharm. COLCHICI Radix.

Tubus longissimus, trigonus, ex basi bulbi ortus; inferne vestitus: squamis vaginantibus, rudimenta trium foliorum futuri anni includentibus. Germen extra radicem (nec intra) columna tereti affixum. Styli tenerrimi, flexuosi. Stigmata incurva.

TRIGLOCHIN. G. P. 453.

Cal. 3-phyllus. Petala 3, calyciformia. Stylus o. Caps. basi dehiscens. S. N. 256.

272. TRIGLOCHIN, *palustre*, capsulis trilocularibus sublinearibus. Linn. Spec. 482. (Hall. 1308.)

H. in pratis diutius inundatis am steinern Waag abunde. Floret Junio, Julio.

T. XII. f. 5. Radix biennis, bulbosa, vaginis emarctidis tunicata: basi emittens fibras filiformes, simplices, flavescentes. Folia culmi basin vestientia, linearia, carinato-canaliculata, levia, culmo breviora. Vaginæ subcompressa, membrana tenuissima, albida, apice prominula, utrinque aucta. Culmus dehinc nudus, dodrantalis, demum ultrapedalis, erectus, strictus, subtrigonus, levis. Racemus terminalis, subspicatus. Flores exigui, erecti, alterni, brevissime, demum longius pedunculati. Bractææ nullæ. Calycis tria Foliola ovata, obtusa: nervo medio crassiore, viridi, supra medium deliquescente; marginibus albidis. Corollæ petala tria cum calyce alternantia, consimilia, paulo minora, tenuiora, albida, subpurpurea: (c. C.) Singulo Foliolo Calycino, & singulo petalo, Stamen unicum, Filamento brevissimo affixum. (M. c.) Germen obovatum, supra corollam prominens. Stigmata tria, acuta, persistentia; sub florescentia ob plumulas numerosas, reflexas, vix distinguenda. (O) Capsula obverse conica, (p.) trigona, apice tribus denticulis, (antea stigmatibus) coronata; (p) basi angustata: tribus valvulis dehiscens subulatis; Receptaculo lineari-trigono.

trigono. (V) Singula valvula latere interiore longitudinaliter dehiscit, (p. f) Semen demittens acuminatum. (S.)

Gramine hoc pecora præ aliis delectantur.

RUMEX. G.P. 451.

Calyx 3-phyllus. Petala 3, conniventia. Semen unicum, triquetrum. S. N. 254.

a. Hermaphroditi : valvulis granulo notatis.

273. RUMEX *Patientia*, floribus hermaphroditis : valvulis integerrimis : unica granifera, foliis cordatis, *Linn. Spec. 476.*

H. spontanea quasi in cultis am Dollberg ; am heiligen Floss ; in pratis am Sieghaus infrequens. Floret Julio.

Pharm. PATIENTIÆ Herba.

274. RUMEX, *sanguineus*, floribus hermaphroditis : valvulis integerrimis : unica granifera, foliis cordato-lanceolatis, *Linn. Spec. 476.*

H. iisdem in locis cum præcedente rarius, Floret Julio.

Pharm. LAPATHI SANGVINEI Radix, Semina.

275. RUMEX, *conglomeratus*. *Murray. Prodr. Stirp. Gatt. 52.*

Lapathum petiolis latefcentibus, foliis longe lanceolatis, floribus verticillatis verrucosis. Hall. 1590.

H. in fossis bey der Walckmühle ; in der Alzbach ; alibique copiose. Floret Julio.

Caulis 1 f. 2-pedalis, erectus, sulcatus. Rami distantes, erecto-patentes, subdiffusi. Folia ovato-lanceolata, planiuscula. Verticilli numerosi, remoti : floribus exiguis, copiosissimis, glomeratis, reflexis. Pedicelli breves ; infra articulationem crassiores, purpurei. Valvulae oblonga, integerrima, omnes granifera : granulo purpureo s. fulvo instructa.

276. RUMEX, *crispus*, floribus hermaphroditis : valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis, *Linn. Spec. 476. (Hall. 1589.)*

H. in

H. in agris, *ad vias*, ubique pervulgaris. Floret Junio & sequ.

277. RUMEX, *acutus*, floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis. *Linn. Spec.* 478. (*Hall.* 1591.)

H. in fossis, *ad ripas Dillæ am steinern Waag* rarius. Floret Julio.

Pharm. LAPATHI ACUTI Radix.

278. RUMEX, *obtusifolius*, floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis obtusiusculis crenulatis. *Linn. Spec.* 478. (*Hall.* 1592.)

H. ad fossas, secus vias ubique vulgaris. Floret Julio, Augusto.

Valvulæ corollæ integerrimæ, Anthesi peracta tantum dentatæ, triplo majores.

b. *Hermaphroditi*: valvulis granulo destitutis s. nudis.

279. RUMEX, *aquaticus*, floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis glabris acutis. *Linn. S. N.* 255. *Spec.* 479. (*Hall.* 1588.)

H. ad ripas *Dillæ am steinern Waag* rarius. Floret Junio, Julio. †

RUMEX, *scutatus*. *Linn. Spec.* 480. (*Hall.* 1594.)

Planta gallo-provincialis, quæ alias in hortis hospitatur, sponte quasi valde luxuriat: ad sepes in graminosis *am heiligen Floß*. Floret Junio.

c. *Floribus declinis*.

280. RUMEX, *Acetosa*, floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. *Linn. Spec.* 481. (*Hall.* 1597.)

H. in pratis & pomariis passim. Floret Junio.

Pharm. ACETOSÆ Radix, Herba.

Maris Calyx patens, Femineæ reflexus.

281. RUMEX, *Acetofella*, floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis. *Linn. Spec.* 481. (*Hall.* 1596.)

H. in collibus nectis apricis passim; *am Homberg & Dollberg* copiose. Foliis non hastatis ludit. Floret Majo & sequ.

C. POLY-

C. P O L Y G Y N I A.

ALISMA. G. P. 460.

Cal. 3 - phyllus. Petala 3. Semina plura. S. N. 257.

282. ALISMA, *Plantago aquatica*, foliis ovatis acutis, fructibus obtuse trigonis. *Linn. Spec.* 486. (*Damaconium*, Hall. 1184.)

H. in fossis stagnis & rivulis passim. Floret Julio, Augusto.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

M O N O G Y N I A.

ÆSCULUS. G. P. 462.

Cal. 1 - phyllus, 5 - dentatus, ventricosus.

Cor. 5 - petala, inæqualiter colorata. calyci inserta. Caps. 3 - locularis. S. N. 259.

283. ÆSCULUS, *Hippo Castanum*, floribus heptandris. *Linn. Spec.* 488. (*Hippocastanum*. Hall. 1029. ***)

H. arbor procera intra urbem *am Löwen*; junior ad portam horti mei *am Sieghäuser Weg*. Floret Junio.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

A. M O N O G Y N I A.

* Flores completi.

EPILOBIUM. G. P. 471.

Cal. 4 - fidus. Petala 4. Caps. oblonga, infera. Sem. papposa. S. N. 264.

2, Stami-

a. *Staminibus declinatis.*

284. *EPILOBIUM, angustifolium*, foliis sparsis linearilanceolatis, floribus inæqualibus. *Linn. Spec. 493. (Hall. 1000.)*

H. in montosis sylvaticis *am Homberg*; ad versuras *auf der Weisgärber- und Sandwiese*; alibique frequens. Floret Julio.

b. *Staminibus erectis regularibus, petalis bifidis.*

285. *EPILOBIUM, hirsutum*, foliis oppositis lanceolatis ferratis decurrenti-amplexicaulibus. *Linn. Spec. 494. (Hall. 995.)*

β. *Lyfimachia filiquosa hirsuta*; parvo flore. *Bauh. Pin. 245.*

H. α, & β, ad ripas *Dilla & an der Mühlbach* abunde. Floret Julio, Augusto.

286. *EPILOBIUM, montanum*, foliis oppositis ovatis dentatis. *Linn. Spec. 494. (Hall. 996.)*

H. in montosis ad radices rupium *am Homberg & Dollberg* frequens. Floret Julio.

287. *EPILOBIUM, tetragonum*, foliis lanceolatis denticulatis: imis oppositis, caule tetragono. *Linn. Spec. 494. (Hall. 997.)*

H. ad fossas passim, *an der Mühlbach* frequens. Floret Julio.

288. *EPILOBIUM, palustre*, foliis oppositis lanceolatis integerrimis, petalis emarginatis; caule erecto. *Linn. Spec. 495. (Hall. 998.)*

H. in pratis humentibus juxta rivulos *im Guldnersgrund*. Floret Augusto.

In hoc & precedente stigma crassiusculum clavatum, apice subquadrifidum.

OENOTHERA. G. P. 469.

Cal. 4-fidus. Petala 4. Caps. cylindrica, infera. Sem. nuda. S. N. 263.

289. *OENOTHERA, biennis*, foliis ovato-lanceolatis planis, caule muricato-villoso. *Linn. S. N. 263. Spec. 492. (Hall. 994.)*

H. ad

H. ad verfuras & margines agrorum *an der Weigärber Wie-
fe* & alibi rarius. Floret Julio, Augusto.

VACCINIUM. G.P. 483.

Cal. superus. *Cor.* 1-petala. *Filamenta* rece-
ptaculo inserta. *Bacca* 4-locularis, poly-
sperma. S. N. 267.

a. *Foliis annotinis s. deciduis.*

290. VACCINIUM, *Myrtillus*, pedunculis unifloris,
foliis serratis ovatis deciduis, caule angulato.
Linn. Spec. 498. (*Hall.* 1020.)

H. unico in loco inter Juniperos *am Stützelberg* versus *Bal-
lersbach*; *im Ebersbacher - und Freyengrund* copiosissime. Flo-
ret Majo.

Calyx integerrimus, orbiculatus. *Corolla urceolata*, apice 4-f.
5-fida. *Stam.* 8 f. 10. *Bacca* 4-f. 5-locularis.

Pharm. MYRTILLI *Baccæ.*

b. *Foliis semper virentibus.*

291. VACCINIUM, *Vitis idæa*, racemis terminalibus
nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis
subtus punctatis. *Linn. Spec.* 500. (*Hall.*
1022.)

H. in sylvaticis montosis ad Dietz. Floret Majo. ✱.

292. VACCINIUM, *Oxycoccus*, foliis integerrimis re-
volutis ovatis, caulibus repentibus filiformi-
bus nudis. *Linn. Spec.* 500. (*Hall.* 1023.)

H. in paludosis inter *Sphagnum* palustre *im Ebersbacher - und
Freyengrund.* Floret Majo, Junio.

Baccæ rubra, acidissima.

ERICA G.P. 484.

Cal. 4-phyllus. *Cor.* 4-fida. *Filamenta* rece-
ptaculo inserta. *Antherae* bifidæ. *Caps.* 4-
locularis. S. N. 268.

293. ERICA, *vulgaris*, antheris bicornibus inclusis,
corollis inæqualibus campanulatis mediocribus,
foliis oppositis sagittatis. *Linn. Spec.* 501.
(*Hall.* 1012.)

β. *Erica vulgaris* glabra flore albo. *Tournef. inst.* 602.

H. α, in sterilissimis campis passim; β. versus *Schönbach
& Gusterthayn* rarius. Floret Julio, Augusto.

Singulus Pedunculus unicum Folium sagittatum pro Bractea, duo in medio opposita pro Involucro, & plura decussata sibi invicem imposita, pro Calyculo habet.

Calycina foliola lanceolata. Corolla ventricosa semiquadrifida. Anthera bifida, acuta, interiore latere dehiscentes; pone basin squamis duabus lanceolato-acuminatis, pilosis, patentibus, instructa. Stylus ascendens; Stigma subquadratum, excavatum, in foveola si no cruciformi notatuna; margine coronatum: quatuor sphaerulis (veris stigmatibus) stipitatis. Capsula cernua.

**** Flores incompleti.**

DAPHNE. G. P. 485.

Cal. o. Cor. 4-fida, corollacea, marcescens, stamina includens. Bacca 1-sperma. S. N. 271.

294. DAPHNE, *Mezereum*, floribus sessilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. *Linn Spec. 509. (Thymelea. Hall. 1024.)*

H. in sylvaticis montosis *am Hemberg* parcius; ad *Erbach* alibi copiose. Floret Martio & Aprili.

Pharm. LAUREOLAE Cortex, COCCOIGNIDII Semina.

B. T R I G Y N I A.

POLYGONUM. G. P. 495.

Cal. o. Cor. 5-partita, calycina. Sem. 1, angulatum. S. N. 275.

a. *Bistorta spica unica.*

295. POLYGONUM, *Bistorta*, caule simplicissimo monostachio, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Linn. Spec. 516. (Hall. 1559.)*

H. in pratis udis *in der Aue* & alibi copiosissime. Floret Majo, Junio.

Pharm. BISTORTAE Radix.

b. *Perficariae pistillo bifido, aut stamina minus 8.*

296. POLYGONUM, *amphibium*, floribus pentandris semidigynis; spica ovata. *Linn. S. N. 275. Spec. 517. (Hall. 1565.)*

a. *Aquatica* natans, foliis obtusis glaberrimis, staminibus corolla brevioribus.

β. Ter-

β. *Terrestis*; erecta, foliis acutiusculis scabris, staminibus corolla longioribus.

H. α. in fossis & fluviis in der Dille auf der Herrn Wieſe, aibique copiose. Floret Junio, Julio.

β. in cultis in der Pitze & vor dem Homberg, pessimum vitium rarissime florens.

Stamina in β *terrestri*, non semper corolla longiora. Semen ovatum, compressum.

297. **POLYGONUM**, *Hydropiper*, floribus hexandris semidigynis, foliis lanceolatis, stipulis submuticis. *Linn. Spec.* 517. (*Hall.* 1554.)

H. ad fossas ubique vulgaris, an der Mühlbach cum sequente copiose. Floret Julio, Augusto.

Pharm. PERSICARIAE Herba.

Planta primario gelu tacta rubescit. Vagina stipulares arcta, truncata, nervosae, nervis parallelis in setas desinentibus, ciliata. Spicae graciles, longa, nutantes, foeculis remotiusculis, geminis, seu ternis, ex singula squama truncata vaginante. Stamina Corolla $\frac{2}{3}$ breviora. Semen subtrigonum.

298. **POLYGONUM**, *Persicaria*, floribus hexandris digynis, spicis ovato-oblongis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis. *Linn. Spec.* 518. (*Hall.* 1557.)

H. cum precedente copiose. Floret Julio, Augusto.

Vagina stipulares oblique truncata, laxa, nervosa, nervis interruptis, inaequalibus, non prominentibus, ora pubescente vix ciliata. Pedunculi subdivisi, Bracteis ovato subulatis. Spicae crassiusculae: Floribus confertis, quaternis ex singula squama ovato-acuta, amplexante. Stamina longitudine Corolla. Semen compressum, obtusum.

c. *Polygonum foliis indivisis, floribus octandris.*

299. **POLYGONUM**, *aviculare*, floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. *Linn. Spec.* 519. (*Hall.* 1560.)

H. in viis, plateis, cultis, arvis & agris ubique. Floret aestate.

Pharm. CENTUMNODIAE s. POLYGONI Herba.

d. *Helxine, foliis subcordatis.*

300. **POLYGONUM**, *Fagopyrum*, foliis cordato-fagigita-

gittatis, caule erectiusculo ipermi, seminum angulis æqualibus. *Linn. Spec. 522. (Hall. 1563)*

H. in cultis auf dem Hinterland; inter segetes am Galgenberg frequens. Floret Julio.

Glandulae 8 cingunt Germinis basin. Filamenta 8, longitudine Corollae: 4 inter glandulas & germen: 4 inter glandulas & corollam. Semen nudum, vix basi testum.

301. *POLYGONUM, Convolvulus*, foliis cordatis, caule volubili angulato, floribus obtusatis. *Linn. S. N. 276. Spec. 522. (Hall. 1561.)*

H. in agris arvis & cultis passim. Floret Julio, Augusto. Corollae laciniae tres exteriores carinatae, obtusissimae, duae interiores planiores, angustioresque. Stamina corollae $\frac{1}{2}$ breviora. Antherae violaceae. Caulis angulato-striatus.

302. *POLYGONUM, dumetorum*, foliis cordatis, caule volubili laevi, floribus carinato-alatis. *Linn. Spec. 522. (Hall. 1562.)*

H. in sepibus & dumetis vor dem Gebäude; bey der Walchmühle; auf der Sandviefse frequens. Floret Julio, Augusto.

Corollae tres laciniae exteriores dorso membrana undulata auctae, duae interiores nuda. Antherae albidae. Caulis levissime striatus.

In hoc & precedente Stylus unicuique brevis. Stigmata 3, globosa, approximata.

C. TETRAGYNIA.

ADOXA. G. P. 501.

Cal. 2-fidus, inferus. Cor. 4. f. 5 fida, superiora. Bacca 4. f. 5-locularis, calyce coalita. S. N. 278.

303. *ADOXA, Moschatellina. Linn. Spec. 527. (Moschatellina. Hall. 1005.)*

H. in umbrosis ad sepes bey der obern Walchmühle; auf dem Rössler; in nemorosis bey Erbach frequens. Floret Aprili, Majo.

Capitulum quinque floribus compositum: Flore terminali quadrisido, octandro, tetragyno, Calyce bisido; lateralibus 4, 5-fidis, decandris, pentagynis, Calyce saepe trisido. Bacca globosa, acutiuscula, supra medium calyce cincta. Semina arillata, seu membrana carnea a pulpa Bacca distincta, vestita. Rarissime

rissime Fructus reperiuntur, quoniam proprio pondere dependent, & foliis aliisque plantis absconduntur.

PARIS. G. P. 500.

Cal. 4-phyllus. Petala 4, angustiora. Baccæ 4-locularis. S. N. 278.

304. PARIS, *quadrifolia*. Linn. Spec. 527. (Hall. 1006.)

H. in sylvis & nemoribus passim. Floret Majo.

Pharm. PARIDIS Radix, Herba, Baccæ.

CLASSIS X.

DECANDRIA.

A. MONOGYNIA.

Flores polypetali æquales.

MONOTROPA. G. P. 536.

Cal. 0 Petala 10; horum 5 exteriora basi excavato-mellifera. Caps. 5-valvis. S. N. 296.

305. MONOTROPA, *Hypopitbys*, floribus lateralibus octandris: terminali decandro. Linn. Spec. 555. (*Hypopitbys*. Hall. 1002.)

H. in sylvis, radicum parasitica imprimis Quercuum, *in Hirschberg* frequens; *in Theriotropheo* parcius. Floret Julio, Augusto.

PYROLA. G. P. 554.

Cal. 5-partitus. Petala 5. Capsula 5-locularis, angulis dehiscens. S. N. 301.

306. PYROLA, *rotundifolia*, staminibus adscendentibus, pistillo declinato. Linn. Spec. 567. (Hall. 1010.)

H. in sylvis rarius, *in Hirschberg* infrequens. Floret Junio. Pharm PYROLAE Herba.

307. PYROLA, *minor*, floribus racemosis dispersis, staminibus pistillisque rectis. Linn. Spec. 567. (Hall. 1009.)

G 3

H. in

H. in sylvis in der Hölle; im Hirschberg copiose; im Thiergarten & Beilstein varius Floret Junio, Julio.

308. PYROLA, *secunda*, racemo unilaterali. Linn. Spec. 567. (Hall. 1008.)

H. in sylvis, in der Hölle versus Dreisbach copiose. Floret Julio.

309. PYROLA, *uniflora*, scapo unifloro. Linn. Spec. 568. (Hall. 1011.)

H. in sylvis, im Hirschberg varius. Floret Junio, Julio. †

B. DIGYNIA.

SCLERANTHUS. G. P. 562.

Cal. 1-phyllus. Cor. o. Sem. 2, calyce inclusa. S. N. 306.

310. SCLERANTHUS, *annuus*, calycibus fructus patulis. Linn. Spec. 580. (Hall. 1551.)

H. in agris & arvis arenosis am Dollberg; hinter dem Schloß; auf dem Homberg frequens. Floret Julio, Augusto.

Radice annua; Caulibus longioribus, minus ramosis; Foliis remotioribus; Calycis laciniis acutioribus, viridius, cix albidis-marginatis; Staminibus 5 f. 7, brevissimis, & Calyce fructus patulo, a sequente distinguitur.

311. SCLERANTHUS, *perennis*, calycibus fructus clausis. Linn. Spec. 580. (Hall. 1550.)

H. in campis & arvis sterilibus passim. Floret Majo & seq.

Calycis laciniis obtuse, albidis-marginatis, patentibus, fructu maturo conniventes. In hoc & in precedente, Semen constanter unicum, ossa capsula inclusum, nec duo, invenire posui.

CHRYOSPLENIUM. G.P. 558.

Cal. 4-f. 5-fidus, coloratus. Cor. o. Caps. 2-rostris, unilocularis, polysperma. S. N. 303.

312. CHRYOSPLENIUM, *alternifolium*, foliis alternis. Linn. Spec. 569. (Hall. 1548.)

H. in nemorosis humidis ad Breidscheid; in denen Steinkammern bey Erbach copiose; circa Amdorf, versus Theriotropheum varius. Floret Aprili, Majo.

Flores etiam primarii in nostrate Planta plerumque quadrifidi, octandri.

313. CHRY-

313. *CHRYOSPLENIUM*, *oppositifolium*, foliis oppositis. *Linn. Spec.* 569. (*Hall.* 1549.)

H. in sylvaticis udis im Hirschberg, in des Herrn Ort ad Gundersdorf frequens. Floret Majo.

Caule tenuiori, aequali-tetragono, laevi: lateribus duobus oppositis latioribus planioribus, duobus angustioribus canaliculatis; Foliis omnibus oppositis, minoribus, subrotundis, obiter minusque profunde crenatis; radicalibus in florente planta fere nullis. Petiolis laevibus; Floribus paucioribus, distinctioribus, in nostrate omnibus quadrifidis ostendis, foliisque multo minoribus bracteatis; a precedente hac Species notabiliter se distinguit.

SAXIFRAGA. 559.

Cal. 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Caps.* 2-rostris, unilocularis, polysperma. S. N.

303.

314. *SAXIFRAGA*, *granulata*, foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulata. *Linn. Spec.* 576. (*Hall.* 976.)

H. in pratis siccis am Rehberg; in collibus apricis am Guldnersgrund; Stützelberg; & alibi frequens. Floret Majo, Junio.

Pharm. *SAXIFRAGAE ALBAE* Semina. (radicis granulata.)

315. *SAXIFRAGA*, *tridactylites*, foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoso. *Linn. Spec.* 578. (*Hall.* 986.)

H. in rupestribus am Stützelberg & Rehberg; ad muros pomarii & cæmeterii frequens. Floret Aprili, Majo.

GYPSOPHILA. G. P. 563.

Cal. 1-phyllus, campanulatus, angulatus. *Petala* 5, ovata, sessilia. *Capsula* globosa, unilocularis. S. N. 306.

316. *GYPSOPHILA*, *muralis*, foliis linearibus planis, calycibus aphyllis, caule dichotomo, petalis crenatis. *Linn. Spec.* 583. (*Saponaria.* *Hall.* 903.)

H. in agris in der Aue; in arvis hinter dem Schloß parcius; in campis sterilibus auf dem Stützelberg copiose. Floret Augusto.

SAPONARIA. G. P. 564.

Cal. 1-phyllus, nudus. *Petala* 5, unguiculata. *Capsula* oblonga, 1-locularis. S. N. 307.

317. SAPONARIA, *officinalis*, calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. *Linn. Spec.* 584. (*Hall.* 908.)

H. ad sepes & vias passim. Floret Junio, Julio.

Pharm. SAPONARIAE Radix, Herba.

318. SAPONARIA, *Vaccaria*, calycibus pyramidatis quinquangularibus, foliis ovatis acuminatis sessilibus. *Linn. Spec.* 585. (*Hall* 907.)

H. in arvis *auf dem Homberg* rarius. Floret Junio, Julio.

DIANTHUS. G. P. 565.

Cal. cylindricus, 1-phyllus: basi squamis 4. *Petala* 5, unguiculata. *Caps.* cylindrica, 1-locularis. S. N. 307.

319. DIANTHUS, *carthusianorum*, floribus subaggregatis: squamis calycinis ovatis aristatis tubum subaequantibus, foliis trinerviis. *Linn. S. N.* 307. *Spec.* 586. (*Tunica.* *Hall.* 899.)

H. in campis sterilibus apricis *auf dem Stützelberg* frequens. Floret Julio.

320. DIANTHUS, *Armeria*, floribus aggregatis fasciculatis: squamis calycinis lanceolatis villosis tubum æquantibus. *Linn. Spec.* 586. (*Hall.* 900.)

H. in sylvaticis montosis *am Homberg & Fischvveyher - Grund*, alibique infrequens. Floret Julio, Augusto.

321. DIANTHUS, *prolifer*, floribus aggregatis capitis: squamis calycinis ovatis obtusis muticis tubum superantibus. *Linn. Spec.* 587. (*Hall.* 901.)

H. in campis sterilibus & collibus apricis, *hinter dem Schloß; am Dollberg* alibique frequens. Floret Julio, Augusto.

b. Flores solitarii, plures in eodem caule.

322. DIANTHUS, *diminutus*, floribus solitariis: squamis calycinis octonis florem superantibus. *Linn. Spec.* 587? (*Hall.* 901. var. *γ. præc.*)

H. in

H. in sterilissimis campis *auf dem Callenbachsberg*. Floret Junio, Julio

Caule *ramosiori, minus erecto, floribus saepe solitariis, nec in capitulum congestis, a precedente vix differt.*

323. DIANTHUS, *deltoides*, floribus solitariis, squamis calycinis lanceolatis binis, corollis crenatis. *Linn Spec 588.*

H. in pascuis fectis, *hinter dem Schloß, am Homberg, Rehberg, & alibi frequens.* Floret Junio, Julio.

C. T R I G Y N I A.

ARENARIA. G. P. 569.

Cal. 5-phyllus, patens. Petala 5, integra.

Caps. 1-locularis, polysperma. S. N. 312.

324. ARENARIA, *trinervia*, foliis ovatis acutis petiolatis nervosis. *Linn. Spec. 605. (Alfine. Hall. 878.)*

H. in sylvaticis umbrosis; ad sepes in pomariis passim. Floret Junio & seq.

325. ARENARIA, *serpillifolia*, foliis subovatis acutis sessilibus, corollis calyce brevioribus. *Linn. Spec. 606. (Hall. 875.)*

H. ad muros urbis & cæmeterii; in glareosis aridis passim. Floret Majo & sequ.

In hac & in precedente Petala calyce duplo breviora; Capsula cernua pedunculo horizontali, uti in Stellariis, apice 6- (nec 5-) sariam dehiscens.

326. ARENARIA, *rubra*, foliis filiformibus, stipulis membranaceis vaginantibus. *Linn. Spec. 606. (Hall. 872.)*

H. in arvis *am Rehberg*, in agris *im Guldnersgrund* rarius. Floret Junio.

327. ARENARIA, *tenuifolia*, foliis subulatis, caule paniculato, capsulis erectis, petalis calyce brevioribus lanceolatis. *Linn. S. N. 313. Spec. 607. (Hall. 866.)*

H. in scopulis *am Stüzelberg*; in rupibus versus theriotropheum abunde; in muris pontis novi rarius. Floret Junio.

Radix *annua*. Caulis *stipitatus, erectus, dichotomus, demum paniculatus*. Folia *subulata, basi comata, supra plana, subtina*

subtus convexa, apice acuto purpureo, internodiis breviora. Pedunculi uniflori, erecti. Calycina foliola lanceolata, mucrone intus purpureo, vix albido marginata, laevia; uti Bractea in sicca trinervia. Petala ovata, obtusa, lactea, ungue brevi, Calyce dimidio fere breviora. Stamina in primariis floribus 10, in serioribus 7-9, longitudine petalorum. Anthera didyma, carnea, polline hyalino. Styli 3, longitudine staminum. Capsula erecta, ovato-trigona, calyce paulo longior, apice valvulis tribus obtusiusculis dehiscens. Semina punctata, fusca.

STELLARIA. G.P. 568.

Cal. 5-phyllus, patens. Petala 5, bipartita.

Caps. 1-locularis, polysperma. S. N. 311.

328. *STELLARIA, nemorum*, foliis cordatis petiolatis, panicula pedunculis ramosis. *Linn. Spec. 603. (Myosotis. Hall. 886.)*

H. in nemorosis ad pagum *Erbach*; in umbrosis im *Zruin-ger*, alibique frequens. Floret Majo.

Caule sesquipedali, tereti, subhirsuto. Foliis pubescentibus, subtus pallidioribus: inferioribus cordatis petiolatis, intermediis lato-lanceolatis subpetiolatis, superioribus ovatis sessilibus. Floribus erecto-patulis subcampaniformibus; Calyce laevi; Styli tribus. Pedunculis fructu maturo cernuo, horizontalibus; Capsulis ovato-cylindratis, sexvalvibus; loco natali semper umbroso; temporeque florendi praecociori, (Majo,) a *Cerastio aquatico* cui simillima, facillime dignoscenda.

329. *STELLARIA; Holosteia*, foliis lanceolatis ferrulatis, petalis bifidis. *Linn. Spec. 603. (Alfina. Hall. 884.)*

H. in sylvaticis umbrosis & ad sepes passim. Floret Majo, Junio.

330. *STELLARIA, graminea*, foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis. *Linn. Spec. 604. (Hall 882.)*

α . Caryophyllus arvensis glaber flore minore. *Bauh. Pin. 210.*

β . *Alfina*, folio gramineo angustiore, palustris. *Dillen. append. 69.*

H. α , in pratis juxta rivulos passim; β in salicetis an *der Nille*. Floret Junio, Julio.

α , Caulis paniculatus. Flos patentissimus. Petala ultra medium bipartita. β , Caulis altior, minus ramosus. Flores duplo majores.

• *majores, erecto-patentes. Petala semibifida. Capsula in utraque calyce minor, apice sexvalvi dehiscens.*

331. *STELLARIA, dilleniana*, foliis lanceolatis integerrimis, caule procumbente.

• *Alfina aquatica, folio gratiolæ, stellato flore. Dillen. Cat. app. 39. (Alfina. Hall. 881.)*

Var. γ. præcedentis. L. I N S. *Flor. Suec. Edit. II. no. 393.*

H. in tellis & rivulis pratorum abunde; *an der Mießbach* frequens. Floret Majo.

Foliis lanceolatis, basi ciliatis; Pedunculis ternis axillaribus, ex caulis medio apicque tantum prodeuntibus, basi duobus foliolis lanceolatis in ala folii sessilibus, bracteatis; lateralibus 2 triidis, trifloris: Pedicellis peracta florescentia divaricatis, apice incrassatis. Petalis calyce brevioribus, ad ungum usque bipartitis, laciniis distantibus. Staminibus 5 unguibus petalorum, 5 totidem glandulis germen cingentibus, insertis; a priori differt. Nonne hac planta his notis a præcedente satis discrepans, tanquam propria Species proponi meretur?

CUCUBALUS. G. P. 566.

Cal. inflatus. Petala 5, unguiculata, absque corona ad faucem. Caps. 3-locularis. S. N. 308.

332 *CUCUBALUS, Beben*, calycibus subglobosis glabris reticulato-venosis, capsulis trilocularibus, corollis subnudis. *Linn. Spec. 591. (Viscago. Hall. 913.)*

H. in pratis montosis, & ad versuras passim. Floret Junio, Julio.

SILENE. G. P. 567.

Cal. ventricosus. Petala 5, unguiculata: coronata ad faucem. Capsula trilocularis. S. N. 309.

333. *SILENE, nutans*, petalis bifidis, floribus lateralibus secundis cernuis, panicula nutante. *Linn. Spec. 596. (Viscago. Hall. 915.)*

H. in pratis sylvaticis *am Kehlberg* alibique frequens. Floret Majo, Junio.

Capsula sexfariam apice dehiscit in hac & præcedente.

D. P E N T A G Y N I A.

SEDUM. G. P. 579.

Cal. 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Squamæ* nectariferæ 5, ad basin germinis. *Caps.* 5. S. N. 316.

334. SEDUM, *Telephium*, foliis planiusculis ferratis, corymbo folioso, caule erecto. *Linn. Spec.* 616. (*Hall.* 954.)

α , *Telephium* (*album*) vulgare. *Bauh. Pin.* 287.

β , *Telephium* (*purpureum*) purpureum majus. *Bauh. Pin.* 287.

H. α , in agris in der Aue, alibique; β , in siccis asperis am Dollberg; ad sepes am Sieghäuser Weg. Floret Augusto.

Pharm. α . TELEPHII Radix, FABARIÆ Folia.

335. SEDUM, *reflexum*, foliis subulatis sparsis basi solutis: inferioribus recurvatis. *Linn. Spec.* 618. (*Hall.* 967.)

H. in collibus siccis apricis passim; am Dollberg copiose. Floret Julio, Augusto.

Corolla Petalis 6-7-8-9. cum totidem Germinibus, duploque Staminum sapissime ludit.

336. SEDUM, *album*, foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus, cyma ramosa. *Linn. Spec.* 619. (*Hall.* 959.)

H. in rupibus am Homberg; in muris urbis & pontis novi frequens. Floret Julio

337. SEDUM, *acre*, foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida. *Linn. Spec.* 619. (*Hall.* 966.)

H. in campis & collibus siccis sterilibus passim. Floret Junio.

Pharm. SEDI MINORIS Herba.

338. SEDUM, *sexangulare*, foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis sexfariam imbricatis. *Linn. Spec.* 620. (*Hall.* 965.)

H. similibus locis, cum præcedente am Dollberg rarius. Floret Julio.

339. SEDUM, *villosum*, caule erecto, foliis planiusculis pedunculisque subpilosis. *Linn. Spec.* 620. (*Hall.* 962.) H.

H. in paludosis *im Hirschberg*, in *des Herrn Ort* ad *Gundersdorf* copiose; ad pagum *Breitscheid* rarius. Floret Julio.

SPERGULA. G. P. 586.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5, integra. *Caps.* ovata, unilocularis, 5-valvis. S. N. 321.

340. SPERGULA, *arvensis*, foliis verticillatis, floribus decandris. *Linn. Spec.* 630. (*Alfina*. Hall. 873.)

H. in arvis & agris inter *Linum* in *der Aue*, alibique frequens. Floret Julio & seq.

341. SPERGULA, *pentandra*, foliis verticillatis, floribus pentandris. *Linn. Spec.* 630.

H. in sterilibus glareosis *auf der Sandvviese*; jam dudum lecta nunc rarissima planta. Floret Majo.

342. SPERGULA, *nodosa*, foliis oppositis subulatis lævibus, caulibus simplicibus. *Linn. Spec.* 630. (*Hall.* 871.)

H. in pratis udis *im Pulvers. Grund*. Floret Julio.

CERASTIUM. G. P. 585.

Cal. 5-phyllus. *Petala* bifida, *Capsula* 1-lo-
cularis, apice dehiscens. S. N. 320.

a. *Capsulis oblongis.*

343. CERASTIUM, *vulgatum*, foliis ovaris, petalis calyci æqualibus, caulibus diffusis. *Linn. Spec.* 627. (*Myosotis*. Hall. 893.)

H. in pomariis & pratis siccis passim. Floret Majo & sequ.

344. CERASTIUM, *viscosum*, erectum villoso-viscosum. *Linn. Spec.* 627. (*Hall.* 895.)

H. in pascuis sterilibus, *hinter dem Schloß*, alibique. Floret Majo.

345. CERASTIUM, *semidecandrum*, floribus pentandris, petalis emarginatis. *Linn. Spec.* 627. (*Hall.* 894.)

H. in pascuis macilentis *am Homberg* rarius; ad pagum *Erbach* frequens. Floret Majo.

346. CERASTIUM, *arvense*, foliis lineari-lanceolatis obtusis glabris, corollis calyce majoribus. *Linn. Spec.* 628. (*Hall.* 889.)

H. in pascuis, versuris, & ad vias passim. Floret Majo, Junio.

b. *Capsulis*

b. *Capsulis subrotundis.*

347. CERASTIUM, *aquaticum*, foliis cordatis sessilibus, floribus solitariis, fructibus pendulis. *Linn. Spec. 629. (Hall. 885.)*

H. ad fossas, locis humentibus *unter der neuen Erücke*; *an der Mühlbach* copiose. Floret Julio, Augusto.

Caulis *tripedali, subtetragono, glabro, subramoso: geniculis carinaeque foliorum rupecentibus. Foliis cordatis, glabris, amplexicaulibus, margine undulatis; superioribus pubescentibus. Floribus patentissimis; Pedunculis Calycibusque viscosis pubescentibus. Petalorum laciniis latioribus, distantibus; Stylis quinque; Pedunculis fructu maturo recto, nutantibus. Capsulis calyce conniventi tectis, ovatis, 5-valvibus, Valvis bifidis, reflexis; Tempore florendi seriori; (Augusto) Loco natali semper humente, a Stellaria nemorum distinguuntur.*

AGROSTEMA G. P. 583.

Cal. 1-phyllus, coriaceus. Petala 5, unguiculata: Limbo obtuso, indiviso. Caps. unilocularis. S. N. 319.

348. AGROSTEMA, *Githago*, hirsuta, calycibus corollam æquantibus, petalis integris nudis. *Linn. Spec. 624. (Lychnis. Hall. 926.)*

H. in agris inter fetetes frequens. Floret Junio.

LYCHNIS. G. P. 584.

Cal. 1-phyllus, oblongus, levis. Petala 5, unguiculata: Limbo subbifido. Caps. 5-locularis. S. N. 319.

349. LYCHNIS, *Flos cuculi*, petalis quadrifidis, fructu subrotundo. *Linn. Spec. 625. (Hall. 921.)*

H. in pomariis & pratis humidis passim. Floret Majo, Junio.

Capsula unilocularis.

350. LYCHNIS, *dioica*, floribus dioicis. *Linn. Spec. 626. (Hall. 923.)*

H. in dumetis & sepibus passim. Floret Junio & sequ.

Capsula unilocularis, apice 10-fariam dehiscens, valvulis revolutis. Petalis 4-fidis ludit. Hermaphroditam nondum vidi.

OXALIS. G. P. 582.

Cal. 5-phyllus. Petala unguibus connexa. Caps. angulis dehiscens, 5-gona. S. N. 318.

a. Scapo

a. *Scapo radicali.*

351. OXALIS, *Acetosella*, scapo unifloro, foliis ternatis, radice squamosa articulata. *Linn. Spec.* 620. (*Hall.* 928.)

H. in sylvis & nemoribus abunde; in dem Haynvoinskelgen parcius. Floret Aprili, Majo.

Pharm. ACETOSELLÆ Herba.

b. *Foliis caulinis alternis.*

352. OXALIS, *corniculata*, pedunculis umbelliferis, caule ramoso diffuso *Linn. Spec.* 623. (*Hall.* 929.)

H. in cultis & hortis ad Dillenburg. Floret Junio.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

A. MONOGYNIA.

ASARUM. G. P. 589.

Cal. 3-f. 4-fidus, germini infidens. *Cor.* o.

Caps. coriacea, coronata. S. N. 325.

353. ASARUM, *europæum*, foliis reniformibus obtusis binis. *Linn. Spec.* 633. (*Hall.* 1547.)

H. in sylvis & nemorosis frequens, am Homberg parcius. Floret Aprili.

Pharm. ASARI Radix, Herba.

LYTHRUM. G. P. 604.

Cal. 12-fidus. *Petala* 6, calyci inserta. *Capsula* 2-locularis, polysperma. S. N. 328.

354. LYTHRUM, *Salicaria*, foliis oppositis cordato-lanceolatis, floribus spicatis dodecandris. *Linn. Spec.* 640. (*Salicaria.* *Hall.* 854.)

H. ad ripas Dilla frequens. Floret Julio, Augusto.

Pharm. SALICARIÆ Herba.

B. DIGYNIA.

AGRIMONIA. G. P. 607.

Cal. 5-dentatus, altero obvallatus. *Petala*

5. *Sem.* 2, in fundo calycis. S. N. 329.

355. *AGRIMONIA*, *Eupatoria*, foliis caulinis pinnatis: impari petiolato, fructibus hispidis. *Linn. Spec.* 643. (*Hall.* 991.)

H. in pascuis siccis, ad versuras vulgaris. Floret Julio, Augusto.

Pharm. AGRIMONIE Herba.

C. TRIGYNIA.

RESEDA. G. P. 608.

Cal. 1-phyllus, partitus. *Petala* laciniata.

Caps. ore dehiscens, 1-locularis. S. N. 329.

356. *RESEDA*, *Luteola*, foliis lanceolatis integris basi utrinque unidentatis, calycibus quadrifidis. *Linn. S. N.* 329. *Spec.* 643. (*Hall.* 1058.)

H. in sterilibus *am Dollberg; auf dem Hinter-Sand*, alibique frequens. Floret Julio, Augusto.

EUPHORBIA. G. P. 609.

Cor. 4-f. 5-petala, calyci insidens. *Calyx*

1-phyllus, ventricosus. *Caps.* 3-cocca. S. N. 330.

a. *Umbella trifida.*

357. *EUPHORBIA*, *Peplus*, umbella trifida: dichotoma, involucellis ovatis, foliis integerrimis ovatis petiolatis. *Linn. Spec.* 653. (*Tithymalus*, *Hall.* 1049.)

H. in cultis inter olera abunde. Floret Julio, Augusto.

Petala bicornia. *Fructus* tricarinatus: carina membranacea undulato-crenata, sulco divisa. *Semina* pulchre reticulata.

358. *EUPHORBIA*, *exigua*, umbella trifida: dichotoma, involucellis lanceolatis, foliis linearibus. *Linn. Spec.* 654. (*Hall.* 1048.)

Tithymalus (*acuta*) f. *Esula* exigua. *Bauh. Pin.* 291.

Tithymalus (*retusa*) f. *Esula* exigua foliis obtusis. *Bauh. Pin.* 291.

H. α, in agris post messem *am Homberg*; β, in der *Altzbach* copiosissime. Floret Julio, Augusto.

Caulis vix nisi ad basin ramosus, umbella saepius brevior. Folia linearia: in α, acutiuscula; in β, truncata, retusa, cum micro-

involucrone. Involucra & Involucella ovato-lanceolata, basi inaequalia, uno latere latiore. Flores omnes fertiles, exigui. Petala 4, bicornia. Capsula laevis. Semina subreticulata.

b. Umbella quinquefida.

359. EUPHORBIA, *dulcis*, umbella quinquefida: bifida, involucellis subovatis, foliis lanceolatis obtusis integerrimis. *Linn. Spec. 656.* (*Hall. 1051.*)

H. in sylvaticis montosis ad Breitscheid. Floret Majo, Junio.

Radix perennis, horizontalis, densa, annulata, basi fibrosissima. Caules plures, herbacei, pedales, erecti, subserotes, glabri; Coma ante florescentiam nuante. Folia alterna, sessilia, parentia, lanceolata, obtusa, tenera; supra laevia, subtus pallidiora, mollissime albido-villosa: Epidermide sapient circa costam secedente, subinflata. Umbella radiis 5: Pedunculis bifidis, variis bis bifidis, nec ultra. Involucrum pentaphyllum: foliolis ovato-lanceolatis, folio vestitu simillimis. Involucella duo, ovato-cordata, basi truncata, acutiuscula, utrinque laevia; marginibus uti Involucra & Folia superiora, subtilissime serrulata. Rami fertiles ex superioribus foliorum alis, aphylli, pedunculis simillimi: quorum tres superiores saepe umbella adeo approximati, ut hac octafida octonisque involucri foliolis instructa, primo intuitu videatur. Flos primarius ramorum & pedunculorum in semel bifidis fertilis, in bis bifidis semper sterilis. Calyx turbinatus, quadridentatus, pubescens. Petala quatuor, subrotunda, pelvisformia, flava, ungue brevissimo. Capsula glandulis purpureis conicis verrucosa. Semina ovata, laevia. Succus planta lacteus insipidus, non acris.

360. EUPHORBIA, *belioscopia*, umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus ferratis. *Linn. Spec. 658.* (*Hall. 1050.*)

H. in cultis inter olera passim. Floret Julio, Augusto.

Pharm. ESULA Herba.

c. Umbella multifida.

361. EUPHORBIA, *Esula*, umbella multifida: bifida, involucellis subcordatis, petalis subbicornibus, ramis sterilibus, foliis uniformibus. *Linn. Spec. 660.* (*Hall. 1046.*)

H. in sylvaticis montosis, inter lapidum acervos im Beilstein; jam audum lecta. Floret Majo.

362. EUPHORBIA, *Cyparissias*, umbella multifida :
dichotoma, involucellis subcordatis, ramis
sterilibus, foliis fetaceis, caulinis lanceolatis.
Linn. Spec. 661. (Hall. 1047)

H. in pascuis sterilibus *im Thiergarten* abunde. Floret Majo.

D. DODECAGYNIA.

SEMPERVIVUM, G. P. 612.

Cal. 12-partitus. *Petala* 12. *Capsulæ* 12, polysperma. S. N. 335.

363. SEMPERVIVUM, *tectorum*, foliis ciliatis, propaginibus patentibus. *Linn. Spec. 664. (Sedum. Hall. 949.)*

H. in tectis frequens. Floret Julio.

Pharm. SEMPERVIVI MAIORIS Herba.

Petala, *Stamina*, *Germinalia*, *Nectarique* 12-18.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

A. MONOGYNIA.

PHILADELPHUS, G. P. 614.

Cal. 4-f. 5-partitus, superus. *Petala* 4-f. 5.
Caps. 4-f. 5-locularis, polysperma. S. N.
339.

364. PHILADELPHUS, *coronarius*, foliis subdentatis.
Linn. Spec. 671. (Hall. 1100.)

H. in dumetis *am Homberg*; ad sepes frequens. Floret Junio.

PRUNUS, G. P. 620.

Cal. 5-fidus, inferus. *Petala* 5. *Drupæ* nux
futuris prominulis. S. N. 341.

365. PRUNUS, *Padus*, floribus racemosis, foliis deciduis basi subtus biglandulosis, *Linn. Spec. 677. (Padus. Hall. 1086.)*

H. in sepibus ad *Beilstein*; in dumetis versus *Langenaubach*.
Floret Majo.

366. PRUNUS, *Cerasus*, umbellis subpedunculatis, foliis ovato-lanceolatis glabris conduplicatis. *Linn. S. N.* 342. *Spec.* 679. var. α . (*Cerasus. Hall.* 1083.)

H. in sylvaticis *am Homberg*; ad sepes passim. Floret Majo.
Pharm. CERASORUM ACIDORUM Fructus.

367. PRUNUS, *avium*, umbellis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis subtus pubescentibus conduplicatis. *Linn. S. N.* 342. *Spec.* 680. (*Hall.* 1082.)

H. in sylvis, ad pagos *Hirschberg & Fleisbach* frequens. Floret Majo.

Fructu rubro, & nigro variat.

Pharm. CERASORUM NIGRORUM Fructus. (potius Nuclei.)

368. PRUNUS, *domestica*, pedunculis subsolitariis, foliis lanceolato-ovatis convolutis, ramis muticis. *Linn. Spec.* 680. (*Prunus. Hall.* 1079.)

α . *Prunus. Bauh. Pin.* 443.

β . Pruna majora dulcia & parva atro-cærulea, *Bauh. Pin.* 443. no. 23.

H. α & β in sepibus & dumetis *am Homberg*, alibique frequens. Floret Majo.

Pharm. β , PRUNI DAMASCENÆ Fructus.

369. PRUNUS, *insititia*, pedunculis geminis, foliis ovatis subvillosis convolutis, ramis spinoscentibus. *Linn. S. N.* 342. *Spec.* 680. (*Hall.* 1081.)

H. in sepibus ad pagum *Breitscheid* Floret Majo.

370. PRUNUS, *spinosa*, pedunculis solitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis spinosis. *Linn. Spec.* 681. (*Hall.* 1080.)

H. in dumetis & sepibus passim. Floret Aprili.

Pharm. ACACIÆ Flores, Fructus.

B. DIGYNIA.

CRATÆGUS. G. P. 622.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Bacca* infera, 2-sperma. S. N. 342.

371. CRATÆGUS, *Aria*, foliis ovatis incisiss ferratis subtus tomentosis. *Linn. S. N.* 342. *Spec.* 681. (*Mespilus. Hall.* 1089.)

H 2

H. in

H. in sylvaticis montosis *am Callenbachs - Berg*. Floret Majo ?
Flores nondum vidi.

372. CRATÆGUS, *torminalis*, foliis cordatis septangulis : lobis infimis divaricatis. *Linn. Spec.* 681. (*Mespilus. Hall.* 1088.)

H. in sylvis *im Hirschberg; im der Hôrre*. Floret Majo. †

373. CRATÆGUS, *Oxyacantha*, foliis obtusis subtrifidis ferratis. *Linn. Spec.* 683. (*Mespilus. Hall.* 1087.)

H. in sepibus dumetis & sylvis passim. Floret Majo.

C. TRIGYNIA.

SORBUS. G. P. 623.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Bacca* infera, 3-sperma. S. N. 343.

374. SORBUS, *aucuparia*, foliis pinnatis utrinque glabris. *Linn. Spec.* 683. (*Mespilus. Hall.* 1091.)

H. in sylvis frequens. Floret Majo.

Pharm. SORBI AUCUPARIÆ Baccæ.

D. PENTAGYNIA.

MESPILUS. G. P. 625.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Bacca* infera, 5-sperma. S. N. 343.

375. MESPILUS, *Cotoneaster*, inermis, foliis ovatis integerrimis : subtus tomentosis. *Linn. S. N.* 343. *Spec.* 686. (*Mespilus. Hall.* 1093.)

H. in rupibus, & quidem unico tantum in loco umbroso, *am Homberg über der Lishau*. Floret Aprili, Majo.

Loco natali plerumque Styli tres in Flore, & Semina tria in Fructu pyriformi umbilico pervio, observari. Petala calyce vix majora, conniventia.

PYRUS. G. P. 626.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Pomum* inferum, 5-loculare, polyspermum. S. N. 344.

376. PYRUS, *communis*, foliis ferratis, floribus corymbosis. *Linn. S. N.* 344. *Spec.* 686. (*Hall.* 1096.)

H. in sylvis & ad pagos frequens. Floret Majo.

377. PYRUS, *Malus*, foliis ferratis, umbellis sessilibus. *Linn. Spec.* 686. (*Hall.* 1097.)

H. in sylvis, ad vias & pagos passim. Floret Majo.

SPIRÆA. G. P. 630.

Cal. 5 - fidus. *Petala* 5. *Capsulæ* polysperma. S. N. 347.

378. SPIRÆA, *Ulmaria*, foliis pinnatis: impari majore lobato, floribus cymosis. *Linn. Spec.* 702. (*Filipendula.* *Hall.* 1135.)

H. ad ripas Dilla passim; an der Mühlbach frequens. Floret Julio.

Pharm. ULMARIÆ Radix, Flores.

E. POLYGYNIA.

ROSA. G. P. 631.

Petala 5. *Cal.* urceolatus, 5 - fidus, carnosus, collo coarctatus. *Semina* plurima, hispida, calycis interiori lateri affixa. S. N. 348.

379. ROSA, *Eglanteria*, germinibus globosis pedunculisque glabris, caule aculeis sparsis rectis, petiolis scabris, foliolis acutis. *Linn. Spec.* 703?

Rosa spinis aduncis, foliis subtus rubiginosis. *Hall.* 1103:

H. in sepibus & sylvis passim. Floret Majo, Junio.

Caulis, Rami & Petioli aculeis validis apice recurvis armati. Stipulæ Petioli Calycesque setis capitatis viscosis adpersi. Foliola quina s. septena, impari majore, ovata, acuta, serrata: serraturis incis glanduliferis; supra levia, subtus villosa rubiginosa, viscida, odore: Pedunculi solitarii & terni, setis scabri. Petala carnea, ungue flavo albidoque. Fructus globosus, basi setis hispidiusculus, demum nigrescens. Semina levia.

380. ROSA, *umbellata*, germinibus ovatis glabris capitatis subumbellatis, caule aculeato. *Leyser. Flor. Hal.* 435?

H. in sylvis in der Hölle; im Beilstein frequens. Floret Junio.

Pedunculi setis scabri terminales tres: intermedio uniflora, lateralibus trifidis, trifloris. Fructus septem, magni, globosi, glabri,

glabri, dein nigricantes, altitudine aequales; in reliquis ab antecedente vix diversa. Utraque R. villosa (nostra) valde adfinis.

381. *Rosa, cinamomea*, germinibus globosis pedunculisque glabris, caule aculeis stipularibus, petiolis subinermibus. *Linn. Spec. 703.*

H. in sepibus *am Sieghäuser Weg, bey dem Steg*; in dumetis ad viam publicam *bey der untern Walckmühle*. Floret Junio.

Frutex *orgyalis*: Ramis longis, purpureis, glaberrimis, vernice quasi obnatis. Aculei recti, albi: duo tantum ad basim singuli Ramuli & Stipula. Stipulae oblongae, dilatatae, subcoloratae, serrulatae: serraturis purpureo-glandulosis. Petioli subvillosi, inermes. Foliola septena, oblonga, serrata, subtus albido-villosa. Pedunculi Germinaque levia. Calycis foliola integerrima, subvillosa. Flores in nostrate semper multiplicati, suaveolentes, steriles.

382. *Rosa, canina*, germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Linn. Spec. 704. (Rosa. Hall. 1101.)*

H. in sepibus & dumetis passim. Floret Junio.

Pharm. ROSÆ SYLVESTRIS Flores; CYNOSBATI Fructus, Semina; Fungi BEDEGUAR.

383. *Rosa, pendulina*, germinibus ovatis glabris, pedunculis cauleque hispidis, petiolis inermibus, fructibus pendulis. *Linn. S. N. 348. Spec. 705.*

H. in sylvis *im Hirschberg* rarius. Floret Junio.

384. *Rosa, spinosissima*, germinibus globosis glabris, pedunculis hispidis, caule petiolisque aculeatissimis. *Linn. S. N. 348. Spec. 705. (Hall. 1106.)*

H. in montosis *am Beilstein*. Floret Junio. †

385. *Rosa, villosa*, germinibus globosis pedunculisque hispidis, caule aculeis sparsis, petiolis aculeatis, foliis tomentosis. *Linn. S. N. 348. Spec. 704? (Hall. 1105.)*

H. in dumetis *auf der Höhle, bey dem heiligen Creutz*. Floret Junio. •

A *Rosa villosa in hortis culta, nostra vix differt, nisi: Aculeis quidem rectis, apicibus autem subrecurvis; Foliolis magis ovatis, utrinque tamen valde villosis; Pedunculis, Calycibus, Germini-*

Germinibusque quidem aculeatis, Fructu maturo vero duplo minore subaculeato, aculeos (basi excepta) deponente.

RUBUS. G. P. 632.

Cal. 5-fidus. Petala 5. Bacca composita acinis monospermis. S. N. 349.

a. Frutescentes.

386. RUBUS, *idaeus*, foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. *Linn. Spec. 706 (Hall. 1108.)*

β. Caule levi inermi.

H. in sepibus *hinter dem Schloß*; in sylvaticis montosis passim,

β. *im Zuvinger*. Floret Majo & sequ.

Pharm. RUBI IDAEI Bacca.

387. RUBUS, *caesus*, foliis ternatis subnudis: lateralibus bilobis, caule aculeato tereti. *Linn. Spec. 706. (Hall. 1110.)*

H. in sepibus & dumetis passim. Floret Junio, Julio,

Pharm. RUBI CATI Folia. (*Sequentis gratiora.*)

388. RUBUS, *fruticosus*, foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis. *Linn. Spec. 707. (Hall. 1109.)*

H. in dumetis & sepibus frequens. Floret Junio.

b. Herbacei.

389. RUBUS, *saxatilis*, foliis ternatis nudis, flagellis reptantibus herbaceis. *Linn. S. N. 349. Spec. 708. (Hall. 1111.)*

H. in sylvaticis montosis *im Hirschberg*; ad pagum *Lieben. scheid*; Floret Majo, Junio.

TORMENTILLA. G. P. 635.

Cal. 8-fidus. Petala 4. Semina subrotunda, (8) nuda, receptaculo parvo exsucco affixa. S. N. 352.

390. TORMENTILLA, *erecta*, caule erectiusculo, foliis sessilibus. *Linn. Spec. 716. (Fragaria. Hall. 1117.)*

H. in pascuis sylvaticis montosis, *am Rehberg*; *Homburg*, alibique parcius. Floret Junio, Julio.

Pharm. TORMENTILLÆ Radix, Herba.

FRAGARIA. G. P. 633.

Cal. 10-fidus. *Petala* 5. *Receptaculum* seminum ovatum, baccatum, deciduum. S. N. 349.

391. FRAGARIA, *vesca*, flagellis reptantibus. *Linn.* S. N. 349. *Spec.* 708. (*Hall.* 1112.)

β. *Fragaria sterilis*, stigmatibus destituta, *du Chesne Hist. des Fraiziers.* 107. *HALL.* var. *γ.* l. c.

H. in sylvis copiosissime. Floret Majo, Junio.

Pharm. α, FRAGARIÆ Radix, Herba, Baccæ.

Var. β. Scapo sesquipedali, multifloro; Stolonibus plerumque nullis; Floribus triplo majoribus; Antheris Stigmatibusque sphacelo, quasi correptis, fusco-atris, fere nullis; Fructibus abortientibus; annuatim provenit in dumetis *am Homberg*, alibique.

392. FRAGARIA, *sterilis*, caule decumbente, ramis floriferis laxis. *Linn.* S. N. 350. *Spec.* 709. (*Hall.* 1113.)

H. in pascuis sterilibus passim. Floret Aprili, Majo.

Petala obcordata, *Calyci* aequalia. *Bacca* exsucca. (*Potentillæ.*)

POTENTILLA. G. P. 634.

Cal. 10-fidus. *Petala* 5. *Semina* subrotunda, nuda, receptaculo parvo exsucco affixa. S. N. 350.

a. *Foliis pinnatis.*

393. POTENTILLA, *Anserina*, foliis pinnatis serratis, caule repente, pedunculis unifloris. *Linn.* S. N. 350. *Spec.* 710. (*Fragaria.* *Hall.* 1126.)

H. in pascuis, ad vias passim. Floret Majo & sequ.

Pharm. ANSERINÆ Herba.

b. *Foliis digitatis.*

394. POTENTILLA, *argentea*, foliis quinatis cuneiformibus incisus subtus tomentosis, caule erecto. *Linn.* *Spec.* 712. (*Hall.* 1124.)

H. in collibus siccis, ubique frequens. Floret Junio, Julio.

395. POTENTILLA, *verna*, foliis radicalibus quinatis acute serratis retusis, caulinis ternatis, caule declinato. *Linn.* *Spec.* 712 (*Hall.* 1119.)

H. in

H. in collibus apricis ficcis passim. Floret Aprili. Majo, & Septbr.

396. *POTENTILLA*, *reptans*, foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. *Linn. S. N. 351. Spec. 714. (Hall. 1118.)*

H. ad versuras & margines hortorum *im Fischveyberggrund; in der Altbach*; alibique frequens. Floret Julio.

Pharm. PENTAPHYLLI Radix, Herba.

GEUM. G. P. 636.

Cal. 10-fidus. Petala 5. Sem. arista geniculata. S. N. 352.

397. *GEUM*, *urbanum*, floribus erectis, fructibus globosis villosis: aristis uncinatis nudis, foliis lyratis. *Linn. S. N. 352. Spec. 716. (Hall. 1130.)*

H. in umbrosis ad sepes ubique. Floret Junio.

Pharm. CARYOPHYLLATAE Radix.

Receptaculum ovatum, subsessile.

398. *GEUM*, *rivale*, floribus nutantibus, fructu oblongo: aristis plumosis. *Linn. Spec. 717. (Hall. 1129.)*

H. in pratis humentibus ad pagos *Rehe, & Langenbach*. Floret Majo & sequ.

Receptaculum oblongum, pedunculatum. Floribus ex latere proferis saepe nudis.

COMARUM. G. P. 638.

Cal. 10-fidus. Petala 5, calyce minora. Receptaculum seminum ovatum, spongiosum persistens. S. N. 353.

399. *COMARUM*, *palustre*. *Linn. Spec. 718. (Fragaria. Hall. 1128.)*

H. in paludosis ad pagum *Sinn*. Floret Junio, Julio.

Planta hac in hortum translata, solo tam sicco quam humido, Caulibus viget suffrutescens, perennantibus. Radice valde invariante.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

A. MONOGYNIA.

* *Flores tetrapetali.*

PAPAVER. G. P. 648.

Cor. 4-petala. *Cal.* 2-phyllus. *Capsula* 1-lo-
cularis, sub stigmatate persistente poris de-
hiscens. S. N. 360.

a. *Capsulis hispidis.*

400. PAPAVER, *Argemone*, capsulis clavatis hispidis,
caule folioso multifloro. *Linn. Spec.* 725.
(*Hall.* 1061. p. 15. no. 1.)

H. inter segetes *am Dollberg*, alibique. Floret Junio, Julio.

b. *Capsulis glabris.*

401. PAPAVER, *Rheas*, capsulis glabris globosis,
caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis in-
cisis. *Linn. Spec.* 726. (*Hall.* 1064.)

H. inter segetes passim. Floret Junio, Julio.

Pharm. PAPAVERIS ERRATICI s. RHOEADIS Flores.

402. PAPAVER, *dubium*, capsulis oblongis glabris,
caule multifloro setis adpressis, foliis pinnati-
fidis incis. *Linn. Spec.* 726. (*Hall.* 1063. p. 15.
no. 3.)

H. inter segetes *am Dollberg*, alibique frequens. Floret Junio,
Julio.

403. PAPAVER, *somniferum*, calycibus capsulisque
glabris, foliis amplexicaulibus incis. *Linn.*
Spec. 726. (*Hall.* 1065.)


H. in cultis *auf dem Hinterland*; *in der Pitze*, alibique quasi in-
digena rarius. Floret Junio.

Pharm. PAPAVERIS ALBI & NIGRI Capita, Semina.

CHELIDONIUM. G. P. 647.

Cor. 4-petala. *Cal.* 2-phyllus. *Siliqua* 1-lo-
cularis, linearis. S. N. 359.

404. CHELIDONIUM, *majus*, pedunculis umbellatis.
Linn. Spec. 723. (Hall. 1059.)

H.  sepes hortorum passim. Floret Junio & sequ.

Pharm. CHELIDONII MAJORIS Radix.

ACTÆA. G. P. 644.

Cor. 4-petala. Cal. 4-phyllus. Bacca unilocularis. Semina semiorbiculata. S. N. 359.

405. ACTÆA, *spicata*, racemo ovato, fructibus baccatis. *Linn. Spec. 722. (Hall. 1076.)*

H. in nemorosis ad *Erbach*; in dumetis *am Beilstein*; *am Homberg*, *unter der Lithau* frequens. Floret Majo, Junio.

Pharm. CHRISTOPHORIANÆ Radix, Herba.

*** Flores pentapetali.

CISTUS. G. P. 673.

Cor. 5-petala. Cal. 5-phyllus: foliolis duobus minoribus. Capsula. S. N. 366.

406. CISTUS, *Helianthemum*, suffruticosus procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis revolutis subpilosis. *Linn. Spec. 744. (Hall. 1033.)*

H. in pascuis sylvaticis siccis, *am Homberg*, *Rehberg*, alibique vulgaris. Floret Junio, Julio.

TILIA. G. P. 660.

Cor. 5-petala. Cal. 5-partitus. Bacca sicca, globosa, 5-locularis, 5-valvis, basi dehiscens. S. N. 363.

407. TILIA, *europæa*, floribus nectario destitutis.
Linn. Spec. 733. (Hall. 1030.)

H. in sylvis, & culta circa urbem frequens. Floret Junio, Julio.

Pharm. TILIAE Flores.

- Germen 5-loculare. Capsula *turbinato-globosa*, 5-sarinata, unilocularis: Semine unico, reliquis quatuor semper abortientibus.

*** Flores polypetali.

NYMPHÆA. G. P. 653.

Cor. polypetala. Cal. 4-f. 5-phyllus. Bacca multilocularis, truncata. S. N. 361.

408. NYMPHÆA, *lutea*, foliis cordatis integerrimis, calyce pentaphyllo majore. *Linn. S. N. 361. Spec. 729. (Hall. 1066.)*

H. in

H. in piscinis ad *Emmerichenbayn* rarius. Floret Junio, Julio. ✕
 409. NYMPHÆA, *alba*, foliis cordatis integerrimis,
 calyce quadrifido. *Linn. Spec.* 729. (Hall.
 1067.)

H. in piscinis ad *Driedorf*, alibique infrequens. Floret
 Junio.

Pharm. NYMPHÆAE ALBAE Radix, Flores.

B. TRIGYNIA.

DELPHINIUM, G. P. 681.

Cal. o. *Petala* 5. *Nectarium* bifidum, postice
 cornutum. *Siliquæ* 3. f. 1. S. N. 370.

410. DELPHINIUM, *Consolida*, nectariis monophyl-
 lis, caule subdiviso. *Linn. Spec.* 748. (Hall.
 1203.)

H. inter segetes frequens. Floret Junio, Julio.

Pharm. CONSOLIDAE REGALIS Flores.

411. DELPHINIUM, *Ajaxis*, nectariis monophyllis,
 caule simplici. *Linn. Spec.* 748. (Hall. 1202.)

H. in cultis quasi indigena, bey der *obern Walckmühle* frequens.
 Floret Julio.

ACONITUM, G. P. 682.

Cal. nullus. *Petala* 5: supremo fornicato.
Nectaria 2, pedunculata, recurva. *Sili-
 quæ* 3. f. 5. S. N. 371.

412. ACONITUM, *Napellus*, foliorum laciniis linea-
 ribus superne latioribus linea exaratis. *Linn.
 Spec.* 751. (Hall. 1197.)

H. in sylvaticis & pratis ficcis bey *Langenau*; ad pagum
Sinn frequens; im *Rosenwäldgen* rarius. Floret Julio.
 Augusto.

Nectaria sex minora linearia acuta, Stamina cingentia: quorum
 duo superiora apice bifida.

C. PENTAGYNIA.

AQVILEGIA, G. P. 684.

Cal. o. *Petala* 5. *Nectaria* 5, corniculata,
 inter petala. *Capsule* 5, distinctæ. S. N.
 372.

413. *AQVILEGIA*, *vulgaris*, *nectariis incurvis*. *Linn. Spec.* 752. (*Hall.* 1195.)

H. in pomariis *am Homberg*; alibique frequens. Floret Junio.
Pharm. *AQVILEGIAE* Flores, Semina.

D. POLYGYNIA.

CLEMATIS. G. P. 696.

Cal. o. *Petala* 4, rarius 5. *Semina* caudata.
 S. N. 376.

414. *CLEMATIS*, *Vitalba*, foliis pinnatis : foliolis cordatis scandentibus. *Linn. Spec.* 766. (*Hall.* 1142.)

H. in dumetis ad viam publicam, *am Beckshayn*. Floret Julio.

Foliolis integris, & subdentatis ludit.

THALICTRUM. G. P. 697.

Cor. o. *Petala* 4 - f. 5. *Semina* ecaudata.
 S. N. 377.

415. *THALICTRUM*, *flavum*, caule folioso fulcato, panicula multiplici erecta. *Linn. Spec.* 770. (*Hall.* 1138.)

H. in pratis ad pagos *Breitscheid*, *Roth*, & *Langenaubach* frequens. Floret Julio.

Pharm. *THALICTRI* Radix.

CALTHA. G. P. 703.

Cal. o. *Petala* 5. *Nectaria* o. *Capsulae* plures polyspermæ. S. N. 381.

416. *CALTHA*, *palustris*. *Linn. Spec.* 784. (*Hall.* 1188.)

H. in pratis humentibus passim. Floret Majo.

ANEMONE. G. P. 694.

Cal. o. *Petala* 6 - 9. *Semina* plura. S. N. 374.

a. *Hepatica*, *Flora subcalyculato*.

417. *ANEMONE*, *Hepatica*, foliis trilobis integerrimis. *Linn. Spec.* 758. (*Hepatica.* *Hall.* 1156.)

H. in nemorosis ad *Erbach* rarius. Floret Martio, Aprili.

Pharm. *HEPATICA* NOBILIS Herba, Flores,

b. *Anem.*

b. *Anemonoidea flore nudo, seminibus caudatis.*

418. ANEMONE, *memorosa*, seminibus acutis, foliolis incis, caule unifloro. *Linn. Spec.* 762. (*Hall.* 1154.)

H. in sylvaticis montosis *am Homberg; Rehberg; & alibi copiose.* Floret Aprili, Majo.

Pharm. RANUNCULI ALBI Flores.

419. ANEMONE, *ranunculoides*, seminibus acutis, foliolis incis, petalis (5) subrotundis, caule subbifloro. *Linn. Spec.* 762. (*Hall.* 1153.)

H. in nemorosis ad pagum *Erbach* frequens. Floret Majo, Junio.

TROLLIUS. G. P. 700.

Cal. o. *Petala* circiter 14. *Capsulae* plurimae, ovatae, monospermae. S. N. 380.

420. TROLLIUS, *europaeus*, corollis conniventibus, nectariis longitudine staminum. *Linn. Spec.* 782. (*Hall.* 1189.)

H. in pratis humidiusculis, ad *Erbach; Gundersdorff; alibi que copiose.* Floret Junio.

Capsulae carinatae, erectae, introrsum sutura dehiscentes: Seminibus in nostrata (cultis) semper quatuor, ovatis, fuscis, nitidis, sutura affixis.

RANUNCULUS. G. P. 699.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5 intra ungues poro mellifero. *Semina* nuda. S. N. 378.

a. *Foliis simplicibus.*

421. RANUNCULUS, *Flammula*, foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. *Linn. Spec.* 772. (*Hall.* 1182.)

H. juxta rivulos in pratis udis, *hinter dem Homberg; alibi que vulgaris.* Floret Junio, Julio.

422. RANUNCULUS, *Ficaria*, foliis cordatis angulatis petiolatis, caule unifloro. *Linn. S. N.* 378. *Spec.* 774. (*Ficaria.* *Hall.* 1160.)

H. in pomariis & cultis passim. Floret Aprili, Majo.

Pharm. CHELIDONII MINORIS Radix, Herba.

b. *Foliis dissectis & divisis.*

423. RANUNCULUS, *auricomus*, foliis radicalibus reniformibus crenatis incis, caulinis digitatis lineari-

nearibus, caule multifloro. *Linn. Spec. 775.*
(*Hall. 1177.*)

H. in pomariis & pratis sylvaticis frequens. Floret Aprili & sequ.

Hujus Flores vernaes (Aprili) apetalis; seriores (Majo) uno alterove Petalo, demum (Junio) Petalis quinque instructi, observantur.

424. *RANUNCULUS, sceleratus*, foliis inferioribus palmatis; summis digitatis, fructibus oblongis. *Linn. Spec. 776. (Hall. 1175.)*

H. in aquis stagnantibus theriotrophei rarius; in fossis ad *Heyer* frequens. Floret Majo, Junio.

425. *RANUNCULUS, bulbosus*, calycibus retroflexis, pedunculis fulcatis, caule erecto multifloro, foliis compositis. *Linn. S. N. 379. Spec. 778. (Hall. 1174.)*

H. in vascuis pomariis & pratis ubique. Floret Majo, Junio.
Locis fecioribus & sterilioribus, Radice semper bulbosa; in humen-
tibus & pinguioribus, tota fibrosa reperitur. Calyce retroflexo,
& stolonum repentium defectu, a RAN. repente; Pedunculis
fulcatis a RAN. acris dignoscendus.

426. *RANUNCULUS, repens*, calycibus patulis, pedunculis fulcatis, stolonibus repentibus, foliis compositis. *Linn. S. N. 379. Spec. 779. (Hall. 1173.)*

H. in cultis, pomariis, secus vias, ubique. Floret Majo, Junio.

427. *RANUNCULUS, polyanthemus*, calycibus patulis, pedunculis fulcatis, caule erecto, foliis multipartitis. *Linn. Spec. 779? (Hall. 1171.)*

H. in pratis humentibus ad pagum *Gundersdorf* parcius. Floret Junio.

Caule glabro, altiori, ramosiori, multifloro; Foliis magis ad petiolum usque divisis, glabrioribus, acutius dentatis; Pedunculis substriatis, a sequente noster vix differt.

428. *RANUNCULUS, acris*, calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis: summis linearibus. *Linn. Spec. 779. (Hall. 1169.)*

H. in pratis & pomariis abunde. Floret Majo, Junio.

Pharm. RANUNCULI Herba.

429. *RANUNCULUS, lanuginosus*, calycibus patulis, pedun-

pedunculis teretibus, caule petiolisque hirsutis, foliis trifidis lobatis crenatis holosericeis. *Linn. S. N. 379. Spec. 779. (Hall. 1172.)*

H. *sylvaticis montosis am Homberg über der Lithau rarius; in nemorosis ad Breitscheid & Langenbach frequens Floret Majo, Junio.*

430. *RANUNCULUS, arvensis*, seminibus aculeatis, foliis superioribus decompositis linearibus. *Linn. Spec. 780. (Hall. 1176.)*

H. in arvis & agris, inter segetes frequens. Floret Majo, Junio.

431. *RANUNCULUS, bederaceus*, foliis subrotundis trilobis integerrimis, caule repente. *Linn. Spec. 781.*

H. in aquis stagnantibus bey der untern Walchmühle copiose. Floret Junio, & sequ.

Caulis repens ramosissimus, teres, glaber, fibras simplices ex foliorum emittens alis. Folia infima longissime petiolata, reniformia, glabra, semiquinqueloba; superiora triloba; lobis obtusissimis; pagina superiore macula purpureo-fusca notata. Stipulae dua oblonga ad basin singuli petioli. Pedunculi oppositifolii, teretes, crassi, (respectu floris) uniflori. Flos exiguus. Calyx patens. Perala obovata, alba, ungue flavo, poro nectarifero uti in sequente. Stamina 5. 6. f. 8. Fructus subglobosus, maturo semine nutans. Semina obtusissima, fusca. Odor totius plantae Moschi, Adoxae similis.

432. *RANUNCULUS, aquatilis*, foliis submersis capillaceis, emerfis peltatis. *Linn. S. N. 380. Spec. 781.*

α. *Ranunculus aquaticus folio rotundo & capillaceo. Bauh. Pin. 180. (Hall. 1163.)*

β. *Ranunculus foliis omnibus capillaceis circumscriptione rotundis. Linn. H. Cliff. 231. (Hall. 1162.)*

γ. *Ranunculus foliis omnibus capillaceis circumscriptione oblongis. Roy. Lugdb. 492. (Hall. 1161.)*

H. α, in stagnis auf der Sandvviese; β, & γ, in der Dille & Mühlbach copiose. Floret Majo & sequ.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

A. GYMNOSPERMIA.

* *Calyces subquinquefidi.*

LEONURUS. G. P. 722.

Antheræ punctis nitidis adspersæ. S. N. 396.

433. LEONURUS, *Cardiaca*, foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Linn. Spec.* 817. (*Cardiaca. Hall.* 274.)

H. in ruderatis, ad sepes frequens. Floret Junio.

Pharm. CARDIACÆ Herba.

GLECOMA. G. P. 714.

Antherarum singulum par in formam crucis connivens. Cal. 5-fidus. S. N. 393.

434. GLECOMA, *hederacea*, foliis reniformibus crenatis. *Linn. Spec.* 807. (*Chamaeclema. Hall.* 245.)

H. in pomariis, ad sepes passim. Floret Aprili, Majo.

Pharm. HEDERÆ TERRESTRIS. Herba.

MENTHA. G. P. 713.

Cor. subæqualis, 4-fida: lacinia latiore emarginata. Stamina erecta, distantia. S. N. 391.

a. *Spicata.*

435. MENTHA, *sylvestris*, spicis oblongis, foliis oblongis tomentosis serratis sessilibus, staminibus corolla longioribus. *Linn. Spec.* 804. (*Hall.* 227.)

H. in pratis udis, juxta rivulos imFischvveyher-Grand frequens. Floret Julio, Augusto.

b. *Capitata.*

436. MENTHA, *hirsuta*, floribus capitatis, foliis ovatis serratis subsessilibus pubescentibus, staminibus corolla longioribus. *Linn. S. N.* 392. *Mantiss.* 81. (*Hall.* 225. β.)

H. in

H. in aquosis & inundatis *an der Mühlbach*; ad ripas *Dilla am steinern Waag* frequens. Floret Augusto, Septembri.

437. MENTHA, *aquatica*, floribus capitatis, foliis ovaris ferratis petiolatis, staminibus corolla longioribus. *Linn. S. N. 392. Spec. 805. (Hall. 225. a.)*

H. similibus in locis cum præcedente copiosissime. Floret Augusto, Sept.

c. *Verticillata.*

438. MENTHA, *gentilis*, floribus verticillatis, foliis ovaris acutis ferratis, staminibus corolla brevioribus. *Linn. Spec. 805.*

H. in fossis *an der Dille und Mühlbach* rarius. Floret Augusto.

439. MENTHA, *arvensis*, floribus verticillatis, foliis ovaris acutis ferratis, staminibus corollam æquantibus. *Linn. Spec. 806. (Hall. 223.)*

H. in agris post messem copiosissime. Floret Julio, Augusto. *Pharm. MENTHÆ SYLVESTRIS Herba.*

TEUCRIUM. G. P. 706.

Corollæ labium superius (nullum) ultra basin 2-partitum, divaricatum ubi stamina, S. N. 387.

440. TEUCRIUM, *Botrys*, foliis multifidis, floribus lateralibus ternis peduncularis. *Linn. S. N. 387. Spec. 786. (Chamædrys. Hall. 289.)*

H. in arvis *am Dollberg* frequens; *auf dem Homberg* alibique rarius. Floret Julio.

441. TEUCRIUM, *Scorodonia*, foliis cordatis ferratis petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto. *Linn. Spec. 789. (Hall. 287.)*

H. in montosis sylvaticis *am Homberg über der Lishau*; *am Rehberg*; *Galgenberg*; *im Beilstein* frequens. Floret Julio.

442. TEUCRIUM, *Chamædrys*, foliis cuneiformi-ovatis incisfis crenatis petiolatis, floribus ternis, caulibus procumbentibus subpilosis. *Linn. S. N. 388. Spec. 790. (Hall. 286.)*

H. in montosis apricis *am Galgenberg*. Floret Julio. †.

Ipse plantam hanc nondum legi.

Pharm. CHAMÆDRYS Herba.

AJUGA. G. P. 705.

Corollæ labium superius minimum. *Stamina* labio superiore longiora. S. N. 387.

443. AJUGA, *pyramidalis*, tetragono - pyramidalis villosa, foliis radicalibus maximis. Linn. S. N. 387. Spec. 785. ? (*Bugula*. Hall. 283. α.)

H. in arvis & campis ficcis apricis am *Homburg*, alibique vulgaris. Floret Majo, Junio.

Caulis simplex, palmaris, sensim pedalis, erectus, villosus. Folia caulina inferiora reliquis majora, petiolata, ovato - oblonga, repando - crenata. Bractæ decussata, subtriloba, seu angulato - dentata, inferiores virides, superiores violaceæ, villosæ. Flores utrinque 5. Calyx villosus, violaceus. Corolla saurrate cœrulea.

444. AJUGA, *alpina*, caule simplici, foliis caulinis radicalia æquantibus. Linn. S. N. 387. Mantiss. 80? (Hall. 283? β.)

H. in montosis ficcis am *Galgen- und Rehberg*, rarius. Floret Junio.

Caulis spithameus, villosissimus. Folia caulina inferiora oblonga, lineata, crenato - dentata, subsessilia, villosa, reliquis minora. Bractæ ovata, crenulata, villosa, non colorata. Floribus utrinque 5, inque reliquis ab antecedente vix differt, cujus forte varietas est.

445. AJUGA, *genevensis*, foliis tomentosis lineatis, calycibus hirsutis. Linn. S. N. 387. Spec. 785.

H. in arvis sterilibus am *Homburg* & *Reuterberg* rarius; jam dudum lecta, nunc rarissima planta. Floret Junio.

Caulis semipedalis, simplex. Folia cuneiformi - oblonga, dentata, villosa, lineata, inferiora reliquis minora. Bractæ remotiores, ovata, dentata, superiores fusco - purpureæ. Flores utrinque tres. Calyx villosus, purpurascens. Corolla incarnata, tubo longissimo, tenui.

446. AJUGA, *reptans*, glabra, stolonibus reptantibus. Linn. S. N. 387. Spec. 785. (*Bugula*. Hall. 282.)

H. in pratis & pomariis passim. Floret Majo.

Pharm. CONSOLIDAB MEDIAS Herba.

BETONICA. G. P. 718.

Cal. aristatus. *Corollæ* labium superius adscendens, planiusculum; tubus cylindricus. S. N. 394.

447. *BETONICA*, *officinalis*, spica interrupta, corollarum labii lacinia intermedia emarginata. *Linn. Spec.* 810. (*Hall.* 264.)

H. in sylvaticis am *Homburg*, alibique vulgaris. Floret Julio.
Pharm. *BETONICAE* Herba, Flores.

LAMIUM. G. P. 716.

Corollae labium superius integrum fornicatum; labium inferius 2 lobum; faux utrinque margine dentata. S. N. 393.

448. *LAMIUM*, *maculatum*, foliis cordatis acuminatis, verticillis decemfloris. *Linn. Spec.* 809. (*Hall.* 270? a.)

H. ad sepes in pomariis passim. Floret Majo, Junio.

Differt a sequente: Foliis latioribus, obscure-viridibus, primo vere autumnoque albedo-maculatis; ferrato-dentatis: dentibus duplo paucioribus, acutioribus, superioribus profundius incisus, per paria remotioribus; Floribus in singulo Verticillo 10, nec-20. Calyce incurvo, nulla macula fusca ad basin notato: dentibus inequalibus, triangularibus, aristatis, pilosis, superiore reliquis majore. Corolla purpurea: Galea crenulata; Labio albedo, venis sanguineis undulatis picto.

449. *LAMIUM*, *album*, foliis cordatis acuminatis ferratis petiolatis, verticillis vigintifloris. *Linn. S. N.* 393. *Spec.* 809. (*Hall.* 271.)

H. in cultis & pomariis ad sepes passim. Floret Majo & seq.

Pharm. *LAMI ALBI* f. *GALEOPSIS* Flores.

450. *LAMIUM*, *purpureum*, foliis cordatis obtusis petiolatis. *Linn. Spec.* 809. (*Hall.* 272.)

H. in agris & cultis ubique. Floret Aprili & seq.

451. *LAMIUM*, *amplexicaule*, foliis floralibus sessilibus amplexicaulibus obtusis. *Linn. Spec.* 809. (*Hall.* 273.)

α. Corollis non explicatis, galeis purpureis holosericeis.

β. Corollis perfectis, tubo longissimo.

H. α, in cultis primo vere passim; β in arvis & agris *auf dem hinter Stahl*, alibique frequens. Floret serius Junio, Julio.

GALEOPSIS. G. P. 717.

Corollae labium superius subcrenatum, for-
 nica-

nicatum; labium inferius supra 2 - dentatum. S. N. 393.

452. GALEOPSIS, *ladanum*, internodiis caulinis æqualibus: verticillis omnibus remotis, calycibus inertibus. Linn. S. N. 393. Spec. 810. (Hall. 266.)

H. in agris arenosis, inter segetes passim. Floret Julio & seq.

453. GALEOPSIS, *dubia*, foliis rhomboideis ferratis sericeis, verticillis diffitis. Hall. 267 add. 183.

Var. grandiflora γ. Galeopsis *Tetrahit*, LINN. Flor. Suec. edit. II. 523.

H. in arenosis sterilibus auf der Sandviese, alibique rarius. Floret Julio.

Internodia ramorumque basis incrassata. Folia ovato-lanceolata, pubescentia, molia, subserrata. Verticilli remoti, densi, subtomentosi. Calyx setis capitatis flavis adpersus: laciniis subæqualibus, setaceis, brevibus. Corollæ Tubus cylindricus, calyce quadruplo longior. Faux inflata, sulcata. Galea fornicata, pubescens; apice subbifido, crenulato, reflexo. Labium maximum: Denticulis eminentibus incrassatis; Laciniis crenulatis; lateralibus quadratis, intermedia duplo latiore emarginata. Colore albido, flavo, purpureoque pulcherrime ludit. Internodiis incrassatis, a precedente, Calycibus non aristatis verticillisque remotis a sequente differt. In hortum introducta, per plures annos faciem non mutavit.

454. GALEOPSIS, *Tetrahit*, internodiis caulinis fuperne incrassatis, verticillis summis subcontiguus, calycibus pungentibus. Linn. S. N. 393. Spec. 810. (Hall. 268.)

H. in agris & cultis, ad sepes passim. Floret Julio & sequ.

455. GALEOPSIS, *Galeobdolon*, verticillis sexfloris: involucro tetraphyllo. Linn. Spec. 810. (Cardiaca. Hall. 275.)

H. in sylvaticis umbrosis am Homberg; ad sepes am Heiligen-Floß; in cultis am Sieghaus rarius. Floret Majo & sequ.

Caulis repens, florens erectus. Folia hyeme albido-maculata.

STACHYS. G. P. 719.

Corollæ labium superius fornicatum; labium inferius lateribus reflexum: intermedia

maiore emarginata. *Stamina* deflorata versus latera reflexa. S. N. 394.

456. STACHYS, *sylvatica*, verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis. *Linn. Spec.* 811. (*Cardiaca. Hall.* 276.)

H. in umbrosis, ad sepes passim. Floret Junio & sequ.

457. STACHYS, *palustris*, verticillis sexfloris, foliis lineari-lanceolatis semiamplexicaulibus. *Linn. Spec.* 811. (*Stachys. Hall.* 257.)

H. ad fossas; in agris & cultis vitium pessimum. Floret Junio, Julio.

458. STACHYS, *alpina*, verticillis multifloris, foliorum ferraturis apice cartilagineis, corollis labio plano. *Linn. Spec.* 812. (*Hall.* 256.)

H. in montosis asperis ad pagos *Schönbach*; *Breitscheid*; & alibi non infrequens. Floret Julio, Augusto.

- 459 STACHYS, *germanica*, verticillis multifloris, foliorum ferraturis imbricatis, caule lanato. *Linn. Spec.* 812. (*Hall.* 255.)

H. in montosis asperis bey dem *Eulenhause*; auf dem *Stützelberg*; am *Beilstein* frequens. Floret Julio & sequ.

460. STACHYS, *annua*, verticillis sexfloris, foliis ovato-lanceolatis trinerviis lævibus petiolatis, caule erecto. *Linn. S. N.* 395. *Spec.* 813. (*Betonica. Hall.* 263.)

H. in agris & arvis am *Dollberg* frequens; alibique rarius. Floret Julio, Augusto.

461. STACHYS, *arvensis*, verticillis sexfloris, foliis obtusis nudiusculis, corollis longitudine calycis, caule debili. *Linn. S. N.* 395. *Spec.* 814. (*Trixago. Hall.* 231.)

H. in cultis am *Homberg* & *Dollberg* frequens; auf dem *Schießplatz* rarius. Floret Julio, Augusto.

NEPETA. G. P. 710.

Cor. labium inferius lacinula intermedia crenata: faux margine reflexo. *Stamina* approximata. S. N. 390.

462. NEPETA, *Cataria*, floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-

tato - ferratis. *Linn. Spec.* 796. (*Cataria Hall.* 246.)

H. in ruderatis & ad sepes hortorum ; *am Sieghausß* frequens. Floret Julio, Augusto.

Pharm. NEPETHÆ Herba.

SATUREGIA. G. P. 707.

Corollæ laciniaë subæquales. *Stamina* distantia. S. N. 389.

463. SATUREGIA, *bortensis*, pedunculis bifloris. *Linn. Spec.* 795.

H. in cultis *auf dem Hinterland* ; *am Sieghausß*, alibique quasi indigena rarius. Floret Julio, Augusto.

BALLOTA. G. P. 720.

Cal. hypocrateriformis, 5-dentatus, 10-striatus. *Corollæ* labium superius crenatum, concavum. S. N. 395.

464. BALLOTA, *nigra*, foliis cordatis indivisis ferratis, calycibus acuminatis. *Linn. Spec.* 814. (*Ballote. Hall.* 259.)

H. ad sepes *auf dem Schießplatz* alibique frequens. Floret Julio, Augusto.

MARRUBIUM. G. P. 721.

Cal. hypocrateriformis, rigidus, 10-striatus. *Corollæ* lab. super. 2-fidum lineare rectum. S. N. 395.

465. MARRUBIUM, *vulgare*, 5-entibus calycinis setaceis uncinatis. *Linn. Spec.* 816. (*Hall.* 258.)

H. in montosis asperis duris Theribtrophei ; Seminibus hinc inde per uie dispersis, *auf dem Schießplatz* copiose. Floret Julio, Augusto.

Pharm. MARRUBII ALBI Herba.

** *Calyces bilabiati.*

SCUTELLARIA. G. P. 734.

Calyx ore integro : post florescentiam clauso, operculato. S. N. 403.

466. SCUTELLARIA, *galericulata*, foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus. *Linn. Spec.* 835. (*Cassida. Hall.* 280.)

H. ad fossas & ripas *Dilla*; *an der Mühlbach*; alibique frequens. Floret Julio, Augusto.

THYMUS. G. P. 727.

Calycis bilabiati faux villis clausa. S. N. 399.

467. THYMUS, *Serpyllum*, floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis. *Linn. S. N. 399. Spec. 825. (Hall. 235.)*

α. *Serpyllum vulgare majus*; & minus. *Bauh. Pin. 220.*

β. *Serpyllum vulgare minus capitulis lanuginosis.* *Tourn. inst. 197.*

H. α, in collibus siccis passim; β, in sterilibus editioribus vento boreali expositis, *am Dollberg & Stützelberg* infrequens. Floret Julio, Augusto.

Pharm. α, SERPYLLI Herba, Flores.

468. THYMUS, *Acinos*, floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis subramosis, foliis acutis serratis. *Linn. S. N. 399. Spec. 826. (Clinopodium. Hall. 237.)*

H. in collibus siccis *am Homberg, Dollberg, & alibi* frequens. Floret Julio, Augusto.

Labii lacinia intermedia emarginata.

PRUNELLA. G. P. 735.

Filamenta bifurca: altero apice antherifera.
Stigma bifidum. S. N. 404.

469. PRUNELLA, *vulgaris*, foliis omnibus ovato-oblongis petiolatis. *Linn. Spec. 837. (Brunella. Hall. 277.)*

β. Foliis integerrimis, spicis majoribus, bracteis non coloratis, corollis albis.

H. α, in pratis, pomariis & pascuis passim; β, in asperis sylvaticis *in der Hölle* frequens; *auf dem Homberg* rarius. Floret Julio, Augusto.

Pharm. α, PRUNELLÆ Herba.

470. PRUNELLA, *laciniata*, foliis ovato-oblongis petiolatis: supremis quatuor lanceolatis dentatis. *Linn. Spec. 837. (Hall. 279.)*

H. in sylvaticis montosis *am Beilstein*; *am Güldners-Grund*; *am Homberg* parcius. Floret Julio, Augusto.

Exceptis foliis supremis, omnibus in partibus cum precedente convenit, cujus varietas est.

ORIGA-

ORIGANUM. G. P. 726.

Strobilus tetragonus, spicatus, calyces colligens. S. N. 399.

471. ORIGANUM, *vulgare*, spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. *Linn. Spec.* 824. (*Hall.* 233.)

H. in sylvaticis montosis *am Homberg*; *Rehberg*, & *Dollberg* copiose. Floret Julio, Augusto.

Pharm. ORIGANI VULGARIS Herba.

CLINOPODIUM. G. P. 725.

Involucrum multifetum, verticillo subjectum. S. N. 398.

472. CLINOPODIUM, *vulgare*, capitulis subrotundis hispidis, bracteis setaceis. *Linn. Spec.* 821. (*Hall.* 239.)

H. montosis sylvaticis *am Homberg*; *Beilstein*, alibique frequens. Floret Julio, Augusto.

B. ANGIOSPERMIA.

* *Calyces bifidi.*

OROBANCHE. G. P. 779.

Cal. 2-fidus. *Cor.* ringens. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, polysperma. *Glandula* sub basi germinis. S. N. 422.

473. OROBANCHE, *major*, caule simplicissimo pubescente, staminibus subexsertis. *Linn. Spec.* 882. (*Hall.* 295.)

H. in pratis & agris sterilibus *im Ebersbacher Grund*. Plantam ipse nondum legi, ab rustico mihi adlatam tantum vidi. Floret Junio.

** *Calyces quadrifidi.*

LATHRÆA. G. P. 743.

Cal. 4-fidus. *Glandula* depresso, ad basin futuræ germinis. *Capsula* 1-locularis. S. N. 406.

474. LATHRÆA, *Squamaria*, caule simplicissimo, corollis pendulis: labio inferiore trifido. *Linn. Spec.* 844. (*Squamaria.* *Hall.* 297.)

H. in nemorosis umbrosissimis *im Hirschberg* parcius. Floret Majo. †.

EUPHRASIA. G. P. 741.

Cal. 4-fidus, cylindricus. Caps. 2-locularis, ovato-oblonga. Antheræ inferiores altero lobo basi spinosæ. S. N. 405.

475. EUPHRASIA, *officinalis*, foliis ovatis lineatis argute dentatis. *Linn. Spec. 841. (Hall. 303.)*

H. in pascuis sterilibus, pratis & pomariis passim. Floret Julio.

Pharm. EUPHRASIE Herba.

Inferiorum Antherarum infimus lobus tantum apice spinula terminatus.

476. EUPHRASIA, *Odontites*, foliis linearibus omnibus ferratis. *Linn. Spec. 841. (Odontites. Hall. 304.)*

H. in agris sterilibus *bey dem Kalckofen* copiose; locis humentibus *an der Mühlbach, bey der untern Walckmühle* frequens. Floret Julio, Augusto.

Corolla a priori diversissima: Galea compressa, vix emarginata. Labii inferiores tres lobi Galea breviores, aequales, truncati, crenulati. Lobi Antherarum omnes apice spinosi, basi barbati.

RHINANTHUS. G. P. 740.

Cal. 4-fidus, ventricosus. Capsula 2-locularis, obtusa, compressa. S. N. 405.

477. RHINANTHUS, *Crista galli*, corollis labio superiore compresso brevior. *Linn. S. N. 405. Spec 840.*

α. Alektorolophus calycibus glabris. HALL. 313.

β. Alektorolophus calycibus hirsutis. HALL. 314.

H. α. in pratis siccis passim; β. caule altiori magis diviso, calycibus pubescentibus, corollarum rostris violaceis: in pratis humentibus *auf der Ahr*, & alibi frequens. Floret

α. Majo. β. Junio.

MELAMPYRUM. G. P. 742.

Cal. 4-fidus. Corollæ lab. super. compressum, margine replicato. Caps. 2-locularis obliqua, hinc dehiscens. Semina 2, gibba. S. N. 406.

478.

478. MELAMPYRUM, *cristatum*, spicis quadrangularibus: bracteis cordatis compactis denticulatis imbricatis. *Linn. Spec.* 842. (*Hall.* 311.)

H. in pratis & pascuis fideis *am Homberg über der Lithau; am Rehberg; am Stützberg* frequens. Floret Julio.

479. MELAMPYRUM, *arvense*, spicis conicis laxis: bracteis dentato-setaceis coloratis. *Linn. Spec.* 842. (*Hall.* 310.)

H. in agris inter segetes passim. Floret Junio, Julio.

480. MELAMPYRUM, *pratense*, floribus secundis lateralibus, foliorum conjugationibus remotis, corollis clausis. *Linn. S. N.* 406. *Spec.* 843. (*Hall.* 309.)

H. in pratis sylvaticis *am Homberg* frequens. Floret Junio, Julio.

481. MELAMPYRUM, *sylvaticum*, floribus secundis lateralibus, foliorum conjugationibus remotis, corollis hiantibus. *Linn. S. N.* 406. *Spec.* 843. (*Hall.* 307.)

H. in sylvaticis montosis *auf der Steinseite* rarius. Floret Junio, Julio. †

... Calyces quinquesidi.

LIMOSELLA. G. P. 776.

Cal. 5-fidus. *Cor.* 5-fida, æqualis. *Stamina* per paria approximata. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, polysperma. *S. N.* 421.

482. LIMOSELLA, *aquatica*. *Linn. Spec.* 881. (*Hall.* 300.)

H. in aquis stagnantibus *bey der untern Walckmühle*; ad viam publicam *in der untern Pitze*; in rivulis *auf der Herrnviese, unter dem Bockshayn*, alternis annis plus minusve frequens. Floret Julio, Augusto.

SCROPHULARIA. G. P. 756.

Cal. 5-fidus. *Cor.* subglobosa, resupinata. *Capsula* 2-locularis. *S. N.* 413.

483. SCROPHULARIA, *nodosa*, foliis cordatis trinerviatis, caule obtusangulo. *Linn. S. N.* 413. *Spec.* 863. (*Hall.* 326.)

H. in fossis, ad vias *bey der Walckmühle*, & alibi passim. Floret Junio, Julio.

Pharm. SCROPHULARIAE Radix.

484.

484. SCROPHULARIA, *aquatica*, foliis cordatis obtusis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Linn. Spec. 864. (Hall. 325.)*

H. in aquosis, *an der Mühlbach* alibique frequens. Floret Julio, Augusto.

Pharm. SCROPHULARIÆ Herba.

485. SCROPHULARIA, *vernalis*, foliis cordatis, pedunculis axillaribus solitariis dichotomis. *Linn. Spec. 864. (Hall. 327.)*

H. in aquosis *am Pitzbrückgen*; ad sepes *am Sieghäuser Weg*. Floret Majo.

Planta alias non indigena, feminibus per me dispersis annuatim locis indicatis provenit.

DIGITALIS. G. P. 758.

Cal. 5 - partitus. Cor. campanulata, 5-fida, ventricosa. Caps. ovata, 2-locularis. S. N.

414.

486. DIGITALIS, *purpurea*, calycinis foliolis ovatis acutis, corollis obtusis: labio superiore integro. *Linn. Spec. 866. (Hall. 330.)*

H. in sylvaticis montosis ad *Heyer, Frohnhausen, & Burbach* copiose. Corollis albis ludit. Floret Junio, Julio.

487. DIGITALIS, *lutea*, calycinis foliolis lanceolatis, corollis acutis: labio superiore bifido. *Linn. Spec. 867.*

β. Digitalis foliis calycinis lanceolatis, galea incisa, faucibus maculosis. *HALL. 331. Digitalis ambigua, MURRAY Prodr. St. Gæst. 62.*

H. β, in sylvaticis montosis *im Thiergarten, an der Rißlerbach* rarius. Floret Junio, Julio.

Planta præcedente tenerior, subviscida; imprimis differt: Caule bipedali, subpubescente; Foliis supra glabris, subtus subpubescentibus, venis anastomosantibus nullis, margine levissimo & argute serratis; Racemo apice nutante; Bracteis angustioribus, obtusioribus; Calycinis foliolis lanceolatis; Corolla paulo minore, mollissime pubescente, pallide flava, intus pilosa fusco-maculata: Labio superiore brevissimo, obtusissimo, bifido, laciniis lateralibus inferioreque acutis; Stylo recto; Stigmate bifido, connivente; Capsulis secundis, remotis, ovato-oblongis, acuminatis, calyce duplo longioribus.

ANTIRR-

ANTIRRHINUM. G. P. 750.

Cal. 5-phyllus. *Corollæ* basis deorsum promi-
mens, nectarifera. *Caps.* 2-locularis.
S. N. 409.

488. ANTIRRHINUM, *Elatine*, foliis hastatis alternis,
caulibus procumbentibus. *Linn. Spec.* 851.
(*Hall.* 340.)

H. in arvis & agris *am Dollberg*; *auf dem Reuterberg*; in cul-
tis *am Sieghäuser Weg* frequens. Floret Julio, Augusto.

489. ANTIRRHINUM, *spurium*, foliis ovatis alternis,
caulibus procumbentibus. *Linn. Spec.* 851.
(*Hall.* 341.)

H. in arvis *am Homberg*, *Rehberg*, jam dudum lecta, nunc
visu rarior planta. Floret Junio, Julio.

490. ANTIRRHINUM, *arvense*, foliis sublinearibus:
inferioribus quaternis, calycibus piloso-visci-
dis, floribus spicatis, caule erecto. *Linn.*
Spec. 855. var. a.

H. in agris & arvis *am Dollberg* frequens; *am Homberg*, ali-
bique rarius. Floret Julio.

Radix annua. Caulis *dodrantalis* s. *pedalis*, simpliciusculus, ere-
ctus, lavis, infra spicam nudus. Folia linearia; inferiora ternā,
quaterna, variis quina; superiora sparsa, ex quorum alis sape ra-
muli steriles. Spica terminalis, floribus confertis. Bractæe li-
nearis reflexæ, longitudine floris. Calycina foliola subinaqua-
lia lanceolata, uti germinis apex pilis capitatis adspersa. Co-
rolla cœrulea, odorata: Tubus basi ventricosus, Calcaru
recurvo, bractea brevior; Laciniae duæ superiores acutius-
cula: inferiores tres aequales, brevissima, obtusa. Capsula sub-
remota, obovata, striata, apice sexvalvi dehiscens, Valvu-
lām intermediā utrinque deponentes. Semina margine mem-
branaceo cincta uti in A. *Linaria*.

491. ANTIRRHINUM, *minus*, foliis plerisque alter-
nis lanceolatis obtusis, caule ramosissimo dif-
fuso. *Linn. Spec.* 852. (*Hall.* 335.)

H. in agris & arvis *am Dollberg*, *Homberg*, *auf dem Schieß-
platz*; & alibi frequens. Floret Julio, Augusto.

492. ANTIRRHINUM, *Linaria*, foliis lanceolato-li-
nearibus confertis, caule erecto, spicis termi-
nalibus sessilibus, floribus imbricatis. *Linn.*
Spec. 858. (*Hall.* 336.)

β. PELORIA, proles hybrida. LINN. S. N. 411. Spec. 859. *Amæn. acad. l. p. 55. T. 3.*

H. α. in cultis & rudericis *auf dem Hinterland, am Sieghaus;* & alibi frequens. Floret Julio, Augusto.

β. PELORIAM Anno 1769 legi: ad versuras *auf der Weisgarber Wiese;* & copiosius *am Wasser-Graben hinter dem Bockshayn.* Floret Julio.

Pharm. α. LINARIÆ Herba.

PELORIÆ (in meis specimenibus) Radix, Caulis, Foliaque uti in A. *Linaria.* Spicae flores inferiores A. *Linaria;* duo vel tres terminali proximi, bi- seu tricalcarati; Flos terminalis PELORIA. Calyx 5-fidus, aequalis; vel duobus calycibus confluentibus 10-fidus, inaequalis. Corolla regularis, flava: Tubus ventricosus, basi in quinque cornua subulata, incurva, longitudine corolla divisus, collo cylindrico contracto; Limbus 5-fidus, laciniis aequalibus brevibus, obtusis, reflexis, tubi collo adpressis, non patulis; Palatum gibbum: eminentiis quinque tumidis, conniventibus, villosis, fulvis, intra tubum decurrentibus. ♀ Stamina 5, inaequalia, receptaculo nec tubo inserta. Antherae ovaes. Pistillum imperfectum, abortiens. In hortum introducta, insequente anno in A. *Linariam* transiit. Simillimam inetamorphosin in *Viola maritima* observavi.

493. ANTIRRHINUM, *Orontium*, corollis ecaudatis, floribus subspicatis, calycibus corolla longioribus. Linn. S. N. 411. Spec. 860. (Hall. 334.)

H. in agris & arvis *am Dollberg & Galgenberg* frequens; Corollis albis *auf dem Schießplatz* rarius. Floret Julio, Augusto.

Pharm. ANTIRRHINI Herba.

PEDICULARIS. G. P. 746.

Cal. 5-fidus. Caps. 2-locularis, mucronata, obliqua. Semina tunicata. S. N. 407.

494. PEDICULARIS, *palustris*, caule ramoso, calycibus cristatis calloso-punctatis, corollis labio obliquis, Linn. S. N. 407. Spec. 845. (Hall. 320.)

H. in pratis uliginosis ad pagum *Sinn* copiose. Floret Junio, Julio.

Pharm. PEDICULARIS Herba.

495. PEDICULARIS, *sylvatica*, caule ramoso, calycibus oblongis angulatis laevibus, corollis labio cordato. Linn. Spec. 845. (Hall. 321.)

H. in

H. in pratis sylvaticis humidis *im Pulversgrund*, *am Beilstein* rarius; ad pagos *Hörbach* & *Schönbach* frequens. Floret Majo, Junio.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

A. SILICULOSA.

* *Silicula integra, nec apice emarginata.*

DRABA. G. P. 800.

Silicula integra, ovali-oblonga: valvis planiusculis, dissepimento parallelis. *Stylus* nullus. S. N. 432.

496. DRABA, *verna*, scapis nudis, foliis subferratis. *Linn. S. N. 432. Spec. 896. (Hall. 496.)*

H. in collibus sterilibus, agris & arvis ubique. Floret Martio, Aprili.

LUNARIA. G. P. 809.

Silicula integra, elliptica, compresso-plana, pedicellata: valvis dissipimento æqualibus, parallelis, planis. *Calyx* foliolis faccatis. S. N. 438.

497. LUNARIA, *rediviva*, foliis alternis. *Linn. Spec. 911. (Hall. 500.)*

H. in rupibus *bey denen Steinkammern* ad pagum *Erbach*. Floret Majo, Junio.

MYAGRUM. G. P. 796.

Silicula stylo conico terminata; loculo submonospermo. S. N. 431.

498. MYAGRUM, *fativum*, filiculis obovatis pedunculatis polyspermis. *Linn. Spec. 894. (Alyssum. Hall. 489.)*

H. in agris inter *Linum in der Aue* vulgare. Floret Janio, Julio.

** *Silicula emarginata apice;*

ALY-

ALYSUM G. P. 805.

Filamenta quædam introrsum denticulo notata. *Silicula* emarginata. S. N. 435.

499. ALYSUM, *calycinum*, caulibus herbaceis, staminibus omnibus dentatis, calycibus persistentibus. *Linn. Spec.* 908.

H. in arvis sterilibus *am Beilstein* rarius. Floret Junio, Julio. ✕

500. ALYSUM, *campestre*, caule herbaceo, staminibus stipatis pari setarum, calycibus deciduis. *Linn. Spec.* 909. (*Hall.* 494. *secund. descript.*)

H. in agris, & arvis sterilibus *am Dollberg*; alibique frequens. Floret Majo, Junio.

Petala apice bifida, flava, dein albida, Calyce paulo longiora. Setæ duæ ad latus singuli Filamenti brevioris, receptaculo insertæ. Calyx ad maturitatem fere silicula, non vero ad dehiscentiam usque valvularum persistens.

COCHLEARIA. G. P. 803.

Silicula emarginata, turgida, scabra: valvulis gibbis obtusis. S. N. 434.

501. COCHLEARIA, *Coronopus*, foliis pinnatifidis, caule depresso. *Linn. S. N.* 435. *Spec.* 904. (*Coronopus. Hall.* 502.)

H. in collibus apricis nudis, *im Beilstein* rarius. Floret Julio, Augusto.

502. COCHLEARIA, *Armoracia*, foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incisis. *Linn. Spec.* 904. (*Nasturtium. Hall.* 504.)

H. in fossis *an der Dille*; *auf der Sandvulfe* rarius. Floret Julio.

Pharm. ARMORACIÆ Radix.

LEPIDIUM. G. P. 801.

Silicula emarginata, cordata, polysperma: valvulis carinatis contrariis. S. N. 433.

503. LEPIDIUM, *fativum*, floribus tetradynamis, foliis oblongis multifidis. *Linn. Spec.* 899.

H. in cultis inter olera *am Sieghäuser Weg*; alibique rarius. Floret Julio, Augusto.

THLA-

THLASPI, G. P. 802.

Silicula emarginata, obcordata, polysperma: valvulis navicularibus, marginato - carinatis. S. N. 434.

504. THLASPI, *arvense*, filiculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Linn. Spec. 901. (Nasturtium. Hall. 511.)*

H. in agris & cultis *auf dem Dollberg*; alibique vulgaris. Floret Majo, Junio.

Pharm. THLASPEOS Semina.

505. THLASPI, *campestre*, filiculis subrotundis, foliis sagittatis dentatis incanis. *Linn. 902. (Nasturtium. Hall. 509.)*

H. in campis & arvis sterilibus *auf der Höhle*; alibique vulgaris. Floret Majo, Junio.

506. THLASPI, *montanum*, filiculis obcordatis, foliis glabris: radicalibus carnosissimis obovatis integerrimis, caulinis amplexicaulibus, corollis calyce majoribus. *Linn. Spec. 902. (Lepidium. Hall. 518.)*

H. in sylvaticis montosis muscosis *am Homberg & Galgenberg* frequens. Floret Aprili, Majo.

Radix biennis. Caulis *spithameus, erectus, subramosus*. Folia radicalia *numerosa, subdentata, rarius integra, infima petiolata*: caulina *cordato-oblonga, amplexicaulia, sinuato-dentata*. Corymbi Flores *ante explicationem purpurei*. Calyx *aqualis, erecto-patulus*. Petala *alba, calyce duplo longiora*. Stamina *distantia, longitudine fere petalorum*: Antheris *purpureis*. Stylus *longitudine Germinis*. Silicula *oblongo-obcordata, subtus convexa, margine tenui acuto cincta*. Semina 6 s. 8.

507. THLASPI, *perfoliatum*, filiculis obcordatis, foliis caulinis cordatis glabris subdentatis, petalis longitudine calycis, caule ramoso. *Linn. Spec. 902. (Nasturt. Hall. 510.)*

H. in arvis & campis sterilibus ad pagum *Ballersbach* rarius. Floret Majo.

508. THLASPI, *Bursa pastoris*, filiculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Linn. Spec. 903. (Nasturt. Hall. 514.)*

H. in agris arvis & cultis passim. Floret tota æstate.

Pharm. BURSAE PASTORIS Herba.

K

B. SILI-

B. S I L I Q V O S Æ.

- * *Calyx clausus foliolis longitudinaliter conniventibus.*

RAPHANUS. G. P. 822.

Cal. clausus. Siliqua torosa, subarticulata, teres. Glandulæ melliferæ 2 inter stamina breviora & pistillum, totidem inter stamina longiora & calycem. S. N. 445.

- § 9. RAPHANUS, *Raphanistrum*, filiquis teretibus articulatis lævibus unilocularibus. *Linn. Spec. 935 (Hall. 468.)*

H. inter segetes æstivas, alibique frequens. Floret Junio, Julio.

Corollæ Petala flava; albida venis violaceis in nostrate rarissima.

ERYSIMUM. G. P. 814.

Siliqua columnaris, exacte tetraëdra. Calyx clausus. S. N. 441.

- § 10. ERYSIMUM, *officinale*, filiquis spicæ adpressis, foliis runcinatis. *Linn. Spec. 922. (Hall. 478.)*

H. in cultis & ruderatis, ad vias vulgaris. Floret æstate.

Pharm. ERYSIMI Herba.

- § 11. ERYSIMUM, *Barbarea*, foliis lyratis extimo subrotundo. *Linn. Spec. 922. (Hall. 479.)*

H. in fossis, ad ripas *Dillæ* frequens. Floret Majo.

- § 12. ERYSIMUM, *Alliaria*, foliis cordatis. *Linn. Spec. 922. (Hall. 480.)*

H. in pomariis ad sepes passim. Floret Majo & sequ.

Pharm. ALLIARIAE Herba.

- § 13. ERYSIMUM, *cheyrantboides*, foliis lanceolatis integerrimis, filiquis patulis. *Linn. S. N. 441. Spec. 923. (Hall. 477.)*

H. in arvis am *Dollberg*; in ruderatis auf dem *Hinterland* rarius. Floret Janio, Julio.

ARABIS. G. P. 818.

Glandulæ nectariferæ 4, singulæ intra calycis foliola, squamæ instar reflexæ. S. N.

443.

514.

§14. ARABIS, *italiana*, foliis petiolatis lanceolatis integerrimis. *Linn. Spec.* 929. (*Hall* 452.)

H. in arvis & agris sterilibus passim. Floret Aprili, Majo. Folia radicalia *subferrata*; *setis furcatis scabra*.

BRASSICA. G. P. 820.

Cal. erectus, connivens. *Sem.* globosa. *Glandula* inter stamina breviora & pistillum, interque longiora & calycem. S. N. 444.

a. *Stylo obtusiusculo*.

§15. BRASSICA, *campestris*, radice cauleque tenui, foliis caulinis uniformibus cordatis sessilibus.

Linn. Spec. 931. (*Eruca. Hall.* 457.)

H. in agris inter *Hordeum* ad pagos *Amdorf* & *Burgk* parcius. Floret Junio.

§16. BRASSICA, *Napus*, radice caulescente fusiformi. *Linn. Spec.* 931.

H. in agris inter segetes alibique frequens. Floret Majo. *Pharm.* NARI Semina.

b. *Eruca siliquis stylo ensiformi*.

§17. BRASSICA, *Erucastrum*, foliis runcinatis, caule hispido, siliquis lævibus. *Linn.* S. N. 444. *Spec.* 932. (*Eruca. Hall.* 459.)

H. ad vias & margines agrorum ad pagum *Fleischbach* rarius. Floret Junio & sequ.

TURRITIS. G. P. 819.

Siliqua longissima, angulata. *Calyx* connivens, erectus. *Corolla* erecta. S. N. 443.

§18. TURRITIS, *Brassica*, foliis omnibus glabris: caulinis cordato-sagittatis amplexicaulibus, radicalibus ovatis petiolatis.

BRASSICA, *alpina*. *Linn.* S. N. 444. *Mantiss.* 95. (*Turritis. Hall.* 454.)

H. in sylvaticis montosis am *Homberg* & *Beilstein* parcius; in nemorosis ad *Erbach* & *Breitscheid* frequens. Floret Majo.

Radix perennis. Caulis simplex, sesquipedalis, erectus, teres, glaber. Folia radicalia petiolata, ovata, firma, glabra; subius rubra: marginalibus denticulis exiguis, callosis, remotis; sub planta florecentia emarcida, fere nulla. Folia caulina amplexicaulia, patens, glabra, cordato-sagittata, acuminata, ca-

rinata, integerrima, glauca, subius albidiora. Corymbus angustissus. Calycis Foliola erecta subconniventia, flavescens: quorum duo latiora convexa, duo opposita angustiora plana, paulo longiora. Petala alba, lineari-oblonga, obtusissima, calyce duplo longiora: unguibus erectis, lamina (loco natali umbroso) erecto-patente. Stamina duo longitudine calycis, totidem Glandulis nectariferis inserta; quatuor calyce longiora, nulla glandula instructa: Antheris sagittatis, flavis, apice reflexis. Germen subtetragonum, fusco-purpureum, longitudine staminum. Stylus nullus. Stigma obtusum, capitatum. Siliqua longissima, stricta, erecta pedunculo patente, obtusa, tetragona: angulis duobus oppositis subcompressis; Dilapimento valvulis subaquali, apice non prominente. Semina numerosa, obovata, compressa, subemarginata.

- § 19. *TURRITIS*, *glabra*, foliis radicalibus dentatis hispidis; caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. *Linn. Spec. 930. (Hall. 455.)*

H. ad margines agrorum bey der Weisgarber Wiese; in sylvaticis montosis am Kehberg, alibique. Floret Junio.

- § 20. *TURRITIS*, *hirsuta*, foliis omnibus hispidis; caulinis amplexicaulibus. *Linn. Spec. 930. (Hall. 456.)*

H. in sylvaticis theriotrophei rarius. Floret Junio.

DENTARIA. G. P. 811.

Siliqua elastice diffiliens valvulis revolutis. *Stigma* emarginatum. *Calyx* longitudinaliter connivens. S. N. 438.

- § 21. *DENTARIA*, *bulbifera*, foliis inferioribus pinnatis, summis simplicibus, *Linn. Spec. 912. (Hall. 470.)*

H. in sylvis, in der Hölle; im Hirschberg frequens. Floret Majo.

•• *Calyx* bians foliolis superne distantibus.

CARDAMINE. G. P. 812.

Siliqua elastice diffiliens valvulis revolutis. *Stigma* integrum. *Calyx* subbiens. S. N. 458.

- § 22. *CARDAMINE*, *impatiens*, foliis pinnatis incisissimulatis, floribus apetalis. *Linn. Spec. 914. (Hall. 471.)*

H. in sylvaticis humidis im Hirschberg frequens. Floret Majo.
Radix

Radix biennis, Caulis acutangulus, levis. Stipulae pilosa.
Flos in nostrate constanter apetalus.

- § 23. CARDAMINE, *parviflora*, foliis pinnatis exstipulatis, foliolis lanceolatis obtusis, floribus corollatis. *Linn. S. N. 439. Spec. 914.*

Cardamine caule foliisque hirsutis, pinnis subrotundis. *Hall. 472. α. addend. III. 184.*

H. in nemorosis umbrosis humidis *im Hirschberg* ad pagum *Gundersdorf*. Floret Majo.

Radix annua. Caulis ultra medium usque, Petioli & Folia inferiora pilis, varis parulis subhirsuta. Stipulae nulla, Flores magnitudine T. Bursa pastoris. Petala 4, alba. Stamina sex.

- § 24. CARDAMINE, *hirsuta*, foliis pinnatis, floribus tetrandris. *Linn. Spec. 915.*

Cardamine tetrastemon, caule glabro, foliis subhirsutis, imis subrotundis. *Hall. 472. β. add. III. 184.*

H. in arvis & pascuis sterilibus *anf der Sandwiese*; olim lecta, nunc rarissima planta. Floret Junio.

Flores paulo majores quam in precedente. Petala alba. Stamina 4: duo breviora semper deficientia.

- § 25. CARDAMINE, *pratensis*, foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis, caulinis lanceolatis. *Linn. Spec. 915. (Hall. 473.)*

H. in pomariis & pratis humidis passim. Floret Majo.

- § 26. CARDAMINE, *amara*, foliis pinnatis, axillis stoloniferis. *Linn. Spec. 915. (Hall. 474.)*

H. in nemorosis ad pagos *Sinn & Gundersdorf*; secus rivulos *im Zruinger*; *an der Mühlbach* parcius. Floret Majo.

SINAPIS. G. P. 821.

Cal. patens. *Cor.* ungues recti. Glandula inter stamina breviora & pistillum, interque longiora & calycem. S. N. 444.

- § 27. SINAPIS, *arvensis*, siliquis multangulis torosoturgidis laevibus rostro ancipiti longioribus. *Linn. S. N. 444. Spec. 933. (Sinapi. Hall. 467.)*

H. in agris inter segetes aestivas, alibique vulgarissima. Floret Majo & sequ.

SISYMBRIUM. G. P. 813.

Siliqua dehiscens valvulis rectiusculis. *Cal.* lyx patens, *Corolla* patens. S. N. 439.

a. *Siliquis declinatis brevibus.*

- §28. *SISYMBRIUM*, *Nasturtium aquaticum*, filiquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis subcordatis. *Linn. Spec. 916. (Hall. 482.)*

H. in rivulis, ad scaturigines, in sylvaticis udis ad *Erait-scheid & Langenbach* frequens. Floret Junio.

Pharm. NASIURTII AQUATICI Herba.

- §29. *SISYMBRIUM*, *sylvestre*, filiquis declinatis oblongo-ovatis, foliis lanceolatis serratis. *Linn. S. N. 439. Spec. 916. (Hall. 483.)*

H. ad margines fossarum *auf der Sanduviese*, jam dudum lecta. Floret Junio.

- §30. *SISYMBRIUM*, *amphibium*, filiquis declinatis oblongo-ovatis, foliis pinnatifidis serratis. *Linn. Spec. 917.*

α. *palustre*. Radicula foliis pinnatis, pinnis dentatis, petalis calyce brevioribus. *Hall. 487.*

β. *aquaticum*. Radicula foliis integris, aut pinnatifidis, petalis calyce longioribus. *Hall. 486. α.*

γ. *terrestre*. Radicula foliis inferioribus ovatis serratis, superioribus semipinnatis. *Hall. 486. β.*

H. α, in fossis *im Qudenvueyher*; β, ad ripas *Dilla*; γ, *an der Mühlbach* alibique. Floret Majo & sequ.

b. *Caule nudo.*

- §31. *SISYMBRIUM*, *arenosum*, caule subfolioso ramoso, foliis lyratis rectangulo-dentatis hispidis: pilis ramosis. *Linn. Spec. 919. (Eruca. Hall. 462.)*

H. in arvis & pratis sterilibus *hinter dem Homberg* rarius. Floret Majo.

Petala *violacea*. Foliorum *feta bi- f. trifida, caulina simplices.*

c. *Foliis pinnatis.*

- §32. *SISYMBRIUM*, *Sophia*, petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis. *Linn. Spec. 920. (Hall. 484.)*

H. in ruderatis *auf dem Hinterland*, alibique rarius. Floret Majo, Junio.

Pharm. SOPHIAE Semina.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

A. DECANDRIA.

GERANIUM. G. P. 832.

Monogyna. Stigmata 5. Fructus rostratus,
5-coccus. S. N. 452.

a. *Staminibus quinque antheriferis.*

533. GERANIUM, *cicutarium*, pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisifolius obtusis, caule ramoso. *Linn.* S. N. 454. *Spec.* 951. (*Hall.* 944)

H. in arvis ruderatis & cultis passim. Floret Aprili & sequ. Vernalis Planta Caule nullo, Scapo radicali, Petalis superioribus duobus macula notatis; æstivalis Caule ramoso, procumbente, Petalis omnibus immaculatis. In hoc & sequentibus sub singulo filamento brevior, Squama nectarifera exigua.

534. GERANIUM, *pusillum*, pedunculis bifloris, petalis emarginatis, caule depresso, foliis reniformibus palmatis linearibus acutis. *Linn.* S. N. 456. *Spec.* 957. (*Hall.* 940.)

H. in sterilibus ad sepes hortorum, am Homberg, alibique frequens. Floret Majo.

Radix annua. Caules pures, depressi, procumbentes, ramosi, diffusi, laeves, seu pube vix per lentem conspicua tactu molles. Folia radicalia septiloba, caulina omnia opposita, quinqueloba: lobis linearibus, trifidis, acutis: Stipulis pilosis; Petiolis Pedunculisque depressis. Bractea 4, lanceolata, subpilosa. Pedicelli declinati, demum erecti, apice incrassati. Calycina foliola mucica, pilosa. Petala obcordata, cœrulea, calyci non longiora. Stamina 5 castrata, 5 antherifera: Antheris cœruleiscentibus. Stigmata albida, patula. Rostrum Fructus tenue, breve. Arilli fusci, nitidi, laeves, per lentem setis sursum adpressis vestiti.

b. *staminibus 10 antheriferis.*

535. GERANIUM, *sylvaticum*, pedunculis bifloris, foliis subpeltatis quinquelobis inciso serratis, caule

caule erecto, petalis emarginatis. *Linn. Spec.* 954. (*Hall.* 932.)

H. in sylvaticis im *Hirschberg*; ad pagos *Breitscheid* & *Langenaubach*, alibique rarius. Floret Majo, Junio.

Caulis sesquipedalis, erectus, teres, glaber, nudus; superne dichotomus, foliosus. Pedunculi ex caulibus divisis & axillis foliorum superiorum, erecti, bi-rarius triflori: terminales plures (sæpe 4) subuniflori, fastigiati. Pedicelli breves, apice vix incrassati, sub & post florescentiam erecti. Flos campanulato-patens. Calycina foliola subvillosa, aristata: aristis fructu maturo recurvis. Petala subemarginata, cœrulea, venis 5 purpureis. Stigmata erecta.

§36. GERANIUM, *palustre*, pedunculis bifloris longissimis declinatis, petalis integris, foliis quinquelobis incis. *Linn. Spec.* 954. (*Hall.* 933.)

H. in fossis & dumetis ad margines pratorum bey der untern *Papiermühle*, alibique frequens. Floret Julio.

Caulis sæpe cubitalis, obliquus, subprocumbens, pubescens, sexangulatus, angulis obtusis: duobus oppositis depressioribus; geniculis valde incrassatis; ramis divaricatis. Pedunculi biflori, longi. Pedicelli longi post florescentiam declinati, apice incrassati. Flos patens. Calycis foliola nervosa, levia, aristata: aristis maturo fructu erectis. Petala magna, integra, sub sanguinea, venis 7 saturatioribus. Stigmata recurva.

§37. GERANIUM, *pratense*, pedunculis bifloris, foliis subpeltatis multipartitis rugosis acutis, petalis integris, *Linn. S. N.* 455. *Spec.* 954. (*Hall.* 931.)

H. in pratis succulentis ad *Erbach*, infrequens. Floret Julio. Plantam hanc mihi adhuc dubiam, nondum sufficienter examinare licuit.

§38. GERANIUM, *robertianum*, pedunculis bifloris, calycibus pilosis decemangulatis. *Linn. Spec.* 955. (*Hall.* 943.)

H. in umbrosis, ad sepes frequens. Floret Majo & sequ.

Pharm. GERANII ROBERTIANI Herba.

§39. GERANIUM, *molle*, pedunculis bifloris foliisque floralibus alternis, petalis bifidis calycibus muticis, caule erectiusculo. *Linn. S. N.* 455. *Spec.* 955? (*Hall.* 939?)

H. in cultis, ad sepes hortorum am *Dollberg* & *Homburg* infrequens. Floret Majo, Junio.

Tota Planta tactu mollissima. Caules pauci, erectiusculi, vix ramosi: pilis raris patulis adpersi. Folia radicalia semiseptiloba;

ba ; Caulina *alterna*, *remota*, *quinqueloba* : *lobis subtrifidis*, *obtusis*. Stipulae 4 *emarcidae*. Pedunculi *oppositifolii*, *alterni*, *pilosi*. Bractea 4 *exigua*, *rabra*. Pedicelli *reflexo-declinati*, *apice vix incrassati*. Calycina Foliola *ovata*, *mutica*, *mucrone brevissimo rubro*. Petala *semibifida*, *subsanguinea*, *venis tribus saturatioribus*, *calyci longiora*. Stamina *omnia antherifera* : Antheris *cæruleis*. Stigmata *patula*, *purpurea*. Fructus *rostrum breve*, *crassiusculum*, 5 *sulcatum*, *laeve*. Arilli *nudi*, *transversim rugosi*. Caules in *culta* *Planta ramosiores* ; Foliorum *lobi obtusissimi*. His notis a *G. pusillo* (nostro) cui simile, caute distinguendum ; ob Folia *lobata* & Petala *semibifida* esse nequit *G. rotundifolium*, *cujus specimina tantum deflorata hucusque a me lecta*, *nondum satis perscrutari & cum G. molli conferre licuit.*

540. GERANIUM, *columbinum*, pedunculis bifloris folio longioribus, foliis quinquepartito-multifidis, arillis glabris, calycibus aristatis. *Linn. S. N. 455. Spec. 956. (Hall. 938.)*

H. in umbrosis, ad sepes *am Dollberg*, alibique frequens. Floret Junio, Julio.

Pedunculi *longissimi*. Calyx *aristatus* *aristis longis*, *nervosus*, *fructu maturo maximus*, *pedicellis longis*, *declinatis*. Petala *subsanguinea*, *trivenia*, *emarginata*, *vel retusa interjecto mucrone*, *calyce nec aristis longiora*. Arilli & rostrum *laevia*.

541. GERANIUM, *dissectum*, pedunculis bifloris, foliis quinquepartito-trifidis, petalis emarginatis longitudine calycis, arillis villosis. *Linn. Spec. 956. (Hall. 937.)*

H. in cultis passim. Floret Junio, Julio.

Stipulae & Bractea *purpurea*, *nitida*. Calycina foliola *pilosa*, *aristata*. Petala *sanguinea*, *emarginata*, *calycis longitudine*. Pedicelli *brevissimi*, *declinati* : Rostrum *arillique pilosi*.

542. GERANIUM, *rotundifolium*, pedunculis bifloris, petalis subintegris longitudine calycis, caule prostrato, foliis reniformibus incis. *Linn. S. N. 456. Spec. 957. (Hall. 941.)*

H. in cultis in *der Pitze* rarius. Floret Junio & seq. ✕

B. POLYANDRIA.

MALVA. G. P. 841.

Cal. duplex : exterior *triphyllus*. Arilli plurimi, monospermi. S. N. 459.

543. *MALVA, rotundifolia*, caule prostrato, foliis cordato orbiculatis obsolete quinquelobatis, pedunculis fructiferis declinatis, *Linn. S.N. 460. Spec. 969. (Hall. 1070.)*

H. in cultis, ruderatis, ad vias passim. Floret æstate.

Pharm. MALVÆ VULGARIS Herba, Flores, Semina.

544. *MALVA, sylvestris*, caule erecto herbaceo, foliis septemlobatis acutis, pedunculis petiolisque pilosis. *Linn. Spec. 969. (Hall. 1069.)*

H. ad sepes horiorum & quidem unico tantum in loco: *in der Höhle am Dollberg*. Floret Junio & sequ.

545. *MALVA, crisp.*, caule erecto, foliis angulatis crispis, floribus axillaribus glomeratis. *Linn. Spec. 970.*

H. in cultis oleraceis *vor dem Homberg*, ad sepes *bey der Walckmühle*, alibique quasi indigena parcius. Floret Julio & sequ.

546. *MALVA, Alcea*, caule erecto, foliis multipartitis scabriusculis. *Linn. Spec. 971. (Hall. 1071.)*

H. in montosis ad versuras *am Rehberg* infrequens. Floret Julio.

547. *MALVA, moschata*, caule erecto, foliis radicalibus reniformibus incis; caulinis quinque-partitis pinnato multifidis. *Linn. S.N. 461. Spec. 971. (Hall. 1072.)*

H. in montosis sterilibus *auf dem Galgen- und Dollberg* frequens, *am Rosenwaldgen* parcius. Floret Julio.

Caulibus brevioribus sesquipedalibus. Foliis caulinis ad petiolum usque 5-partitis: lobis pinnatifidis, summis angustissimis. Floribus paulo minoribus; Arilli hirsutis; odoreque sub florescentia moschato, a precedente distinguitur.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

A. HEXANDRIA.

FUMARIA. G. P. 849.

Cal. diphyllus. *Cor.* ringens. *Filamenta* 2, membranacea, singula *Antheris* 3. S. N. 469. 548.

- §48. FUMARIA, *bulbosa major*, caule simplici, bracteis longitudine florum. *Linn. Spec.* 983, var. α , *cava*, & β , *intermedia*.

Fumaria radice bulbosa, cava, caule simplici bifolio, bracteis ovato-lanceolatis. *Hall.* 348. vid. *Nomenclat.*

H. α . & β . in nemorosis ad pagum *Erbach* copiose, ad sepes in pratis *hinter dem Schloß* parcius. Floret Majo.

Pharm. ARISTOLOCHIE CAVÆ Radix.

Planta junioris α , Radix subglobosa, solida, radículas undique emittens; adultioris Radix hemispharica, subtus excavata, a priori aetate tantum diversa. Bractæ integerrime, floribus breviores. Corollis albis & purpureis ludis.

- §49. FUMARIA, *bulbosa minor*, radice bulbosa, solida, caule simplici multifolio, bracteis digitatis. *Hall.* 349.

Fumaria bulbosa, var. γ . *Linn. Spec.* 983.

H. in pomariis ad sepes *unter der neuen Brücke*, alibique frequens. Floret Aprili.

Pharm ARISTOLOCHIE FABACEÆ Radix.

Huius Radicis Bulbus semper solidus, obovatus; radículas tantum basi emittens. Bractæ digitorum parallelorum instar fissæ, longitudine florum. Corollæ semper (in nostrate) purpurea, minores. In hortum promiscue cum antecedente transplantata. Radicem solidam in cavam, & Bractæas fissas in integerrimas, per decem annos non mutavit.

- §50. FUMARIA, *officinalis*, pericarpiis monospermis racemosis, caule diffuso. *Linn. Spec.* 984. (*Hall.* 346)

H. in agris & cultis passim. Floret æstate.

Pharm. FUMARIÆ Herba.

B. OCTANDRIA.

POLYGALA. G. P. 851.

Cal. 5-phyllus: foliolis duobus alæformibus, coloratis. Legumen obcordatum, biloculare. S. N. 470.

- §51. POLYGALA, *vulgaris*, floribus cristatis racemosis, caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis. *Linn. Spec.* 986. (*Hall.* 344.)

H. in pascuis sylvaticis montosis passim. Corollis violaceis, albidis & carneis ludis. Floret Majo, Junio. C.

C. D E C A N D R I A.

* *Stamina omnia connexa.*

SPARTIUM. G. P. 858.

Stigma longitudinale, supra villosum. *Filamenta* germini adhærentia. *Calyx* deorsum productus. S. N. 474

552. SPARTIUM, *scoparium*, foliis ternatis solitariisque, ramis inermibus angulatis. *Linn. Spec.* 996. (*Hall.* 354.)

H. in montosis sylvaticis *am Homberg* frequens. Floret Majo, Junio.

Calyx bilabiatus, labio superiore bi-inferiore tridentato. Siliqua compresso-plana, marginibus villosa.

GENISTA. G. P. 859.

Cal. 2-labiatus: $\frac{3}{4}$. *Vexillum* oblongum, a pistillo staminibusque deorsum reflexum. S. N. 474.

a. *inermes.*

553. GENISTA, *sagittalis*, ramis ancipitibus membranaceis articulatis, foliis ovato-lanceolatis. *Linn. S. N.* 475 *Spec.* 998. (*Hall.* 353.)

H. in montosis sylvaticis *am Beilstein* rarius. Floret Junio.

554. GENISTA, *tinctoria*, foliis lanceolatis glabris, ramis striatis teretibus erectis. *Linn. Spec.* 998. (*Hall.* 350.)

H. in sylvaticis *am Homberg*, *Rehberg*, alibique vulgaris.

Pharm. GENISTÆ Herba, Flores, Semina.

555. GENISTA, *pilosa*, foliis lanceolatis obtusis, caule tuberculato decumbente. *Linn. Spec.* 999. (*Hall.* 351.)

H. in sylvaticis *im Hirschberg* parcius. Floret Junio.

b. *Spinosa.*

556. GENISTA, *germanica*, spinis compositis, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. *Linn. Spec.* 999. (*Hall.* 352.)

H. in sylvis *am Beilstein*, alibique vulgaris. Floret Junio.

ANTHYLLIS. G. P. 864.

Cal. ventricosus. *Legumen* subrotundum, tectum. S. N. 480. 557.

357. ANTHYLLIS, *Vulneraria*, herbacea, foliis pinnatis inæqualibus, capitulo duplicato. *Linn. Spec. 1012.* (*Vulneraria Hall. 398.*)

H. in pratis sylvaticis ficcis *am Rehberg*, alibique. Floret Junio.

ONONIS. G. P. 863.

Cal. 5-partitus: laciniis linearibus. *Vexillum* striatum. *Legumen* turgidum, sessile. *Filamenta* connata absque fissura. S. N. 478.

558. ONONIS, *arvensis*, floribus racemosis geminatis, foliis ternatis: superioribus solitariis, ramis inermibus villosis. *Linn. S. N. 478. Spec. spinosa. 1006.* (*Anonis. Hall. 356.*)

H. in campis sterilibus passim, Floret Junio, Julio.

Pharm. ONONIDIS Radix, Herba.

** *Stigma pubescens.* (nec priorum notæ.)

OROBUS. G. 871.

Stylus linearis. *Cal.* basi obtusus: laciniis superioribus profundioribus, brevioribus. S. N. 485.

559. OROBUS, *vernus*, foliis pinnatis ovatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici. *Linn. Spec. 1028.* (*Hall. 416.*)

H. in nemorosis ad *Breitscheid*; im *Hirschberg*; im *Thiergarten* frequens. Floret Majo.

560. OROBUS, *tuberosus*, foliis pinnatis lanceolatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici. *Linn. Spec. 1028.* (*Hall. 417.*)

H. in sylvis im *Hirschberg*; im *Driedorfer Wald* rarius. Floret Junio. †.

LATHYRUS. G. P. 872.

Stylus planus, supra villosus, superne latior. *Calycis* laciniæ superiores 2 breviores. S. N. 486.

561. LATHYRUS, *pratensis*, pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis simplicissimis: foliolis lanceolatis. *Linn. Spec. 1033.* (*Hall. 436.*)

H. in pratis & sepibus ubique. Floret Junio.

562. *LATHYRUS, sylvestris*, pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ensiformibus, internodiis membranaceis. *Linn. Spec. 1033. (Hall. 434.)*

H. in sylvaticis am Geißlichen Berg, Homberg, alibique. Floret Julio.

563. *LATHYRUS, latifolius*, pedunculis multifloris cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. *Linn. Spec. 1033. (Hall. 433.)*

H. in nemorosis ad Erbach rarius. Floret Julio.

VICIA. G. P. 873.

Stigma latere inferiore transverse barbatum.
S. N. 487.

564. *VICIA, pisiformis*, pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis: foliolis ovariis: infimis sessilibus. *Linn. Spec. 1034. (Hall. 428.)*

H. in sylvaticis montosis am Beilstein copiose. Floret Junio, Julio.

Caules cubitales, erectiusculi, angulati. Stipulae semisagittatae, dentatae. Foliola 6 f. 8, ovata, integerrima, rarius subcrenulata, mucrone apice prominulo: quorum inferiora duo reliquis majora, inter petiolum & caulem subsessilia, caulique approximata, Stipulas obtegentia. Cirrhi multifidi. Pedunculi angulati, multiflori. Bractae setaceae, sub floribus superioribus nulla. Flores 20-30. (Astragal. glycyphyll.) Filamentum solitarium basi lanceolatum. Germen pedicellatum. Nectarium obtusum. Siliqua brevis.

565. *VICIA, sylvatica*, pedunculis multifloris, foliolis ovalibus, stipulis denticulatis. *Linn. Spec. 1035. (Hall. 426.)*

H. in sylvis, im Hirschberg, in der Hölre infrequens. Floret Junio, Julio.

566. *VICIA, Cracca*, pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris. *Linn. Spec. 1035. (Hall. 424.)*

H. inter segetes rarius, in sepiibus passim. Floret Julio.

567. *VICIA, sativa*, leguminibus sessilibus subbinatis erectis, foliolis rerufis, stipulis notatis. *Linn. Spec. 1037.*

β. Vi-

β. *Vicia* foliis imis ovatis, superioribus linearibus, scapis brevissimis bifloris. *Hall.* 430.

H. α. & β. in agris inter Lentem frequens. Floret Julio.

568. *VICIA*, *lathyroides*, leguminibus sessilibus solitariis erectis glabris, foliolis senis: inferioribus obcordatis. *Linn. Spec.* 1037?

H. in montosis apricis aridis theriotropei an der Rößbach rarius. Floret Majo, Junio.

Caulis *spithameus*, erectus, subramosus, subtrigonus. Stipulae dentatae, nulla macula subius notata. Petioli inferiores brevissimi, cirrho nullo: Foliolis minimis, senis, obcordatis cum acumine; superiores breves, cirrhiferi: Foliolis 6 f. 8, angustissimis, linearibus, glabris, retusis cum acumine; junioribus conduplicatis. Flos solitarius, sessilis, V. c. sativa triplo minor, ejusdem tamen figura & coloris. Legumen erecto-patens, subsessile, glabrum, 8-sperum. Vereor ne planta hac pulchella habitu & structura a priori (β) diversissima, ob pubescentiam licet levissimam in foliolis inferioribus & ipso legumine, ejusdem sit mera varietas.

569. *VICIA*, *sepium*, leguminibus pedicellatis subquaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis: exterioribus decrefcentibus. *Linn. Spec.* 1038. (*Hall.* 429.)

H. in pomariis sepibus & sylvis frequens. Floret Majo, Junio.

*** *Legumen subbiloculare.* (nec priorum notæ.)

ASTRAGALUS. G. P. 892.

Legumen biloculare, gibbum. S. N. 498.

570. *ASTRAGALUS glycyphyllos*, caulescens prostratus, leguminibus subtriquetris arcuatis, foliolis ovalibus pedunculo longioribus. *Linn. S. N.* 498. *Spec.* 1067. (*Hall.* 413.)

H. in sylvaticis montosis im Beulstein frequens. Floret Junio. Calycis denticuli inferiores tres setacei aquales, reliquis longiores.

**** *Legumina submonosperma.* (nec priorum notæ.)

TRIFOLIUM. G. P. 896.

Flores subcapitati. Legumen vix calyce longius, non dehiscens, deciduum. S. N.

501.

a. *Melilotus, leguminibus nudis polyspermis.*

571. TRIFOLIUM, *Melilotus officinalis*, leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis acutis, caule erecto. *Linn. Spec.* 1078. (*Melilotus. Hall.* 362.)

H. in ruderatis auf dem Hinterland; in arvis auf dem Reuterberg; alibique parcius. Floret Junio, Julio.

Pharm. MELILOTI Herba cum floribus.

b. *Lotoidea leguminibus tectis, polyspermis.*

572. TRIFOLIUM, *hybridum*, capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule adscendente. *Linn. Spec.* 1079. (*Hall.* 368.)

H. in pratis subhumidis passim. Floret Junio, Julio.

573. TRIFOLIUM, *repens*, capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule repente. *Linn. Spec.* 1080. (*Hall.* 367.)

H. in pratis pomariis & pascuis ubique. Floret Majo & sequ.

Pharm. TRIFOLII ALBI Flores.

c. *Lagopoda calycibus villosis.*

574. TRIFOLIUM, *pratense*, spicis subvillosis cinctis stipulis oppositis membranaceis, corollis monopetalis. *Linn. Spec.* 1082. (*Hall.* 377.)

H. in pomariis & pratis pinguioribus passim. Floret Junio & sequ.

Caulis teres, superne striatus lavis. Stipulae amplexantes, ovatae, dilatatae, acuminatae, nervosae; supremae duae florales subovatae, scariosae, nervis rubris. Foliola mollia, supra macula subsagittata notata, subtus vix villosa; inferiora ovata, obtusa, superiora lanceolata acuta. Capitulum terminale (in planta non culta) solitarium, ovatum, sessile inter stipulas duorum foliorum. Calycis dentes pilosi, 4 breves, infimo longitudine fere subaequalia corollae. Corolla monopetala pallide purpurea, minor quam in sequente: Alis vexillo brevioribus.

575. TRIFOLIUM, *alpestre*, spicis subglobosis villosis terminalibus, caule erecto, foliis lanceolatis ferrulatis. *Linn. S.N.* 502. *Spec.* 1082? (*Hall.* 376.)

H. in montosis sylvaticis passim. Floret Junio & sequ.

Caulis subdepressus; pubescens, superne teres, subvillosus. Stipulae vaginantes, subulatae; supremae duae florales ovato-lanceolatae, virides. Foliola firma, omnia lineari-lanceolata, supra rarissime maculata, subtus albido-villosa. Capitula terminalia duo, subglobosa, sessilia inter duas stipulas; demum oblonga, pedum-

pedunculata. Calycis dentes brevissimi, subpilosi, recti, infimo tubo corollae dimidio brevior. Corolla monopetala major quam in precedente, saturatius purpurea: Alis longitudine vexilli. Hoc & precedens calyce villosa & levi, nervis rubris & non coloratis; foliolisque integris & serrulatis ludis. Caulem in nostro alpestri magis obliquum fere procumbentem, in pratensi vero adscendentem erectum, semper observavi.

576. TRIFOLIUM, angustifolium, spicis villosis conico-oblongis, dentibus calycinis fetaceis subaequalibus, foliolis linearibus. Linn. Spec. 1083.

H. in pascuis siccis sterilibus in der Hölle rarius. Floret Julio, Augusto.

Differt a sequente: Caule altiori erectiori, subtrigono, levi, non pubescente. Ramis caule multo brevioribus. Stipulis nervosis longius acuminatis. Foliolis angustioribus, utrinque levibus, subtus striatis. Capitulis subcylindricis, angustioribus, longioribus. Calycibus striatis: dentibus purpureis nudis, non plumosis, inferioribus tribus reliquis paulo longioribus. Corollis calyce brevioribus, albidis, absque macula alarum sanguinea. Receptaculo nudo nec villosa.

577. TRIFOLIUM, arvense, spicis villosis ovalibus, dentibus calycinis fetaceis villosis aequalibus. Linn. S. N. 503. Spec. 1083. (Hall. 373.)

H. in agris arvis & campis sterilibus passim. Floret Julio & sequ.

578. TRIFOLIUM, striatum, capitulis sessilibus sub-lateralibus ovatis calycibus striatis rotundatis. Linn. Spec. 1085.

H. in pascuis siccis am Dollberg. Floret Majo, Junio.

Radix biennis, lignosa, ramosa. Caules plures, procumbentes, spithamei, subramosi, teretes, subvillosi. Stipulae ovato-acuminatae, venis rubris. Foliola obovata, integerrima, pubescentia: Floralia acutiuscula, antice serrulata. Capitula oblonga, itemque ovata, terminalia axillariaque, sessilia in foliorum stipulis. Calyx tubulosus, viridis, denticulis rectis: superioribus 4 aequalibus, infimo duplo majore. Corolla exigua, carnea, calyce paulo major. Calyx fructus subglobosus, collo contracto, nervis 10 rubris striatus. Legumen ovato-acutum monospermum includens.

d. Lupulina vexillis corollae inflexis.

579. TRIFOLIUM, montanum, spicis subimbricatis subtribus: vexillis subulatis emarcescentibus, L caly-

calycibus nudis, caule erecto. *Linn. Spec.* 1087.
(*Hall.* 372.)

H. in pratis auf dem Westervald; ad pagos Waldaubach, Liebensteid, alibique frequens. Floret Julio.

580. TRIFOLIUM, *agrarium*, spicis ovalibus imbricatis: vexillis deflexis persistentibus, calycibus, nudis, caule erecto, *Linn. Spec.* 1087.
(*Hall.* 363.)

H. in agris & arvis am Dollerg, Reusterberg, alibique. Floret Junio & sequ.

581. TRIFOLIUM, *spadiceum*, spicis ovalibus imbricatis: vexillis deflexis persistentibus, calycibus pilosis, caule erecto. *Linn. Spec.* 1087.
(*Hall.* 365.)

H. in sylvaticis montosis im Beilstein rarius. Floret Julio.

582. TRIFOLIUM, *procumbens*, spicis ovalibus imbricatis: vexillis deflexis persistentibus, caulibus procumbentibus. *Linn. Spec.* 1088. (*Hall.* 364.)

H. in arvis & campis ficcis am Dollberg; Homberg; auf dem Schießplatz frequens. Floret Julio & sequ.

Radix biennis. Caules didrantes, procumbentes, ramosi, firmi, pilosi. Stipulae ovatae, acutae, nervosae. Foliola obovata, retusa, antice serrulata, subius striata. Pedunculi pilosi, longitudine foliorum. Capitula ovalia, multiflora. Calycis denticuli tres inferiores reliquis duplo longiores, filo brevi sub apice. Vexillum margine serrulatum. Semen 1, saepe 2.

583. TRIFOLIUM, *filiforme*, spicis subimbricatis: vexillis deflexis persistentibus, calycibus pedicellatis caulibus procumbentibus. *Linn. Spec.* 1088. (*Hall. var. præc.* 364.)

H. in pratis & pomariis copiosissime. Floret Majo, Junio.

Radix annua. Caules saepe ultrapedales, filiformes, procumbentes, inter gramina erectiusculi, vix ramosi, subnudi. Stipulae exiguae, ovatae. Folia remota, brevissime petiolata. Foliola obcordata, antice serrulata, utrinque striata. Pedunculi tenues, foliis longiores. Capitula pauci- (10-15-) flora. Flores subpedicellati. Calyx praecedens. Vexillum vix manifeste serrulatum. Alae striatae. Semen unicum.

**** Legumen subarticulatum.

HEDYSARUM. G. P. 887.

Cor. carina transverse obtusa. Legumen articulis 1-spermis. S. N. 493. 584.

584. HEDYSARUM, *Onobrychis*, foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, corollarum alis calyce brevioribus, caule elongato. *Linn. Spec.* 1059. (*Onobrychis*. *Hall.* 396.)

H. in pratis bey der obern Papiermühle rarius. Floret Junio, Julio.

Oeconom. SAINT FOIN, seu ESPARSETTE.

MEDICAGO. G. P. 899.

- : Legumen compressum cochleatum. *Carina* corollæ a vexillo deflectens. S. N. 505.

585. MEDICAGO, *fativa*, pedunculis racemosis, leguminibus contortis, caule erecto glabro. *Linn. Spec.* 1096. (*Medica*. *Hall.* 382.)

H. in pratis & pominariis an der Dille bey dem Sieghausß. Floret Julio, Augusto.

Oeconom. LUZERNE.

586. MEDICAGO, *lupulina*, spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, caulibus procumbentibus. *Linn. S. N.* 506. *Spec.* 1097. (*Medica*. *Hall.* 380.)

H. in pascuis arvis & agris ubique. Floret Junio & sequ.

***** Legumen uniloculare polyspermum. (nec priorum notæ.)

ERVUM. G. P. 874.

Cal. 5-partitus, longitudine corollæ. S. N. 488.

587. ERVUM, *Lens*, pedunculis subbifloris, feminibus compressis convexis. *Linn. Spec.* 1039. (*Lens*. *Hall.* 421.)

H. in agris inter segetes am Dollberg, alibi que. Floret Junio.

588. ERVUM, *tetraspermum*, pedunculis subbifloris, feminibus globosis quaternis. *Linn. Spec.* 1039. (*Vicia*. *Hall.* 423.)

H. in agris & arvis am Homberg & Dollberg; in cultis am Sieghausß. Floret Julio.

Foliola 8 f. 10, linear-lanceolata, acuta: quorum infimum par cili approximatum. Stipulæ lanceolata, acuminata. unico sape denticulo laterali. Cirrhi trifidi, interdum simplicissimi. Pedunculi 1-f. 2-flori. Calyx corolla brevior, denticulis

- lis inferioribus tribus reliquis longioribus. Legumen nutans obtusissimum, glabrum, 3-f. 4-spermum.
589. ERVUM, *hirsutum*, pedunculis multifloris, seminibus globosis binis. Linn. Spec. 1039. (*Vicia*. Hall. 422.)

H. in agris & cultis ubique; vitium nimis frequens. Floret Junio & sequ.

Stipulae tripartita. Folia 16-18, linearia, retusa cum acumine. Pedunculi 4-5-6-flori. Calyx corolla paulo brevior, subpilosus; denticulis subaequalibus. Legumina pendula, hirsuta, acutiuscula, dispersa.

590. ERVUM, *monanthos*, pedunculis unifloris. Linn. Spec. 1040.

H. in agris inter Lentem am Homberg, alibique rarius. Floret Julio.

Lente vulgari major, Cirrhis bi- f. trifidis scandent. Petioli horizontales. Foliola 16-18, linearia, retusa cum acumine. Stipulae duae, alternatim maiores, figura diversa; quarum unica brevissima lanceolata, altera opposita quintuplo maior, petiolata, pedato-multifida; laciniis setaceis, longissimis, patulis. Pedunculus uniflorus. Calyx corolla triplo brevior, denticulis subaequalibus. Vexillum compressum, albidum venis violaceis. Legumen magnum, subnutans, 2-f. 3-spermum. Semen magnitudine pisi, compressum, margine obtuso.

591. ERVUM, *Ervilia*, germinibus undato-plicatis, foliis impari-pinnatis. Linn. Spec. 1040. (*Ervum*. Hall. 420.)

H. in agris inter Lentem cum praecedente rarius. Floret Junio.

Pharm. ERVI f. OROBI Semina.

Planta erecta, non scandens. Stipulae ovata, dentata. Foliola 18-24, linearia-oblonga, retusa cum acumine. Petiolus apice in mucronem productus, loco cirrhi, quo caret. Pedunculi 2 f. 3-flori. Calyx corolla duplo brevior, denticulis subaequalibus, superioribus duobus decussatis. Vexillum subemarginatum, cum acumine. Germen lineare, rectum, Anthesi peracta tantum undulato-plicatum. Legumina pendula, articulato-nodosa, 3 f. 4-sperma. Semina subangulosa.

LOTUS. G. P. 897.

Legumen cylindricum strictum. Alae sursum longitudinaliter conniventes. Calyx tubulosus. S. N. 504.

592. *Lotus, corniculatus*, capitulis depresso, caulibus decumbentibus, leguminibus cylindricis patentibus. *Linn. Spec. 1092. (Hall. 385.)*

H. in pratis & pomariis ubique. Floret Julio, Augusto.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

POLYANDRIA.

HYPERICUM. G. P. 902.

Cal. 5-partitus. *Petala 5. Filamenta multa*, in 5 phalanges basi connata. *Capsula. S. N. 509.*

593. *HYPERICUM, quadrangulum*, floribus trigynis, caule quadrato herbaceo. *Linn. Spec. 1104. (Hall. 1038,)*

H. in pratis humidis juxta rivulos *hinter dem Homberg; bey der untern Walkmühle; auf dem Schlüssel.* Floret Julio.

Caulis tetragonus, angulis membranaceis, punctis purpureis adspersis. Folia margine nigro-punctata, flavo-viridia, demum rufescentia. Flores minores quam in sequentibus. Calycis lacinia lanceolata, acuminata. Petala integra, punctis nullis. Filamentorum phalanges 3, longitudine corollae. Punctum Antherarum atrum, dein album, uti in sequentibus. Capsula ovato cylindrica.

594. *HYPERICUM, dubium*, floribus trigynis, caule subquadrato herbaceo, foliis ovatis, calycibus obtusissimis.

H. ad fepes *am Sieghaus; am Homberg; ad vias passim.* Floret Julio, Augusto.

Caulis, plures 2-f. 3-pedales, erecti, subquadrangulares, punctis nigris adspersi. Folia magna, amplexicaulia, ovata, margine acutissimo scarioso subtus nigro-punctato, apice subretusa cum acumine brevi. Flores majores quam in sequentibus, subcorymbosi, sapius terni, pedunculati. Calyx pentaphyllus: Foliolis distinctis, ovatis, integerrimis, obtusissimis, flavo-viridibus, lineolis interruptis atris undique notatis. Petala magna, integerrima, supra lineolia, subtus margine punctis atris raris

notata. Stamina phalanges 3, longitudine corollæ. Capsula ventricosa, triangularis, calyce reflexo ad basim cincta. An præcedentis varietas? an *Hyper. perfoliatum* S. N. 510. no. 32? cuius Perill. LINNÆUS nec in Specibus Pl. nec in Mantissa mentionem fecit.

595. *HYPERICUM, perforatum*, floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucidopunctatis. *Linn. Spec. 1105. (Hall. 1037.)*

H. in montosis am *Homburg*, *Dollberg* & alibi copiosissimæ. Floret Julio, Augusto.

Pharm. *HYPERICI* Herba, Flores.

Calycis Foliola lanceolata acuta. Petala oblique truncata, crenulata, puncto atro inter singulam crenam. Stamina phalanges 3. Capsula ovata, acuminata.

596. *HYPERICUM, montanum*, floribus trigynis, calycibus ferrato glandulosis, caule tereti erecto, foliis ovatis glabris. *Linn. S. N. 510. Spec. 1105. (Hall. 1042.)*

H. in sylvaticis montosis am *Homburg über der Lichau* frequens. Floret Julio.

Caulis sesquipedalis, simplex, teres, levis. Folia ovato-oblonga, glabra; margine inferiore punctis atris in lineam ordinatis notata. Calycis Foliola & Bractea Floribus subjecta serrata: serraturis lateralibus setaceis glanduliferis, terminali nulla glandula instructa. Petala obtusa, punctis nullis. Phalanges Filamentorum in primariis Floribus quinque; in superioribus tres. Stigmata purpurea. Capsula ovata, apicibus divaricatis. Semina nigra.

597. *HYPERICUM, bifutum*, floribus trigynis, calycibus ferrato-glandulosis, caule tereti erecto, foliis ovatis subpubescentibus. *Linn. Spec. 1105. (Hall. 1043.)*

H. in dumetis & sepibus am *Homburg* frequens. Floret Julio.

Calycis foliola & non raro Bractea serrata, serraturis omnibus etiam terminalibus glanduliferis. Petala lineolis nigris notata. Punctum sub Antheris in hoc nullum. Capsula ovato-oblonga. Semina rubra.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

A. POLYGAMIA

ÆQUALIS.

* Semifloſculofi T. *Corollis ligulatis omnibus.*

CICHORIUM. G. P. 921.

Receptaculum ſubpaleaceum. *Calyx* calyculatus. *Pappus* ſub 5-dentatus, obſolete piloſus. S. N. 527.

598. CICHORIUM, *Intybus*, floribus geminis ſeſſilibus, foliis runcinatis: *Linn. Spec.* 1142. (*Hall.* 1.)

H. in arvis & verſuris bey der Sandruiefe ; am Reuterberg frequens. Floret Julio & ſeq.

Pharm. CICHORII Radix, Herba, Flores, Semina.

HYPOCHÆRIS. G. P. 918.

Receptaculum paleaceum. *Cal.* ſubimbricatus. *Pappus* plūmoſus. S. N. 526.

599. HYPOCHÆRIS, *glabra*, calycibus oblongis imbricatis, caule ramoſo nudo, foliis dentato-ſinuatis. *Linn. Spec.* 1140. (*Hall.* I. pag. 3. III. p. 181.)

H. in ſylvaticis montofis *hinter Burgk* verſus *Theriotropheum* rarius. Floret Julio.

600. HYPOCHÆRIS, *radicata*, foliis runcinatis obtuſis ſcabris, caule ramoſo nudo lævi, pedunculis ſquamofis. *Linn. Spec.* 1140. (*Hall.* 3?)

H. in pratis pomariis & paſcuis frequens. Floret Julio & ſeq.

TRAGOPOGON. G. P. 905.

Receptaculum nudum. *Calyx* ſimplex. *Pappus* plumoſus. S. N. 518.

601. TRAGOPOGON, *pratense*, calycibus corollæ radi-

radium æquantibus, foliis integris strictis.
Linn. Spec. 1109. (Hall. 8.)

H. in pomariis & pratis passim, ad versuras *am Dollberg* frequens. Floret Junio, Julio.

PICRIS. G. P. 907.

Receptaculum nudum. Cal. calyculatus. Pappus plumosus. Semina transversim sulcata. S. N. 519.

602. PICRIS, *Hieracioides*, perianthiis laxis, foliis integris. *Linn. Spec. 1115. (Hall. 24.)*

H. in campis sterilibus, ad versuras *am Dollberg*; *im Beilstein* copiose; in dünetis *bey der untern Walckmühle* rarius. Floret Julio, Augusto.

LEONTODON. G. P. 912.

Receptaculum nudum. Calyx imbricatus squamis laxiusculis. Pappus plumosus. S. N. 521.

603. LEONTODON, *Taraxacum*, calyce squamis inferne reflexis, foliis runcinatis denticulatis lævibus. *Linn. S. N. 521. Spec. 1122. (Taraxacum. Hall. 56.)*

H. in pratis pascuis & pomariis passim. Floret Majo & sequ. *Pharm. TARAXACI Radix, Herba.*

Pappus *longissime stipitatus, simplex.*

604. LEONTODON, *autumnale*, caule ramoso, pedunculis squamosis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris. *Linn. Spec. 1123. (Picris. Hall. 28.)*

H. in pratis, pomariis, ad versuras passim. Floret Julio & sequ.

Seminum *radialium* Pappus *sessilis, centralium substipitatus.*

605. LEONTODON, *bispidum*, calyce toto erecto, foliis dentatis integerrimis hispidis: feris furcatis. *Linn. S. N. 522. Spec. 1124 (Picris. Hall. 25.)*

H. in pratis & pomariis ubique. Floret æstate.

606. LEONTODON, *hirtum*, calyce toto erecto, foliis dentatis hirtis: feris simplicissimis. *Linn. S. N. 522. Spec. 1123. (Rbagadiolus. Hall. 7.)*

H. in pratis paludosis ad pagum *Sinn* frequens. Floret Julio.

Plan-

Planta *precedenti simillima; sed precipue differt* : Radice *præmorsa*. Foliis *flavo-viridibus, dum sicca, undulato-flexuosis, pilis simplicibus, non furcatis, in petiolo tereti vix depresso longioribus, confertioribusque; dentibus brevioribus, sursum, nec deorsum ut in illa obliquatis*. Scapo *levi, minus manifeste striato, nulla bracteola, uti sapius in precedente, instructo*. Flore *minore*. Ceterum Calyx *lavis, vix basi fetis paucis subhirtus* : Squamis *13 lanceolatis, planiusculis, totidemque exterioribus minimis, basi dilatatis, sursum adpressis constructus*. Corollulæ *extima radii tot quot squama calycis, (13) subius livida, demum flava* : Stigmatibus *extra antheras non prominentibus*. Semen *incrassatum, albidum, vix scabrum, calyculo brevi multidentato, loco pappi, coronatum*.

Corollulæ *interiores duplo minores* : Stigmatibus *revolutis*. Semen *senue, subfuscum, scabrum* : Pappo *sessili, in centralibus sustipitato, instructum* : radiis *13, basi lanceolatis, extrorsum plumosis, alternis totidem brevioribus simplicibus*. Calyx *ante explicationem mutans uti in precedente, peracta florescentia vero, ob semina radii calycinis squamis involuta, subglobosus, angulato-sulcatus, pappo vix prominente, squamis demum patulis non reflexis*. Setas *Foliorum saepe in hoc etiam apice bifidas observabis, si microscopio usus fueris*.

SONCHUS. G. P. 908.

Receptaculum nudum. Calyx imbricatus, ventricosus. Pappus pilosus S. N. 519.

607. SONCHUS, *arvensis*, pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis basi cordatis. *Linn. Spec. 1116. (Hall. 23.)*

H. in agris inter segetes passim. Floret Junio, Julio.

608. SONCHUS, *oleraceus*, pedunculis tomentosis, calycibus glabris. *Linn. Spec. 1116.*

α. Sonchus (*lavis*) laciniatus latifoliis. *Bauh. Pin. 124. (Hall. 21.)*

β. Sonchus (*asper*) laciniatus & non laciniatus. *Bauh. Pin. 124. (Hall. 22.)*

H. α. in cultis oleraceis copiosissime. β. in agris & arvis *am Homberg*, alibique frequens. Floret Julio & sequ.

CREPIS. G. P. 914.

Receptaculum nudum. Calyx calycularis squa-

squamis deciduis. *Pappus pilosus*, (*) stipitatus. S. N. 524.

609. CREPIS, *fætida*, foliis runcinato - pinnatis hirtis, petiolis dentatis. *Linn. Spec.* 1133. (*Hall.* 29.)

H. ad versuras *am Reuterberg*; in arvis *am Dollberg* copiose. Floret Julio, Augusto.

Calyx albidus, ante explicationem nutans. Pappus stipitatus calyce longior. Receptaculum subpilosum.

610. CREPIS, *teflorum*, foliis lanceolato - runcinatis sessilibus lævibus, inferioribus dentatis. *Linn. S. N.* 525. *Spec.* 1135. (*Hall.* 31?)

H. in pascuis & arvis, secus vias ubique frequens. Floret Julio, Augusto.

Pappus sessilis. Planta polymorpha, magnitudine & habitu maxime varians.

611. CREPIS, *biennis*, foliis runcinato - pinnatifidis scabris: basi superne dentatis, calycibus muricatis. *Linn. Spec.* 1136. (*Hall.* 30.)

H. in pratis & pomariis passim. Floret Majo, Junio.

Calycis exterioris squama laeves, interioris sevis nigris rigidis hispida. Pappus sessilis.

PRENANTHES. G. P. 911.

Receptaculum nudum. Calyx calyculatus.

Pappus simplex, subsessilis. Flosculi simplici serie. S. N. 521.

612. PRENANTHES, *muralis*, flosculis quinis, foliis runcinatis. *Linn. Spec.* 1121. (*Hall.* 18.)

H. in sylvaticis umbrosis passim. Floret Julio & sequ.

HIERACIUM. G. P. 913.

Receptaculum nudum. Cal. imbricatus, ovatus. Pappus simplex, sessilis. S. N. 522.

a. *Scapo nudo unifloro.*

613. HIERACIUM, *Pilosella*, foliis integerrimis ovatis subtus tomentosis, stolonibus repentibus, scapo unifloro. *Linn. S. N.* 522. *Spec.* 1125. (*H.* 55.)

H. in campi & collibus siccis passim. Floret Majo & sequ.

Pharm. PILOSELLÆ s. AURICULÆ MURIS. Herba. Corollæ extrema subtus rubra. b. *Scapo*

(*) plumosus, S. N. l. c. ex errore typogr. forte.

b. *Scapo nudo multifloro.*

614. *HIERACIUM, dubium*, foliis integris ovato-oblongis, stolonibus repentibus, scapo nudo multifloro. *Linn. Spec. 1125? (Hall. 53?)*

H. in montosis *am Homberg* frequens. Floret Julio & seq.

Stolones repentes plures, foliati. Folia subtus nuda, supra subpilosa, basi ciliata. Scapus spithameus, levis, nudus. Foliolo ad basin unico lanceolato instructus. Pedunculi umbellares 3 f. 4, simplices, Bracteis totidem brevibus involucrati. Flores (*H. Pilosella*) altitudine subauales. Corollæ utrinque pallide flava.

615. *HIERACIUM, Auricula*, foliis integerrimis lanceolatis, scapo nudo multifloro, stolonibus repentibus. *Linn. S. N. 522. Spec. 1126? (Hall. 52?)*

H. in pascuis pomariis & ad versuras *am Dollberg*; in ruderatis *auf dem Hinterland*. Floret Majo & sequ.

Stolones repentes pauci, subfoliati. Folia lato-lanceolata, subdenticulata, obscure viridia, utrinque scabra. Scapus pedalis, setis nigris ad basin confertioribus undique muricatus. Foliolo unico supra basin instructus: Flores terminales, cymosi, conferti. Pedunculi 5 - f. 6, ramosi, crassiusculi, breves, uti calyces setis basi nigris confertis, inaequalibus adpersi. Corollæ utrinque saturatius flava. Receptaculum subpilosum. Raimo unico florifero ex scapi medio prodeunte, saepe ludis.

616. *HIERACIUM, cymosum*, foliis lanceolatis integris pilosis, scapo subnudo basi piloso, floribus subumbellatis. *Linn. Spec. 1126? (Hall. 51?)*

H. in pascuis arvis & agris *am Homberg* frequens. Floret Junio & Septembri.

Radix premorsa. Stolones nulli. Folia omnia radicalia, erecta, longo lanceolata, acutiuscula, glabra; pagina superiore, carinaeque subpilosa, pilis albidis flexuosis basi purpureis. Scapus sesquipedalis, striatus, fere levis, foliolo lanceolato nudo infra medium instructus. Pedunculi terminales, longiores quam in precedentibus, tenuiores ramosioresque; sub florescentia cymosi, dumtaxat inaequales subpaniculati. Flores magnitudine Crep. tector. Calyx albidus, setis brevibus nigris adpersus. Corollæ utrinque pallide flava.

c. *Caulis*

c. *Caule folioso.*

617. *HIERACIUM, murorum*, caule ramoso, foliis radicalibus ovatis dentatis; caulino minori. *Linn. Spec. 1128. (Hall. 46.)*

α. *Hieracium (pilosissimum)* murorum folio pilosissimo. *Bauh. Pin. 129.*

β. *Hieracium (sylvaticum)* murorum minus pilosum. *Bauh. Pin. 129.*

γ. *Hieracium (myophoron)* myophoron, five mures proferens. *Hench. prov. 2. p. 74. t. I.*

H. α. in muris cæmeterii & urbis; *β.* in sylvaticis ubique; *γ.* in sylvis *im Beilstein; am Rehberg* & alibi frequens. Floret Junio, Julio.

618. *HIERACIUM, paludosum*, caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calycibus hispidis. *Linn. Spec. 1129. (Hall. 45.)*

H. in pratis humidis *im Stübers-Grund; in der Callenbach; hinter dem Homberg* copiose. Floret Junio.

Calyx subcylindricus, setis nigris scaber. Caulis Folia & Pedunculi glabri.

619. *HIERACIUM, sabaudum*, caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis dentatis semiamplexicaulibus. *Linn. Spec. 1131. (Hall. 35.)*

H. in sylvaticis montosis *in der Callenbach; im Beilstein*, alibi que frequens. Floret Julio, Augusto.

620. *HIERACIUM, umbellatum*, foliis linearibus subdentatis sparsis, floribus subumbellatis. *Linn. Spec. 1131. (Hall. 34.)*

H. in pascuis sterilibus *am Homberg, Rehberg*, alibi que. Floret Julio, Augusto.

Calycina foliola planiuscula, apice patula. Receptaculum pilosum uti in precedente. Caule spithameo & bi - f. tripedali; Foliis linearibus & ovato-lanceolatis; integerrimis & subdentatis, maxime ludis.

LAPSANA. G. P. 919.

Receptac. nudum. *Calyx* calyculatus, squamis singulis interioribus canaliculatis. *S. N. 526.*

621. *LAPSANA, communis*, calycibus fructus angulatis,

latis, pedunculis tenuibus ramosissimis. *Linn. Spec.* 1141. (*Hall.* 6.)

H. in ruderatis cultis & arvis frequens. Floret Junio & sequ.

** *Capitati.*

CARLINA. G. P. 929.

Calyx radiatus squamis marginalibus longis, coloratis. S. N. 532.

622. CARLINA, *vulgaris*, caule multifloro corymbofo, floribus terminalibus, calycibus radio albis. *Linn. Spec.* 1161. (*Hall.* 182.)

H. in montosis asperis duris passim. Floret Julio, Augusto. *Anthera singula infra Filamentum, in ligulam apice bifidam producta. Seminis Pappus radiis 9, tripartitis, plumosis.*

CNICUS. G. P. 926.

Calyx ovatus, imbricatus squamis ramoso-spinosis, obvallatus bracteis. *Corollulae* æquales S. N. 530.

623. CNICUS, *oleraceus*, foliis pinnatifidis carinatis nudis, bracteis concavis integris subcoloratis. *Linn. S. N.* 530. *Spec.* 1156. (*Cirsium.* *Hall.* 173.)

H. in pratis humidis; ad ripas *Dilla* alibique vulgaris. Floret Julio. Augusto.

Antherarum appendices minima, bifida, uti in precedente.

ARCTIUM. G. P. 923.

Cal. globosus: squamis apice hamis inflexis. S. 528.

624. ARCTIUM, *Lappa*, foliis cordatis inermibus petiolatis. *Linn. Spec.* 1143. (*Lappa.* *Hall.* 161.)

α. *Lappa* major f. *Arctium* Dioscoridis. *Bauh. Pin.* 198.

β. *Lappa* major montana, capitulis tomentosis. *Bauh. Pin.* 198.

H. α. & β. ad vias in ruderatis auf dem Hinterland, alibi que vulgaris. Floret Julio, Augusto.

Pharm. BARDANÆ Radix, Semina.

CARDUUS. G. P. 925.

Cal. ovatus, imbricatus squamis spinosis. *Recept.* pilosum. S. N. 529.

a. *Foliis decurrentibus.*

625. *CARDUUS*, *lanceolatus*, foliis decurrentibus pinnatifidis hispidis: laciniis divaricatis, calycibus ovatis spinosis villosis, caule piloso. *Linn. Spec.* 1149. (*Cirsium.* Hall. 169.)

H. ad vias & pagos vulgaris. Floret Julio, Augusto.

In hoc & omnibus sequentibus Carduis, appendices Antherarum breves, apice plerumque non bifida, Filamentis pilosis. In hoc Pappus longissimus, plumosus.

626. *CARDUUS*, *nutans*, foliis semidecurrentibus spinosis, floribus cernuis: squamis calycinis superne patentibus. *Linn. Spec.* 1150. (Hall. 167.)

H. ad vias passim. Floret Julio, Augusto.

Pappus pilosus.

627. *CARDUUS*, *crispus*, foliis decurrentibus sinuatis: margine spinosis, floribus aggregatis terminalibus: squamis inermibus subaristatis patulis. *Linn. S. N.* 529. *Spec.* 1150. (Hall. 165.)

H. in dumetis & sepibus bey der untern Papiermühle. Floret Julio, Augusto.

Pappus pilosus.

628. *CARDUUS*, *palustris*, foliis decurrentibus dentatis: margine spinosis, floribus racemosis erectis, pedunculis inermibus. *Linn. Spec.* 1151. (*Cirsium.* Hall. 170.)

H. in pratis udis passim; ad vias bey der untern Walchmühle frequens. Floret Julio, Augusto.

Calycis squama ovata, adpressa, apice spinescenti, subinermi, viscosa. Pappus plumosus. Corollis albis ludit.

b. *Foliis sessilibus.*

629. *CARDUUS*, *marianus*, foliis amplexicaulibus hastato-pinnatifidis spinosis, calycibus aphyllis: spinis canaliculatis duplicato-spinosis. *Linn. Spec.* 1153. (*Silybum.* Hall. 181.)

H. in ruderalis am Kirchhof; in cultis vor dem untern Thor rarius. Floret Julio, Augusto.

Pharm. *CARDUI MARIE* Semina.

630. *CARDUUS*, *acaulis*, *acaulis*, calyce glabro. *Linn. Spec.* 1156. (*Cirsium*. *Hall.* 178.)

H. in pascuis montosis apricis auf dem Stützberg; am Galgenberg frequens. Floret Augusto.

Caulis saepe bipollicaris, folio uno alterove instructus.

Pappus longissimus, plumosus.

ONOPORDUM. G. P. 927.

Recept. favosum. Calycis squamæ mucronatæ. S. N. 531.

631. *ONOPORDUM*, *Acanthium*, calycibus squarrosis: squamis patentibus, foliis ovato-oblongis sinuatis. *Linn. S. N.* 531. *Spec.* 1158. (*Hall.* 159.)

H. in ruderatis, ad vias passim. Floret Julio, Augusto.

SERRATULA. G. P. 924.

Cal. subcylindricus, imbricatus, muticus. S. N. 528.

632. *SERRATULA*, *arvensis*, foliis dentatis spinosis. *Linn. Spec.* 1149. (*Cirsium*. *Hall.* 171.)

H. in agris arvis & cultis, ad vias passim. Floret Julio, Augusto.

Pappus plumosus, Recept. pilosum.

Variat Corollis purpureis & albidis; a) Calyce majori, magis cylindrico: corollulis minimis, saturatius purpureis; Stigmatibus patentissimis. b) Calyce ovato-oblongo, corollulis duplo majoribus, pallidioribus, Stigmatibus subbifidis, erectis.

*** *Discoidei.*

EUPATORIUM. G. P. 935.

Receptaculum nudum. Pappus plumosus. Calyx imbricatus, oblongus. Stylus semibifidus, longus. S. N. 536.

633. *EUPATORIUM*, *cannabinum*, foliis digitatis. *Linn. Spec.* 1173: (*Hall.* 136.)

H. fecus rivulos in pascuis sylvaticis im Beilstein copiosissime; in dumetis bey der untern Walckmühle rarius. Floret Julio, Augusto.

Pharm. EUPATORII Herba.

Pappus capillaris, radiis flexuosis, simplicibus, nec plumosis.

BIDENS.

BIDENS. G. P. 932.

Receptac. paleaceum. *Pappus* aristis erectis, scabris. *Calyx* imbricatus. *Cor.* rarius flosculo uno alterne radiante instruitur. S. N. 534.

634. BIDENS, *tripartita*, foliis trifidis, calycibus subfoliosis, feminibus erectis. *Linn. Spec.* 1165. (*Hall.* 121.)

H. in fossis passim; an der Mühlbach copiose. Floret Julio, Augusto.

635. BIDENS, *cernua*, foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis, feminibus erectis. *Linn. Spec.* 1165. (*Hall.* 120.)

H. similibus in locis cum præcedente rarius; bey der obern Walckmühle; auf dem Sänrviesgen; auf der Burgermeister-Wiese frequens. Floret Julio, Augusto.

Corollulæ octo in ambitu disci sui centrales Hermaphroditæ, Tubo tamen semper ventricosiore depresso, locis diutius inundatis in Corollulas ligulatas neutras transeunt. Vid. COREOPS. *Bidens*.

B. POLYGAMIA SUPERFLUA.

* *Discoidei.*

ARTEMISIA. G. P. 945;

Recept. subvillosum vel nudiusculum. *Pappus* nullus. *Cal.* imbricatus squamis rotundatis; conniventibus. *Corollæ* radii nullæ. S. N. 541.

636. ARTEMISIA, *Abinthium*, foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis: receptaculo villoso. *Linn. Spec.* 1188. (*Abinthium.* *Hall.* 124.)

H. in cultis & ruderatis passim. Floret Julio, Augusto.

Pharm. ABSINTHII VULGARIS Herba:

Corollulæ Radii circiter 15, femineæ, nudæ.

637. ARTEMISIA, *vulgaris*, foliis pinnatifidis planis incisis subtus tomentosis, racemis simplicibus recur-

recurvatis, floribus ovatis: radio quinquefloro.
Linn. S. N. 542. Spec. 1188. (Artemisia, Hall. 130.)

H. in rudèratis, ad vias *auf dem Hinterland*, alibique copiose.
 Floret Julio, Augusto.

Pharm. ARTEMISIE ALBÆ & RUBRÆ Herba.

TANACETUM. G. P. 944.

Receptaculum nudum. Pappus submarginatus. Cal. imbricatus, hemiiphæricus.

Cor. radii obsoletæ, 5-fidæ. S. N. 541.

638. TANACETUM, *vulgare*, foliis bipinnatis incis ferratis. *Linn. Spec. 1184. (Hall. 132.)*

H. ad versuras & margines pratorum, in rudèratis passim.
 Floret Julio, Augusto.

Pharm. TANACETI Herba, Semina.

CONYZA. G. P. 950.

Recept. nudum. Pappus simplex. Cal. imbricatus, subrotundus. Cor. radii trifidæ. S. N. 547.

639. CONYZA, *squarrosa*, foliis lanceolatis acutis, caule herbaceo corymbofo, calycibus squarrosis.
Linn. S. N. 547. Spec. 1205. (Hall. 135)

H. in moistosis siccis apricis *am Dollberg; Homberg; im Beilslein* frequens. Floret Julio, Augusto.

GNAPHALIUM. G. P. 946.

Recept. nudum. Pappus plumosus. Cal. imbricatus: squamis marginalibus rotundatis scariosis, coloratis. S. N. 543.

a. Argyrocoma, s. calycibus albis.

640. GNAPHALIUM, *dioicum*, sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, corymbo simplici, floribus dioicis. *Linn. S. N. 545. Spec. 1199. (Filago. Hall. 157.)*

α. Gnaphalium (Mas) montanum flore rotundiore. Bauh. Pin. 263.

β. Gnaphalium (Femina) montanum longiore & folio & flore. Bauh. Pin. 263.

H. α . & β . in collibus & sterilibus montosis *am Homberg*,
Dollberg & Rehberg copiose. Floret Majo, Junio.
 Feminae *flosculi etiam corollati*: Tubo tenui, *superne purpureo*,
 Limbo 5-fido-erecto. Pappus *vix plumosus, in Mare radiis*
apice incrassatis.

Pharm. GNAPHALII Flores.

b. *Filaginoides f. calycibus cinereis.*

641. GNAPHALIUM, *sylvaticum*, caule herbaceo simplicissimo erecto, floribus sparsis. *Linn. S. N. 545. Spec. 1200. (Filago. Hall. 148.)*

H. in sylvaticis montosis *am Beilstein* copiose; *im Guldnersgrund* rarius. Floret Julio, Augusto.

Corollulae hermaphroditae 3 f. 5 *in centro disci*; Femineae numerosa *in ambitu*: Tubo tenui, Limbo 5-fido erecto instructa. Pappus capillaris, simplex.

642. GNAPHALIUM, *uliginosum*, caule herbaceo ramoso diffuso, floribus confertis terminalibus. *Linn. S. N. 545. Spec. 1200. (Filago. Hall. 151.)*

H. in stagnis, locis inundatis *auf aem Schießplatz*, & alibi frequens. Floret Julio, Augusto.

Calyces *basi tomentosi, squamis acutiusculis fuscis, demum nigris.*
 Corollulae hermaphroditae *paucae in disco*; Femineae *plures in ambitu, tubulosa*, Limbo 5-fido. Pappus *radium tantum seu brevibus deciduus constat.*

** Radiati.

BELLIS. G. P. 962.

Recept. nudum, conicum. Pappus nullus.

Cal. hemisphaericus: squamis aequalibus.

Semina obovata. S. N. 560.

643. BELLIS, *perennis*, scapo nudo. *Linn. Spec. 1248. (Hall. 93.)*

H. in pascuis pratis & pomariis. ubique. Floret toto fere anno.

Pharm. BELLIDIS MINORIS Herba. Flores.

MATRICARIA. G. P. 967.

Recept. nudum. Pappus nullus. Cal. hemisphaericus, imbricatus: squamis marginalibus solidis, acutiusculis. S. N. 563.

644. MATRICARIA, *Partbenium*, foliis compositis planis: foliolis ovatis incis, pedunculis ramosis. *Linn. Spec. 1255. (Hall. 100.)*

H.

H. in ruderatis auf dem Hinterland; in cultis am Sieghaus; ad sepes passim. Floret Julio, Augusto.

Pharm. MATRICARIÆ Herba, Flores.

645. MATRICARIA, *suaveolens*, receptaculis conicis, radiis deflexis, squamis calycinis margine æqualibus. Linn. S. N. 563. Spec. 1256.

H. in agris ad pagum Sinn; in der Aue rarius. Floret Julio, Augusto.

646. MATRICARIA, *Chamomilla*, receptaculis conicis, radiis patentibus, squamis calycinis margine æqualibus. Linn. S. N. 563. Spec. 1256. (Hall. 101.)

H. in agris præsertim fecalinis ubique copiosissime. Floret Majo & sequ.

Pharm. CHAMOMILLÆ VULGARIS Flores.

CHRYSANTHEMUM. G. P. 966.

Recept. nudum. Pappus marginatus. Calyx hemisphæricus, imbricatus: squamis marginalibus membranaceis. S. N. 561.

1. *Leucanthema*.

647. CHRYSANTHEMUM, *Leucanthemum*, foliis amplexicaulibus oblongis: superne ferratis; inferne dentatis. Linn. Spec. 1251. (Matricaria. Hall. 98.)

H. in pomariis & pratis passim. Floret Junio, Julio.

Pharm. BELLIDIS MAIORIS Herba.

648. CHRYSANTHEMUM, *inodorum*, foliis pinnatis multifidis, caule ramoso diffuso. Linn. Spec. 1253.

H. in agris & cultis in der untern Pitze; in ruderatis bey dem dicken Thurm; am Dollberg rarius. Floret Julio, Augusto.

Flores quam in C. *Leucanth.* paulo minores. Calyx plano-convexus: squamis interioribus margine membrana fusca scariosa undulata auctis. Flosculi radii 13-15. Semina tetragona, atra, angulis eburneis, apice 4-dentata. Receptaculum ovato-oblongum, intus cavum.

649. CHRYSANTHEMUM, *corymbosum*, foliis pinnatis inciso-ferratis, caule multifloro. Linn. Spec. 1251. (Pyrethrum. Hall. 95.)

H. in sylvis im Beilstein; am Homberg, alibique frequens. Floret Julio, Augusto.

Semina tetragona, Calyculo tubuloso, oblique truncato, denticulato, coronata.

b. *Chrysanthemum*.

650. *CHRYSANTHEMUM*, *segetum*, foliis amplexicaulibus: superne laciniatis; inferne dentato-feratis. *Linn. Spec.* 1254.

H. inter segetes; in cultis, ruderalis, ad vias passim. Floret Julio, Augusto.

ARNICA. G. P. 958.

Recept. nudum. *Pappus* simplex. *Corollula* radii filamentis 5 absque antheris. S. N. 559.

651. *ARNICA*, *montana*, foliis ovatis integris: caulinis geminis oppositis. *Linn. Spec.* 1245. (*Hall.* 89.)

H. in pratis siccis circa pagos *Mademühlen*; *Roth*; alibique frequens; in pratis *am Rehberg* rarius. Floret Julio.

Pharm. ARNICAE Herba, Flores.

Calyceis foliola 20, ordine duplici: exteriora subcarinata, hirsuta, viscosa; interiora alterna linearia, laevia. *Corollula* radii tot quot calycis foliola, quinque-sulcata, apice tridentata. Filamenta 3-4, rarius 5, inaequalia, sulcis respondentia, faucis subo inserta. Semen Hermaphroditii angulato-cylindricum, sursum pilosum, Pappo capillari coronatum. Femina Semen angulo unico planiore, Pappo similimo instructum.

INULA. G. P. 956.

Recept. nudum. *Pappus* simplex. *Antheræ* basi in setas duas desinentes. S. N. 557.

652. *INULA*, *Helenium*, foliis amplexicaulibus ovatis rugosis: subtus tomentosis, calycum squamis ovatis. *Linn. Spec.* 1236. (*Aster. Hall.* 72.)

H. in pomariis & ad margines agrorum *am Dollberg*. Floret Julio, Augusto.

Pharm. HELENII s. ENULAE Radix.

Radix *Corollula* acute tridentata, nec integra.

653. *INULA*, *Pulicaria*, foliis amplexicaulibus undulatis, caule prostrato, floribus subglobosis: radio brevissimo. *Linn. S. N.* 558. *Spec.* 1238. (*Aster. Hall.* 80.)

H. in

H. in inundatis *anf dem Schiesplatz* copiose; *auf dem Siu-uviesgen* rarius. Floret Julio, Augusto.

Radii Corollulæ *Limbo brevissimo, tridentato.*

Seminum Pappus radiis tantum sex constat, mox deciduis.

ERIGERON. G. P. 951.

Recept. nudum. Pappus pilosus. Cor. radii lineares, angustissimæ. S. N. 549.

654. ERIGERON, *canadense*, caule floribusque paniculatis. *Linn. Spec. 1210. (Hall. 84.)*

H. in agris inter Solanum tuberosum, temel lectum *am Dollsberg.* Floret Augusto.

Caulis bipedalis, sulcatus, setis albidis rectis hirtus. Folia radicalia ovato-lanceolata, trinervis, subferrata: Caulina sparsa, patentissima, lineari-lanceolata, ciliata. Corollulæ

Disci *Limbo 4-fido, patulo: Stigmatibus apice conniventibus.*

Cor. Radii acute bidentata, Stigmatibus longis, patentissimis.

655. ERIGERON, *acre*, pedunculis alternis unifloris. *Linn. Spec. 1211. (Hall. 85.)*

H. in ficis glareosis *am Homberg; Dollberg; auf dem Schiesplatz, & alibi frequens.* Floret Julio, Augusto.

Floris corollulæ triplices: a, Disci centrales pauci hermaphroditi: *Limbo 5-fido, calyce breviores.* b, Disci laterales numerosi femineæ: *Tubo tenui; Limbo oblique truncato, longitudine calycis.* c, Radii plures femineæ, ligulata, erecta: *Limbo bidentato, calyce longiores. Omnium Styli altitudine inter se & Pappo aequales.*

SOLIDAGO. G. P. 955.

Recept. nudum. Pappus simplex. Cor. radii circiter 5. Calycis squamæ imbricatæ, clausæ. S. N. 556.

656. SOLIDAGO, *Virga aurea*, caule subflexuoso angulato, racemis paniculatis erectis confertis. *Linn. Spec. 1235. (Hall. 69.)*

H. in sylvaticis montosis *am Homberg*, alibique. Floret Julio, Augusto.

Corollulæ radii *sapius 6-7; disci 9-10. Stigmata apice conniventia.*

SENECIO. G. P. 953.

Recept. nudum. Pappus simplex. Cal. cylindricus, calyculatus: squamis apice spha- celatis. S. N. 550.

a. *Floribus flosculosis.*

657. *SENECIO, vulgaris*, corollis nudis, foliis pinnato-sinuatis amplexicaulibus, floribus sparsis. *Linn. Spec. 1216. (Hall. 58.)*

H. in cultis inter olera, vitium ubique vulgarissimum. Floret toto fere anno.

Pharm. *SENECIONIS* Herba.

b. *Floribus radiatis: radio revoluta.*

658. *SENECIO, viscosus*, corollis revolutis, foliis pinnatifidis viscidis, squamis calycinis laxis longitudine perianthii. *Linn. Spec. 1217. (Hall. 60.)*

H. in cultis & ruderalis auf dem Hinterland; in muris cæmeterii & urbis frequens. Floret Julio, Augusto.

659. *SENECIO, sylvaticus*, corollis revolutis, foliis pinnatifidis denticulatis, caule corymbofo erecto. *Linn. Spec. 1217. (Hall. 59.)*

H. in sylvis in der Hoerre copiose. Floret Julio.

c. *Floribus radiatis: radio patente, foliis pinnatifidis.*

660. *SENECIO, erucifolius*, corollis radiantibus, foliis pinnatifidis dentatis subhirtis, caule erecto. *Linn. Spec. 1218. (Hall. 62. var. δ.)*

H. ad margines agrorum am Dollberg; Homberg; & alibi frequens. Floret Julio, Augusto.

661. *SENECIO, Jacobæa*, corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis, caule erecto. *Linn. Spec. 1219. (Hall. 62. var. α.)*

H. iisdem in locis cum præcedente. Floret Julio, Augusto.

d. *Floribus radiatis: radio patente, foliis indivisis.*

662. *SENECIO, saracenicus*, corollis radiantibus, floribus corymbosis, foliis lanceolatis ferratis glabriusculis. *Linn. Spec. 1221. (Hall. 65.)*

H. in dumetis auf der Weißgerberwiese; auf der Sandwiese; in sylvis im Keilstein frequens. Floret Julio, Augusto.

Pharm. *CONSOLIDÆ SARACENICÆ* Herba.

TUSSILAGO, G. P. 952.

Recept. nudum. Pappus simplex. Calycis squa-

squamæ æquales, discum æquantes, submembranaceæ. S. N. 550.

663. TUSSILAGO, *Farfara*, scapo unifloro imbricato, foliis subcordatis angulatis denticulatis. *Linn. Spec. 1214. (Petasites. Hall. 143.)*

H. in agris argillofis humentibus in der Aue frequens. Floret Aprili.

Pharm. TUSSILAGINIS f. FARFARÆ Radix, Herba, Flores.

Corollulæ Radii integerrima.

664. TUSSILAGO, *hybrida*, thyrso oblongo, flosculis femineis nudis plurimis. *Linn. Spec. 1214. (Petasites. Hall. 140.)*

H. in pratis humidis unter der neuen Brücke; bey der untern Walkmühle; auf der Pfingstweide copiose. Floret Aprili.

Corollulæ femineæ numerosa, apice bifida. Hermaphroditæ vix 3-5, in centro disci.

665. TUSSILAGO, *Petasites*, thyrso ovato, flosculis femineis nudis paucis. *Linn. S. N. 550. Spec. 1215. (Petasites. 138.)*

H. cum præcedente copiosissime. Floret Aprili.

Corollulæ femineæ in nostrate penitus nulla. Pappus in hac & præcedentibus sessilis, nec stipitatus.

ANTHEMIS. G. P. 970.

Recept. palaceum. Pappus nullus. Cal. hemisphæricus, subæqualis. Flosculi radii plures quam 5. S. N. 565.

2. Radio discolore f. albo.

666. ANTHEMIS, *arvensis*, receptaculis conicis: paleis setaceis, feminibus coronato-marginatis. *Linn. Spec. 1261. (Chamæmelum. Hall. 103.)*

H. in agris arvis & cultis passim. Floret Junio & sequ.

Radix biennis. Caules plures, prostrati, diffusi. Folia canescentia. Pedunculi longi, angulato-sulcati, pubescentes. Calycis squama ovato-lanceolata: interiores ovata, membrana scariosa aucta. Semina laevia, subtetragona, 10-sulcata, apice incrassata, centro excavata, gibberibus 10 coronata. Receptaculum ovatum: Paleæ lanceolata, carinata, acuminata. Planta aliquem habet odorem, minus samentem quam in sequente.

667. *ANTHEMIS*, *Cotula*, receptaculis conicis: paleis setaceis, feminibus nudis. *Linn. Spec.* 1261. (*Chamæmelum*. *Hall.* 104.)

H. in arvis ruderatis & cultis ubique. Floret Julio & sequ.
Radix annua, Caulis unicis, erectus, Folia larva, Pedunculi striati.
Calycis squame lineares, margine vix ullo. Semina obovata, striata pubescentia, apice contracto, vix poro excavato, nudo. Receptaculum oblongum: Paleæ setaceæ, angustissimæ. Planta foetida.

- 668 *ANTHEMIS*, *tinctoria*, foliis bipinnatis ferratis subtus tomentosis, caule corymbofo. *Linn. Spec.* 1263. (*Chamæmelum*. *Hall.* 105.)

β. *Biphthalmum alpinum* florē candido. *Triumph.* obs. 79.
t. 80.

H. α, in sterilibus ficcis, inque muris & ruderatis passim.
β, Floribus minoribus, Radio albo, infra medium flavescente: *am. Dollberg & auf dem Schiesplatz* rarius.
Floret Julio, Augusto.

ACHILLEA. G. P. 971.

Recept. paleaceum. *Pappus* nullus. *Calyx* ovatus, imbricatus. *Flosculi* radii circiter 5. S. N. 566.

669. *ACHILLEA*, *Ptarmica*, foliis lanceolatis acuminatis argute ferratis. *Linn. Spec.* 1266. (*Hall.* 117.)

H. ad fossas, in pratis humidis ubique. Floret Julio, Augusto.

Pharm. *PTARMICAE* Herba, Flores.

670. *ACHILLEA*, *Millefolium*, foliis bipinnatis nudis; lacinii linearibus dentatis, caulibus superne sulcatis. *Linn. S. N.* 567. *Spec.* 1267. (*Hall.* 107.)

β. *Millefolium purpureum majus*, *Bauh. Pin.* 140.

H. α, in pascuis ficcis, ad versuras passim; β. in graminosis *auf dem Hintersand; auf der Sandviese*. Floret Julio & sequ.

Pharm. α. *MILLEFOLII* Herba, Flores.

671. *ACHILLEA*, *nobilis*, foliis bipinnatis: inferioribus nudis planis, superioribus obrutis tomentosis, corymbis convexis confertissimis. *Linn. Spec.* 1268. (*Hall.* 109.)

H. in

H. in montosis aridis apricis circa *Aslar & Werdorff*. Floret Julio. †

Plantam hanc ipse nondum legi.

C, P O L Y G A M I A F R U - S T R A N E A.

CENTAUREA. G. P. 984.

Recept. setosum. *Pappus* simplex. *Cor.* radii infundibuliformes, longiores, irregulares. S. N. 572.

672. CENTAUREA, *Cyanus*, calycibus ferratis, foliis linearibus integerrimis; infimis dentatis. *Linn.* *Spec.* 1289. (*Cyanus*. *Hall.* 191.)

H. in agris inter segetes passim. Floret Junio, Julio.

Pharm. CYANI Flores.

673. CENTAUREA, *Scabiosa*, calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis: pinnis lanceolatis. *Linn.* *Spec.* 1291. (*Cyanus*. *Hall.* 186.)

H. in montosis sterilibus frequens. Floret Julio.

674. CENTAUREA, *Jacea*, calycibus scariosis laceris, foliis lanceolatis: radicalibus sinuato-dentatis, ramis angulatis. *Linn.* *Spec.* 1293. (*Rhaponticum*. *Hall.* 195.)

H. in pratis siccis ubique. Floret Julio, Augusto.

Pappus setis brevissimis, paucis, mox deciduis, constat.

RUDBECKIA. G. P. 980.

Recept. paleaceum, conicum. *Pappus* margine 4-dentato. *Calyx* duplici ordine squamarum. S. N. 570.

675. RUDBECKIA, *laciniata*, foliis compositis laciniatis. *Linn.* *Spec.* 1279.

H. in salicetis, ad ripas Dillæ auf der *Bürgermeisterwiese*; semel lecta, nec iterum reperta; forte aliunde ex hortis aufuga fluminisque inundatione advecta. Floret Julio & sequ.

COREOPSIS. G. P. 981.

Recept. paleaceum. *Pappus* bicornis. *Cal.* erectus, polyphyllus, basi radiis patentibus cinctus. S. N. 570.

676. COREOPSIS, *Bidens*, foliis lanceolatis serratis oppositis amplexicaulibus. Linn. Spec. 1281. (*Bidens*. Hall. 120. β.)

H. in fossis & locis inundatis an der Mühlbach; bey der obern Walkmühle; alibique alternis annis plus minusve frequens. Floret Julio, Augusto.

Caulis altior, erectior, minusque ramosus; Folia lasiora, longius acuminata, argutius serrata, basi manifestius connata, quam in *Bidente* cernua. Florum radio excepto, omnibus in reliquis partibus cum ea convenit. Calyx exterior pentaphyllus, radio paulo longior: Foliolis lanceolatis, integris, subciliatis. Calyx interior erecto-patens: squamis octo planis, glabris, striatis, margine flavis. Disci corollulae hermaphrodita, & Semina quadri-aristata: aristis duabus alternis brevioribus, uti in illa. Radii Corollulae vero octo neutra, squamis calycinis opposita, ovali-oblonga, plana, patentes, flava; supra novem-fulcata, subtus binervata, apice bi- & tridentata, saepe integerrima: Tubo brevi; Germinibus inermi, sterili; Stylo nullo instructa. Quoniam inter has saepe observatur Corollula una alterave tubulosa hermaphrodita: Limbo 5-fido, Stylo Staminaque imperfectis instructa, ceteroquin Corollulis octo in *Bidentis* cernua ambitu memoratis simillima, extra dubium esse patet: Plantam hanc ab illa minime esse diversam, solo Floris radio vero, singulari artificio Natura, diversissimam evadere. Causa huius metamorphoseos in loco natali diutius inundato certe latet: quia aestate humida post diurnas pluvias, diversis in locis, ubi simplici Flore provenire solebat, mere flores radiatos, ac ne unicum quidem absque radio, in numerosis plantis reperire potui; aestate sicciori vero, simplici flore non radiato. iisdem in locis semper, semel tantum flores radiatos & non radiatos in eadem planta observavi.

D. POLYGAMIA NECESSARIA.

FILAGO. G. P. 995.

Recept. nudum. Pappus nullus. Cal. imbricatus. Flosculi feminei inter squamas calycis locati. S. N. 580.

677. FILAGO, *germanica*, panicula dichotoma, floribus rotundatis axillaribus hirsutis; foliis acutis. Linn. Spec. 1311. (Hall. 153.)

H. in sterilibus arenosis auf dem Stüzelberg; auf dem Schiessplatz; alibique vulgaris. Floret Julio, Augusto. Caulis

Caulis *didrachmalis*, erectus, foliatus, albido-tomentosus, basi ramosus. Capitulum terminale globosum, ex pluribus floribus arte congestis compositum; sub quo dein rami duo oppositi rarius tres nascuntur, semilibus Capitulis terminati; sic divisione ramorum simili modo repetita, caulis tandem dichotomo-brachiatus fit, ramis horizontalibus, & capitula antea terminalia demum axillaria evadunt. Flores pentagoni, basi tomentosi: squamis calycinis ovato acuminatis, interioribus aristatis, coloratis, nitidis. In hac Specie & duabus sequentibus triplices flosculos in singulo Flore, omnes corollatos, observo:

- a. Disci centrales 2. s. 3. hermaphroditi, tubulosi: Limbo 4-fido, patente; Stigmatibus erecto-patulis, longitudine Limbi; Germine exiguo, abortiente, Pappo brevi simplici instructo.
- b. Disci laterales numerosi, feminei: Tubo tenui basi tumido; Limbo 4-fido, erecto; Stigmatibus patulis, Limbo longioribus; Semine fertili, Pappo simili coronato.
- c. Flosculi inter squamas Calycis exteriores 5 s. 7, feminei, etiam corollati: Tubo tenuissimo, vix armatis oculis conspicuo; Limbo bifido, acuto: Stylo limbo longiore; Stigmatibus longis patentibus; Semine oblongo fertili, Pappo nullo.

678. *FILAGO, montana*, caule subdichotomo erecto, floribus conicis terminalibus axillaribusque. *Linn. S. N. 580. Spec. 1311. (Hall. 155.)*

H. in arvis & campis arenosis am Dollberg; Hemberg; alibique vulgaris. Floret Julio, Augusto.

679. *FILAGO, arvensis*, caule paniculato, floribus conicis lateralibus. *Linn. Spec. 1312. (Hall. 154.)*

H. in campis aridis sabulosis ubique. Floret Julio, Augusto. Hujus Semen hermaphroditi Pappo destitutum. In hac & antecedente Flosculi triplices, omnes corollati, uti in *F. germanica*.

CALENDULA. G. P. 990.

Receptac. nudum. Pappus nullus. Cal. polyphyllus, æqualis. Sem. disci membranacea. S. N. 577.

680 *CALENDULA, officinalis*, seminibus cymbiformibus muricatis incurvatis omnibus. *Linn. Spec. 1304.*

H. in

H. in cultis *am Sieghaus*; *auf dem Hinterland* rarius. Floret Julio, Augusto.

Pharm. CALENDULÆ Flores.

E. MONOGAMIA.

JASIONE. G. P. 1005.

Cal. communis 10 - phyllus. *Cor.* 5 - petala, regularis. *Caps.* infera, bilocularis.

S. N. 582.

681. *JASIONE, montana.* Linn. Spec. 1317. (*Rapunculus.* Hall. 678.)

H. in collibus apricis ficcis passim, *am Rehberg*; *Galgenberg*; alibique copiose. Floret Julio, Augusto.

Calyx constanter icosisphyllus; *Foliolis* quatuor serierum subserratis, exterioribus gradatim majoribus. *Antheræ* ante pertusionem *Stigmatis* fere coalita, demum evacuato polline patentes, basi coherentes. *Flosculi* Disci centrales steriles: *Stigmate* clavato integerrimo, polline adperso, nec villosò; *Capsulis* brevius pedicellatis, nunquam ad maturitatem pervenientibus. *Flosculi* laterales numerosiores fertiles: *Stigmate* clavato demum bifido. Quoniam horum *Antheræ*, tempore ruptionis *Stigmatibus*, Polline evacuata sunt, verisimile esse patet, *Stigmata* a Polline superiorum *Antherarum* facundari. *Styli* superiorum *flosculorum* omnes erecti; inferiorum fertiliorum vero declinati, *Stigmata* pro faciliiori Pollinis receptione sursum porrigentes.

VIOLA. G. P. 1007.

Cal. 5 - phyllus. *Cor.* 5 - petala, irregularis, postice cornuta. *Caps.* supera, 3 - valvis, 1 - locularis. S. 584.

a. Acaules.

682. *VIOLA, hirta*, acaulis, foliis cordatis pilosis hispidis. Linn. Spec. 1324. (Hall. 559.)

H. in sylvaticis *im Beilstein*; in dumetis & sepibus *am Rehberg* & *Homburg* frequens. Floret Majo, Junio.

Capiula subglobosa, tricarinata, hirta, nutans, terram petens.

683. *VIOLA, odorata*, acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptantibus. Linn. Spec. 1324. (Hall. 558.)

H. in pomariis, locis pinguibus umbrosis frequens. Floret Martio, Aprili.

Pharm.

Pharm VIOLARIÆ Herba; VIOLÆ Flores, Sethina.

Hujus Prolem hybridam semel legi loco umbroso *am Homberg*:
Floribus *majoribus, campanulatis*; Petalis *fere aequalibus conni-*
ventibus, omnibus basi calcaratis, *Aquilegiæ Flores, demum*
petalis, referentibus, VIOLÆ PELORIA?

b. *Caulescentes.*

684. *VIOLA, canina*, caule adultiore adscendente,
foliis oblongo - cordatis. *Linn. Spec. 1324.*
(*Hall. 563.*)

H. in pascuis sylvaticis, ad sepes ubique. Floret Aprili,
Majo.

Hujus varietatem singularem legi in *sylvis in der Hoerra*:
Caule *dedranti erecto*. Foliis *obtusioribus, scabrisculis*. Flo-
ribus *radicalibus primo vere nullis; caulinis inferioribus omnibus*
sterilibus: Petalis *Antheris Germineque quidem instructis,*
ut in V. canina, Stigmate vero semper imperfecto, capitato,
setis sursum versis hirs. Floribus *superioribus omnibus ferti-*
libus: at *apetalis, vel vix rudimentis Petalorum minimis in-*
structis; Antheris *nullis*; Pistillo *perfecto, mox in Capsulam*
intumescense V. Canina simillimam. Ad *Violam mirabilem*
accederet, nisi Stipula serrato - ciliata, & Flores inferiores ma-
gnitudine, colore, odorisque defectu, Violæ canina essent
simillimi.

c. *Stipulis pinnatifidis; Stigmate urceolato.*

685. *VIOLA, tricolor*, caule triquetro diffuso, foliis
oblongis incis, stipulis pinnatifidis. *Linn.*
S. N. 589. Spec. 1326.

α. *Viola bicolor arvensis. Bauh. Pin. 200. (Hall. 569.)*

β. *Viola tricolor hortensis repens. Bauh. Pin. 299. (Hall.*
568.)

H. α. in cultis & agris ubique copiose; β. in cultis *auf der*
Schafdille. Floret ætate.

In Var. α, Petala *vix calycis longitudine, sapine breviora.*

IMPATIENS. G. P. 1008.

Cal. 2-phyllus. Cor. 5-petala, irregula-
ris, nectario cucullato. Caps. supera, 5-
valvis. S. N. 586.

686. *IMPATIENS*, *noli tangere*, pedunculis multifloris solitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus. *Linn. Spec.* 1329. (*Hall.* 557.)

H. in nemorosis subhumidis ad *Erbach* copiose; im *Beilstein*; an der *Mühlbach* alibique frequens. Floret Julio.

Squamæ duæ, ovata, minima, ad basin Petali superioris, Calyce sessæ: quid?

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

A. DIANDRIA.

ORCHIS. G. P. 1009.

Nectarium corniforme pone florem. S. N. 589.

a. *Bulbis indivisis.*

687. *ORCHIS*, *bifolia*, bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato integerrimo: cornu longissimo, petalis patentibus. *Linn. Spec.* 1331. (*Hall.* 1285.)

β. *Orchis trifolia minor.* *Bauh. Pin.* 83.

H. α, in sylvaticis montosis am *Beilstein* & *Homberg*; β, floribus duplo minoribus, odoratissimis, calcaribus filiformibus: in pratis siccis am *Rehberg* copiose. Floret Majo, Junio.

688. *ORCHIS*, *Morio*, bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuso adscendente, petalis obtusis conniventibus. *Linn. S. N.* 589, *Spec.* 1333. (*Hall.* 1282.)

H. in pomariis am *Sieghaus* rarius; in pratis siccis am *Rehberg* frequens. Floret Majo.

689. *ORCHIS*, *mascula*, bulbis indivisis, nectarii labio quadrilobo crenulato: cornu obtuso, petalis dorsalibus reflexis. *Linn. Spec.* 1333. (*Hall.* 1283.)

H. in pratis sylvaticis *hinter dem Homberg*; & alibi frequens. Floret Majo, Junio.

Pharm. SATYRI Radix.

690. ORCHIS, *ustulata*, bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido punctis scabro: cornu obtuso, petalis distinctis. *Linn. Spec. 1333. (Hall. 1273.)*

H. in montosis muscosis *am Rehberg* rarius. Floret Junio.
b. *Bulbis palmatis.*

691. ORCHIS, *latifolia*, bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu conico: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus. *Linn. Spec. 1334. (Hall. 1279.)*

H. in pratis humidis passim. *Foliis maculatis, & non maculatis* ludit. Floret Majo.

692. ORCHIS, *maculata*, bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus brevioribus: labio plano, petalis dorsalis erectis. *Linn. S. N. 590. Spec. 1335. (Hall. 1278.)*

H. in pratis sylvaticis *am Rehberg* copiose. Floret Majo, Junio.

Bractæ *subserrulatae*. Labii *lacinia intermedia minor, integerrima, acuta.*

693. ORCHIS, *odoratissima*, bulbis palmatis, nectarii cornu recurvo brevioribus: labio trilobo, foliis linearibus. *Linn. S. N. 590. Spec. 1335. (Hall. 1274.)*

H. in pratis siccis *am Rehberg*. Floret Junio.

694. ORCHIS, *conopsea*, bulbis palmatis, nectarii cornu fetaceo germinibus longioribus: labio trifido, petalis duobus patentissimis. *Linn. Spec. 1335. (Hall. 1287.)*

H. in pratis montosis *am Rehberg*; & alibi frequens. Floret Majo, Junio.

c. *Bulbis fasciculatis.*

695. ORCHIS, *abortiva*, bulbis fasciculatis filiformibus, nectarii labio ovato integerrimo, caule aphyllis. *Linn. S. N. 591. Spec. 1336. (Epipactis. Hall. 1288.)*

H. in sylvis, *im Schoenbacher Wald* rarius. Floret Majo. †.

OPHRYS.

OPHRYS. G. P. 1011.

Nectarium subtus tubcarinatum. S. N. 592.

696. OPHRYS, *Nilus avis*, bulbis fibroso-fasciculatis, caule vaginato aphylo, nectarii labio bifido. *Linn. S. N. 592. Spec. 1339. (Epipactis. Hall. 1290.)*

H. in nemorosis ad *Schoenbach*; im *Hirschberg* copiose; in pratis sylvaticis am *Rehberg* rarius. Floret Majo, Junio.

697. OPHRYS, *ovata*, bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio bifido. *Linn. Spec. 1340. (Epipactis. Hall. 1291.)*

H. in pratis sylvaticis am *Rehberg* frequens; in pomariis passim parcius. Floret Majo, Junio.

SERAPIAS. G. P. 1012.

Nectarium ovatum, gibbum, labio ovato. S. N. 593.

698. SERAPIAS, *latifolia*, bulbis fibrosis, foliis ovatis amplexicaulibus, floribus pendulis. *Linn. S. N. 593. S. Helleborine. n. Spec. 1344. (Epipactis. Hall. 1297.)*

H. in pratis humidis ad pagos *Schoenbach*, *Driedorff* & *Roth*. Floret Junio, Julio.

699. SERAPIAS, *longifolia*, bulbis fibrosis, foliis ensiformibus sessilibus, floribus pendulis. *Linn. S. N. 593. (Epipactis. Hall. 1296.)*

H. in pratis siccis hinter dem *Homburg* copiose. Floret Julio.

700. SERAPIAS, *rubra*, bulbis fibrosis, foliis ensiformibus, floribus erectis: nectarii labio acuto. *Linn. S. N. 594. (Epipactis. Hall. 1299.)*

H. in sylvis im *Beilstein*; in der *Hoerr*; im *Hirschberg* infrequens. Floret Julio.

Bulbi teretes, flexuosi, subtomentosi, simplices. Spadix pedalis, ad basin squamis aliquot striatis vaginantibus vestitus; supernus nullus, inter Flores pubescens. Folia 5-nervia: inferum ovatum, sequentia duo ovato-lanceolata, reliqua 2 l. 3. ensiformia. Flores

Flores erecti, magni, pauci. (5 l. 9.) Bractex lanceolata. acuta, inferiores longitudine Germinis, superiores gradatim breviores. Petala quinque, ovato lanceolata, acuminata, purpurea, subconniventia, inferioribus duobus basi latioribus magis hianibus. Nectarium Petalis vix longius, subtus convexo planum, ponn gibbum, sulco longitudinali: Labellum albidum subcordatum, acuminatum, apice reflexum, margine adscendente serrulato; supra totum cum postica parte, lineolis novem, eminentibus, longitudinalibus, undulatis, flavis, notatum. Stylus arcuatus, supra convexus, subius canaliculatus, apice tridentato. Antheræ minima. Capsula oblonga, angulosa.

B. HEXANDRIA.

ARISTOLOCHIA. G. P. 1022.

Hexagyna. Cal. nullus. Cor. 1 - petala, lingulata, integra. Caps. 6. locularis, infera. S. N. 600.

701. ARISTOLOCHIA, *clematitis*, foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. Linn. Spec. 1364. (Hall. 1029.)

H. in cultis in der Callenbach copiose; in hortis vor dem nördern Thor, alibique vitium pervulgare. Floret Junio.

Pharm. ARISTOLOCHIAE Herba.

C. POLYANDRIA.

ARUM. G. P. 1028.

Spatha monophylla, cucullata. Spadix supra nudus, inferne femineus, medio stamineus. S. N. 603.

702. ARUM, *maculatum*, acaule, foliis hastatis integerrimis: spadice clavato. Linn. Spec. 1370. (Hall. 1302.)

H. in sylvis & nemoribus passim. Foliis maculatis & non maculatis ludit. Floret Majo.

Pharm. A A 1 Radix.

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

A. DIANDRIA.

LEMNA. G. P. 1038.

MASC. Cal. 1 - phyllus. Cor. nulla.

FEM. Cal. 1 - phyllus. Cor. nulla. Stylus

1. Caps. 1 - locularis. S. N. 614.

703. LEMNA, *minor*, foliis sessilibus utrinque planiusculis, radicibus solitariis. *Linn. Spec.* 1376. (*Hydrophace. Hall.* 1900.)

H. in aquis stagnantibus *im Judenwäyer*; *bey der Weißgärberwiese*; & alibi frequens. Floret Janio, Julio.

704. LEMNA, *gibba*, foliis sessilibus subtrus hemisphæricis, radicibus solitariis. *Linn. Spec.* 1376. (*Hall.* 1898.)

H. in stagnis ad *Eriedorf*. Floret Julio.

B. TRIANDRIA.

CAREX. G. P. 1046.

MASC. Amentum imbricatum. Cal. 1 - phyllus. Cor. o.

FEM. Amentum imbricatum. Cal. 1 - phyllus. Cor. o. Nectarium inflatum, 3 - dentatum. Stigmata 3. Semen triquetrum, intra nectarium. S. N. 616.

A. Stylus bifidus. Semina hinc convexa, inde plana.

a. Spica unica simplici.

705. CAREX, *pulicaris*, spica simplici androgyna: superne mascula, capsulis divaricatis retroflexis. *Linn. Spec.* 1380. (*Hall.* 1350.)

H. in pratis uliginosis *in der Alzbach* frequens. Floret Majo,
T. XIV.

- T. XIV. f. 1. Radix densa, fibrosa, rufescens. Culmi florentes vix. spithamæ, deflorati dodrantales, f. pedales, erecti, nudi, enodes, laeves, teretes, altero latere planiore: Vaginis aliquot ad basin vestiti, inferioribus in foliola brevibus, superioribus in acumina desinentibus. Folia radicalia erecta, carinato-setacea, scabra, apice compresso, culmo breviora. Spica terminalis, simplex, cylindracea, subtrigona, (1) superne ad medium usque mascula, (♂) inferne feminea. (♀) Cal. squamæ fusca, albido-marginatae: mascula oblongae, obtusae, (♂ a II.) persistentes; feminea ovata, acuta, decidua. (♀ a) Capsulae spadiceo-rufescentes, nitida, erectae, rachi trigona articulata adpressa, demum retroflexa. (p.)

b. Spicis androgynis.

706. CAREX, arenaria, spica composita, spiculis androgynis: inferioribus remotioribus foliolo longiori instructis, culmo triquetro. Linn. Spec. 1381. (Hall. 1362. & 1363.?)

- T. XIV. f. 2. Radix sumiformis, articulata, profunde sub terra repens: geniculis remotis, fibrosis, setis barbatis. Culmi ultrapedales, subfoliati, triquetri, superne nudi scabri. Folia angusta, carinata, scabra, inferiora laevia, longitudine culmi florentis. Spica erecta, demum nutans, composita: Spiculis 20. f. 30. sessilibus, oblongis, acuminatis, flavo-ferrugineis, nitidis, confertis, inferioribus remotioribus, alternis; (1. ♀. ♀.) quarum, duae infimæ & terminalis (II ♀) totæ femineæ; intermedie 2 f. 3, femineæ apice masculæ; (♂ ♀ ♂) superiores plures (15-20) confertæ, totæ masculæ, (♂) steriles. Bractea singula spicula subjecta sessilis, lanceolato-acuminata; (♂ II.) dua seu tres inferiores ovata, in foliolum setaceum propria spicula vix longius desinentes. Cal. squamæ masculæ lanceolata; (n. ♂.) femineæ ovata, acuta. (♀ a) Nectarium margine scabrum. (1. L.) Spicula feminea fructu maturo ovata, valde incrassata. (♀) Capsula ovata, acuminata, acute marginata, apice bifido; (p) saepe corniculata, majores, (*) ob larvam Insecti cujusdam inhabitantis, monstrosa.

707. CAREX, leporina, spica composita, spiculis ovatis sessilibus approximatis alternis androgynis nudis. Linn. Spec. 1381. (Hall. 1361.)

H. in pratis humidis ad pagum Sinn; im Pulversgrund, & alibi infrequens. Floret Majo.

- T. XIV. f. 6. Radix multiplex, fibrosa. Culmi 1 f. 2- pedales, erecti, subulnati, trigoni, laeves, inter spiculas flexuosi, scabri.

scabri. Folia angusta, carinata, scabra, culmo brevioribus. Spiculae 5 f. 6, alternae, distinctae: florentes ovatae, (1) fusco-virentes, fructiferae subrotunda, (II) ferruginea f. fusca nitida; omnes femineae, apice masculae. Bractae ovato-pubescens, quam infra subaristata, spiculis breviores, Cal. squamae ovato-lanceolata, acuminata, (a A) ferruginea, nervo virida, margine albida. Capsulae lanceolatae, acuminatae, margine acuto, scabro, (p. P.) calyce non longiores. (A. P.)

- 708 *CAREX, vulpina*, spica supradecomposita inferne laxiore, spiculis ovatis androgynis glomeratis: superne masculis. *Linn. S. N. 616. Spec. 1382. (Hall. 1364?)*

H in fossi-ubis & cimiteriis, im Juleuveyer; in der Alzbach frequens. Floret Majo, Junio.

- T. XIV. f. 5. Radix multiplex, densa, fibrosa. Culmi bi- f. tripetales, subfoliati, exacte triquetri, crassi, angulis acutis superne retrorsum scabris; farti medulla arachnoidea. Folia lata, carinata marginibus replicatis, flavo viridia: radicalia levia; culmea margine carinaque scaberrima. Spica coarctato-ramosa, demum hirsuta, plus minusve contracta, composita: ramulis inferioribus 3 f. 4 alternis, subforescentia distinctioribus, (1) spiculis glomeratis obtusis. Spiculae ovatae, griseo-virentes; omnes femineae (♀) apice masculae, (♂) Bractae ramulis subepta semiamplexantes, basi ovata in foliolum setaceum longitudine ramuli, desinentes; Bractea singula spicula propria, lanceolata setacea. (4) spicula vix longior. Capsulae ovatae, acutae, fuscae, (p.) divergentes. (II)

709. *CAREX, muricata*, spiculis subovatis sessilibus remotis androgynis, capsulis acutis divergentibus spinosis. *Linn. Spec. 1382. (Hall. 1365. Et var. minor 1366?)*

H, in pratis sylvarum hinter dem Homberg, alibique frequens. Floret Majo.

- T. XIV. f. 8. Radix multiplex, fibris longissimis simpliciusculis. Culmi numerosi, subfoliati, trigoni, laeves; florentes digito vix longiores; fructu maturo petales. Spiculae 3-4. f. 5, alternae, remotiusculae, inferne cylindraceae masculae, (♂) superne ovatae femineae: terminali longiore. (I. ♀.) Bractae subvaginantes, acutae, spiculis breviores. Cal. squamae acutae, viridescentes: masculae ovato-triangulares, (a A ♂) femineae ovato-acuminatae. (a ♀.) Capsulae ovato-acuminatae, divergentes. (II p)

710. *CAREX, remotata*, spicis ovatis sessilibus remotis androgynis, bracteis culmum æquantibus. *Linn. S. N. 617. Spec. 1383. (Hall. 1357.)*

H. in pratis humidis secus rivulos *im Göldegründ*; *am Dollberg*; *im Zuvinger* copiosissime. Floret Majo.

- T. XV. f. 1. Radix multiplex, fibrosa, fibris firmis simplicibus. Culmi tenues, infirmi, trigoni, subscabri; florentes pedales, foliorum vaginis toti obiecti, fructiferi tripedales. Folia angusta, carinata, longa, subscabra, flavo-viridia. Spiculae 6. 7. f. 8, ovatae, femineae, inferne masculae, (♀ ♂) remotissimae, sessiles in alis foliorum: quorum inferiores duae culmum superantia, tertium angustius, ejusdem longitudinis, reliqua gradatim breviora; supremis spiculis subjecta, setacea, brevissima. Cal. squamæ albido-virentes, lanceolata, acuta. (a. A.) Capsulae subflavescentes, acutae. (p.)

711. *CAREX, elongata*, spiculis oblongis sessilibus remotis androgynis, capsulis ovatis acutis. *Linn. Spec. 1383. (Hall. 1359.)*

H. in pratis uliginosis ad pagum *Sinn*, *am Mühlberg* infrequens. Floret Majo.

- T. XIV. f. 7. Radix priorum, fibrosa, albida. Culmi sesquipedales, subfoliati, triquetri, laeves, infra spicam scabri. Folia angusta, subcarinata, laevia, vix apice scabra, longitudine culmi. Spiculae 7-8-9, alterna, remota, distinctae, oblongae, femineae, inferne masculae. (♀ ♂) Bractea ovata, apice setacea, brevissima, albae. Cal. squamæ ovatae, acutae. (a. A.) Capsulae griseo-virentes, exiguae, utrinque subconvexae, acuta. (p. P.)

712. *CAREX, canescens*, spiculis subrotundis remotis sessilibus obtusis androgynis, capsulis ovatis obtusiusculis *Linn. Spec. 1383? (Hall. 1360.)*

H. ad versuras & sepes, locis siccis graminosis ubique frequens. Floret Majo.

- T. XIV. f. 3. Radix crassiuscula, fibrosa, setis atro-fuscis barbata. Culmi subfoliati, triquetri, superne scabri, 1 f. 2-pedales, erecti, demum obliqui, proeumbentes. Folia angusta, laevia, carinata, marginibus replicatis, apicem versus scabra. Vaginae hinc truncatae, membranaceae, albae, tenuissimae. Spica 1-2-3 pollicaris. Spiculae in minoribus speciminibus 5, subrotundae; in majoribus 9-15, ovatae, obtusissima: inferne, femineae, superne masculae: quarum inferiores alterna, subremotae, distinctae, infima saepe duabus lateralibus minoribus, rarius pluribus ramulo brevi insidentibus, acutae. (I, II) Bractea setacea, brevissima. Cal. squamæ ovato-lanceolatae, acutae,

acuta, (a) cinerescens, nervo viridi, margine ferrugineo, nitido. Capsulae acute marginatae, apice-bifidae; sapissime corniculatae, maiores, varie curvatae. (1*) Insectorum opus.) Carici vulpinae (nostrae) maxime adfinis; vereor ne sit ejusdem varietas siccoribus in locis proveniens.

713. *CAREX, paniculata*, racemo composito, spiculis androgynis. Linn. Spec. 1383. (Hall. 1368.)

β. Cyperoides palustre spica laxa minus. Scheuchz. Agr. 501. (Hall. 1368. var. β.)

H. in paludosis prope pagum Sinn frequens. β. ibidem rarius. Floret Majo.

T. XIV. f. 4. Radix multiplex, lignosa, fibrosa. Culmi 3 f. 4-pedales, erecti, subfoliati, triquetri, hispidi, ad basin squamis fusco-atris, nitidis, subimbricatis, vestiti. Folia latiuscula, striata, carinata; dum sicca, convoluta-fistulosa, marginibus & partim carina hispida. Spica ramosa, demum paniculata, hispida, composita: Ramulis alternis, remotiusculis, strictis, spiculis undique fere obiectis. Spiculae inferne masculae, superne femineae: florentes subovatae, distinctiores; (I.) fructiferae glomeratae, confluentes, hispidae. (II) Bractee setaceae, ramulis paulo breviores. Cal. squamae ovato-acuminatae, fuscae, margine albido. (a) Capsulae utrinque convexae, ventricosae, exiguae, fuscae, divergentes, margine obtusiusculo, apice acuto, subbifido.

Var. β. Spica simplici 1 - 2 - pollicari, ramis nullis differt.

B. Stylus trifidus, Semina triquetra.

b. Spicis sexu distinctis: semineis sessilibus.

714. *CAREX, flava*, spicis confertis subsessilibus subrotundis: mascula lineari, capsulis acutis recurvis. Linn. Spec. 1384. (Hall. 1380.)

H. in pratis uliginosis sylvaticis hinter dem Homberg; im Beilstein frequens. Floret Aprili, Majo.

T. XV. f. 6. Radix multiplex, fibrosa. Culmi laeves: florentes subtrigoni, undique vaginis obiecti, vix digito longiores; (Fig. super.) fructiferi triquetri, subnudi, pedales. Folia latiuscula, subcarinata, scabra. Spica terminalis mascula, cylindrica, gracilis: squamis imbricata oblongis, obtusis, (a) inferioribus acutis, (a A *) infima saepe aristata. Spicae femineae duae f. tres, approximatae; florentes, subrotundae, sessiles; fructiferae subpedunculatae, subovatae, squarrosae. (Fig. infer.) Bractee foliaceae, vaginantes, culmo longiores. Cal. squamae lato-lanceolatae, micronatae, ferrugineae, nervo viridi, (a A & ♀) capsulis breviores. Capsulae ventricosae, striatae, flavescentes, rostro longo, reflexo, brevissimo bifido. (p. P.)

715. *CAREX, digitata*, spicis linearibus erectis: mascula brevior inferioreque, bracteis aphyllis, capsulis distantibus. *Linn. Spec.* 1384. *Hall.* 1376.)

H. in sylvaticis montosis *am Homberg* infrequens. Floret Martio, Aprili.

- T. XVI. f. 4. Radix multiplex, descendens, squamis purpureis tunicata. Culmi spithamai f. pedales, subnudi, hinc convexi, inde planiusculi, laeves, apice scabri; ad basin vestiti vaginis quatuor carinatis, purpureis, aphyllis, superioribus in foliola setacea brevissima desinentibus. Folia radicalia angusta, subcarinata, firma, striata, inferne sursum, superne reirorsum scabra. Spica terminalis mascula, cylindrica, brevis: reliquae duae f. tres femineae, graciliores, longiores, lineares; sessiles, dein pedunculatae: quarum superior florens altitudine masculae aequalis, deflorata pedunculo elongato, altior evadit ipsa mascula. Bractee vaginantes, spadiceo-purpureae, laxae, oblique truncatae, aphyllae. Cal. squamæ oblongae, obtusae, spadiceo-rufescentes, margine albido, nrido; (a ♂) femineae nervo medio viridi, apice setaceo, prominulo. (a ♀) Capsulae alternae, remotae, trigonae, acutae, basi productiori attenuatae, pubescentes, (p. P.)

716. *CAREX, montana*, spicis femineis sessilibus subfolitariis ovatis masculae approximatis, culmo nudo, capsulis pubescentibus. *Linn. Spec.* 1385. (*Hall.* 1372.)

H. in montosis apricis *am Homberg; Dollberg;* alibique vulgaris. Floret Aprili.

- T. XVI. f. 6. Radix multiplex, fibrosa. Culmi spithamai, subnudi, subtrigoni, laeves, erecti, maturo fructu procumbentes; Foliis 3 f. 4 vaginantibus, brevibus, ad basin vestiti. Folia radicalia numerosa, angusta, plano-carinata, marginibus & apice carinae subscabra, flavescentia, culmo florenti breviora, demum aequalia: Vaginis inferioribus purpurascens. Spica terminalis mascula, subcylindrica, acutiuscula; deflorata apice subventricosa. (II) Spicae femineae duae, (rarius unica,) approximatae, sessiles, breviores, oblongae f. subovatae, pauciflorae. Bractee sessiles, obcordatae, atropurpureae, nervo medio viridi, apice in foliolum setaceum propria spicula brevius desinentes. Cal. squamæ spadiceo-purpureae, demum atrae, nervo dorsali flavescente apice prominulo: masculae oblongae, (a ♂) femineae subovata, (a ♀) truncata mucrone prominulo. Nectarium ovatum, apice purpureo, bi- f. trifido. (l. L.) Capsulae subtrigona gibba, hirta, divergentes. p. P.)

717. *CAREX, tomentosa*, spicis femineis subpedunculatis, capsulis subglobosis tomentosis. *Linn. S. N. 617. Mantissa, 123. (Hall. 1373.)*

H. in pratis humidis *im Pulversgrund* rarius; in paludosis ad pagum *Sinn* frequens. Floret Majo.

- T. XV. f. 7. Radix repens, articulata, squamis fusco-purpureis tunicata. Culmi dodrantes, demum sesquipediales, subsoliati, subtrigoni, striati, superne scabri. Folia radicalia angusta, subcarinata, supra scabra, subtus levissime pubescentia, culmo florenti breviora; culmea levia apice scabra. Spica terminalis mascula, teres, subtrigona; laterales duae (saepe unica) femineae, triplo minores, oblongae, sessiles, (I) subapproximatae, demum pedunculatae, remotiores. (II. III) Bractea foliacea, subvaginant; quarum inferior masculam demum superans; superior propria spicula paulo longior. Cal. squamæ mascula oblonga, obtusiuscula, (2 A ♂) ferrugineo-purpurea, nervo lato flavescente, margine albido, inferiores majores; femineae duplo minores, ovato-acuminatae, (2 ♀) purpurascens, nervo viridi. Capsulae 15 f. 20, subglobosae, albido-villosae, apice vix prominulo bifido. (p. P.) Semen triquetrum, uti in reliquis, stylo brevi apice vix prominulo terminatum. (f. S.)

718. *CAREX, filiformis*, spica mascula oblonga, femineis sessilibus oblongis: inferiore foliolo proprio brevior. *Linn. Spec. 1385.*

α. Varietas minor (Hall. 1381?) *Scheuchz. Agr. 433. no. 4.*

β. - - - major (Hall. 1383?) *Scheuchz. Agr. 425. no. 1.*

γ. - - - media (Hall. 1387?) *Scheuchz. Agr. 428. no. 1.*

H. α. in pascuis pomariis & pratis siccis copiosissime. Floret Martio, Aprili; β. in sylvaticis montosis *im Beilstein*; γ. in collibus siccis *am Homberg* rarius. Floret Aprili, Majo.

- T. XVI. f. 5. Radix repens. Culmi in α, palmares, β, ultrapediales, filiformes, γ. spithamei; subnudi, trigoni, laeves. Folia subangusta, carinata, recurva, firma, subscabra. Spica terminalis

minalis mascula, oblonga, obtusa, ferruginea; duæ vel tres femineæ, approximatae, breviores, sessiles, demum subpedunculatae. Bractææ subvaginantæ, setaceæ; inferiore propria Spicula (sæpe) longiore. Calycinæ squamæ luteo-virentes, subfusca, nitida; mascula obtrusiuscula, (♂. 2) femineæ truncata interjecto mucrone. (♀ a) Capsulae subhirta, (P. p) conferta.

In Var. β (III) Spica feminea longius pedunculata. Var. γ. Spicae femineae remotiores, 3-4-f. 5, pedunculatae: quarum mascula proxima androgyna, f. superne partim mascula. Capsulae in hac sæpe ustilagineae, globosae, crusta cinerea, nitida, indurata, duplo majores.

c. Spicis sexu distinctis: femineis pedunculatis.

719. CAREX, limosa, spicis ovaris pendulis: mascula longiore erectiore, radice repente, Linn. Spec. 1386. (Hall. 1392.)

β. Cyperoides palustre, spicis purpureo-spadiceis, tenuibus pediculis infidentibus. Scheuchz. Agr. 467. (Hall. 1408.)

H. α, & β, in pratis sylvaticis udis; juxta rivulos hinc inde Homberg frequens. Floret Majo.

T. XV. f. 3. Radix repens, stolonifera. Culmi 1-1. 2-pedales, subtrigoni, laeves, basi foliati. Folia numerosa, carinata, latiuscula, firma, recurva, scabra, albido-viridia: Vaginis inferioribus purpureis. Spicae atro-purpureae: terminalis mascula: in Var. α unica; in β duae seu tres, pedunculatae, terminali breviores, gracilioresque, squamula ovata acuta bracteata. (♂) Spicae femineae 2 f. 3, ovatae: in β oblonga, ventricosa, pedunculata, versus culmi apicem prodeuntes, erecta, demum pendula. (♀) Bractææ foliaceae: infima vaginans, longitudine culmi; superior multo angustior, sessilis, propria spica vix longior; utraque basi duabus auriculis exiguis, atro-spadiceis aucta. Cal squamæ oblongae: femineae nervo dorsali lato flavescente, apice prominulo; (♀ A)

N 5

mascul-

mascula obtusae, consimili nervo, (3 A ♂) in Var. α, fere nullo conspicuo instructa. Nectarium flavum, saepe atrum, subpurpureum. Capsulae densissime confertae, depressiusculae, basi productae, calyces superantes. (p.)

720. CAREX: capillaris, spicis pendulis: mascula erecta, femineis oblongis distichis, capsulis nudis acuminatis. Linn. Spec. 1386? (Hall. 1394.)

β. Carex spicis femininis pendulis, raris, praelongis, capsulis rostratis bifidis. (Hall. 1395.)

H. α, in pratis udis sylvaticis im Guldnersgrund; ad pagum Erbach; β, in sylvis in der Hoerre frequens. Floret Majo,

- Y. XV. f. 2. In Var. α, Culmus dum floret vix digito longior, demum spithameus; Capsulis paucioribus, alternis, remotiusculis, subdistichis. Var. β. omnibus partibus major: Radix subrepens. Culmi spithamai, demum bipedales, foliati, triquetri, infirmi, laeves; inter spicas supremas tantum scabri. Folia radicalia longitudine culmi, latiuscula, carinata marginibus replicatis; subtus laevia, margine & pagina superiore scabra. Fol. culmea planiora, utrinque laevia. Spica terminalis mascula, (♂) teres, subtrigona; femineae 4, saepius 5, remotissimae, graciliores, 1 - 2 - 3 - pollicares: quarum suprema masculae approximata subsessilis; reliquae pedunculis filiformibus, triquetris, infimis longissimis, pendulae. Bractae foliaceae, vaginantes, masculae apicem plerumque non superantes: superiore propria Spica demum brevior. Cal. squamae masculae oblongae, acutae, albae, nervo viridi: (2. ♂.) femineae ovato-setaceae. (A. ♀) Capsulae ventricosae, subtrigonae, erectae, inferiores remotiores, alternae; superiores subdistichae, approximatae: rostro longo, setaceo, recto, (p. P.) apice bicuspidato.

721. *CAREX, pallescens*, spicis pendulis: mascula erecta, femineis ovatis imbricatis, capsulis confertis obtusis. *Linn. Spec.* 1386. (*Hall.* 1393.)

H. in pratis udis passim. Floret Majo.

- T. XV. f. 4. Radix *multiplex, fibrosa*. Culmi *numerosi, aggregati, spithamaci* s. *pedales, subfoliati, triquetri, scabri*. Folia radicalia *latiuscula, subcarinata, hispida*. Fol. culmea 5 s. 6, *consimilia, supremo culmo longiore: Vaginis subvillosis*. Spica terminalis mascula, (σ) *teres, subferruginea*; femineae duae s. tres *pedunculatae, subremotae; florentes ovatae, erectae, (Fig. infer.) fructu maturo subovatae, pendulae. (Fig. super.)* Bracteae foliaceae *subvaginantes, basi transversim undulato-plicatae; quarum infima auriculis duabus basi aucta, longitudine masculae; subsequens angustior: tertia setacea, propria spica vix longior. Cal. squamae masculae obovatae, acutae; (σ A.) femineae ovatae, acuminatae, minores, griseo-virentes, capsulis breviores. (a ♀) Capsulae confertae, oblongae, inflatae, obtusissimae. (p. P.)*

722. *CAREX, panicea*, spicis pedunculatis erectis remotis: femineis linearibus, capsulis obtusiusculis inflatis. *Linn. Spec.* 1387. (*Hall.* 1405.)

H. in pratis uliginosis passim. Floret Aprili, Majo.

- T. XV. f. 5. Radix *repens*. Culmi *spithamaci, demum pedales, erecti, incurvi; inferne foliati, teretes, superne nudi, obtuse trigoni, laevgs.* Folia *latiuscula, subcarinata, scabra, subtus glauco-viridia, culmo breviora*. Spica terminalis mascula, *cylindrica*; femineae duae (*saepe unica*) *pedunculatae, erectae, lineares, graciliores, longiores, remotae*. Bracteae foliaceae, *vaginantes, convexae, inferiore demum propria spicula vix longiore. Cal. squamae*

- Squamae atro-purpureae, nervo flavo, albido-marginatae: masculae oblongae, obtusae; (♂ a) feminea ovata, acuta, (♀. a.) capsulis breviores. Capsulae paucae, inflatae, subglobosae: vel confertiores flavescentes, vel remotiores alternae, saepe atrae, apice brevissimo bifido, recurvo. (p. p). Variat a. Spica feminea suprema saepe androgyna; b. Spica feminea tertia ex basi culmi prodeunte, longissime pedunculata; c) Capsulis ustilagine correptis, majoribus, globosis, crusta cinerea nitida induratis.

d. Spicis sexu distinctis: masculis pluribus.

723. CAREX, acuta, spicis masculis pluribus, femineis subsessilibus, capsulis obtusiusculis. *Linn. Spec. 1388.*

nigra, α. Cyperoides nigro-luteum vernum minus. *Scheuchz. Agr. 460. (Hall. 1406.) Tab. XVI. Fig. I. †.*

rufa. β. Cyperoides latifolium spica rufa, five caule triangulo. *Scheuchz. Agr. 458. (Hall. 1404) Tab. XVI. Fig. I.*

H. α, in pratis inundatis passim; β, ad ripas Dille, auf der Weißgärberwiese, & alibi frequens. Floret Majo.

- T. XVI. f. I. †. Var. α., Culmo palmari, f. spithameo, spicis omnibus atris, magis approximatis, & feminea saepe unica tantum, absque nervo viridi squamarum, differt.

- T. XVI. f. 1. Var. β. Radix crassa, subrepens. Culmi 2-3-pedales, triquetri, firmi, hispidi, ad medium usque foliati. Folia culmea latiuscula, carinata, apice involuta, marginibus & pariter carina hispida, superiora longitudine culmi. Spica terminalis & tres s. quatuor laterales masculae; sessiles, alternae, approximate: quarum unica ex infimis saepe androgyna, ad basin pluribus spiculis minimis aucta. Spicae femineae duae, rarius tres, remotae, cylindraceae, masculis longiores; florentes sessiles, fructu maturo pedunculata, erecta, subangulata. Malc. Bractaeae atro-spaldiceae,

dicea, truncata interjecto mucrone setaceo, nervo viridi. Androgynae Bractea foliacea, angusta, sessilis, basi auriculata, propria spica longior. Fem. Bracteae Folia sessilia, masculam terminalem non superantia, duo tantum culmi latera basi amplexentia, auriculata: squamis 2, subrotundis, atro-spadiceis, tertio lateri culmi adpressis. Cal. squamae obovata, spadiceae, nervo viridi plus minusve conspicuo. Stylus in hac semper bifidus. (o. O.) Capsulae hinc convexa bisulcata, inde planiuscula apice brevissimo bifido, calyce majores. (p. P.)

724. CAREX, vesicaria, spicis masculis pluribus, femineis pedunculatis, capsulis inflatis acuminatis, Linn. Spec. 1388.

α. Cyperoides vesicarium, spicis viridantibus & subfuscis, Scheuchz. Agr. 470? (Hall. 1409?) Tab. XVI. Fig. 2. II.

β. Cyperoides latifolium, spica spadiceo-viridi majus, Scheuchz. Agr. 464. & Cyperoid. angustifol. 452. (Hall. 1398. & 1399?) Tab. XVI. Fig. 2. I.

γ. Cyperoides vesicarium, spicis teretibus erectis majus, Scheuchz. Agr. 476. (Hall. 1401?) Tab. XVI. Fig. 2. III.

H. *α* & *β* in paludosis ad pagum Sinn; *γ*, in fossis urbis & cœmeterii; auf dem Judenvueyer; ad ripas Dilla am steinern Waag frequens. Floret Majo.

T. XVI. f. 2. Var. *α*, (II) differt: Foliis angustissimis, longissimis; Spicis femineis gracilioribus, pendulis: (♀) quarum infima saepe minoribus spiculis basi aucta; Capsulis minoribus divergentibus. Var. *β*. (I) Spicis masculis paucioribus, (sape 2,) crassioribus; (♂) infima androgyna; (♂ ♀) Capsulis ellipticis, convexis, subfuscis. (I p) Hac plurimis notis fructu maturo ad Car. acutae var. *β* accedit, at Stylus semper trifidus.

Var. *γ*, (III.) Radix crassa, profundissime descendens. Culmi 2-f. 3-pedales, foliati, triquetri, hispidi. Folia lata, carinata, hispida, culmo longiora. Spicae masculae 2 f. 3 terminales, subremota, sessiles, cylindrææ: deflorata ventricosiores, squamis laxis. Spicae femineae 2, rarius 3, pedunculatae.

dunculata, remota: florentes graciles, (♀, fig. infer.) maturo fructu crassiores, erectae. (♀, fig. super.) Bracteae foliaceae, subvaginantes, inferiores culmum superantes. Cal. squamae subfuscae, nervo viridi: mascula oblonga, acutiuscula; (a A. ♂) feminea lanceolato-setacea, (♀ a) Capsulis breviores. Stylus Nectario acutissime bifido (1 L*) brevior, (n N.) constanter trifidus. (o) Capsulae erecto-patentes, inferiores remotiores: ventricosae, inflatae, striatae, flavescentes, collo acuminato, brevissime birostri. (p. P.)

725. CAREX, *hirta*, spicis remotis: masculis pluribus, femineis subpedunculatis erectis, capsulis hirtis. Linn. Spec 1389. (Hall. 1403.)

H. in pratis udis im Stüßersgrund copiose; ad fossas in der Alzbach frequens. Floret Majo.

- T. XVI. f. 3. Radix crassa, teres, subarticulata, squamis vestita setosis; horizontaliter profunde sub terra repens. Culmi spithamæ, demum ultrapedales, subfoliati, subtrigoni, inter spicas triquetri. Folia latiuscula, carinata, firma, scabra. Spica terminalis, & 1 f. 2 laterales duplo minores masculae, sessiles, oblongae, ventricosae, subapproximatae; Bracteis sessilibus, setaceis, brevibus: (♂) quarum infima carinata, longitudine propriae spicae. Spicae femineae duae, a masculis remotae, pedunculatae, erectae, florentes graciles. (1 ♀) Bracteae foliaceae, vaginantes, carinatae, longitudine masculae terminalis. Cal. squamae masculae obovatae, purpurascens, nervo viridi apice prominulo; (♂) femineae lanceolato-setaceae, capsulis longiores; inferiores remotiores, alternae. (♀ a. p) Nectarium apice profunde bifidum. (L. l.) Capsulae ventricosae, acuminatae, subbiornes, (p.) supra planiusculae.

In hac Vaginae, Folia, Culmi apex, Squamæ masculae, Capsulae, omnia albedo villosa. Pedunculi & Squamæ femineae tantum nuda laeves.

SPAR.

SPARGANIUM. G. P. 1041.

- TAB. XIII. f. 11. MASC Amentum subrotundum. (♂) *Cal.* 3-phyllus. (c. ♂ C.) *Cor.* nulla. FEM. Amentum subrotundum. (♀) *Cal.* 3-phyllus. (♀ c. C.) *Cor.* nulla. *Stigma* bifidum. (o) *Drupa* exsucca, (p) 1-sperma. (r. u. f.) S. N. 615.

726. SPARGANIUM, *erectum*, foliis erectis triquetris. *Linn. Spec.* 1378. (*Hall.* 1303.)

H. in fossis urbis *im Quidenvöyér*; ad ripas *Dilla am Bockshayn*, alibique frequens. Floret Junio.

Spica simplici & ramosa variat. Calycis *foliola erecta*, *superne latiora*, *apice inflexo subtrifido*. (c) Stamina *Calyce longiora*. (m. M.) *Stigma sapissime unicum*, *rima longitudinali*. (O* o) *varius duo*. (o) *Drupa* (p) *Nucleum plerumque unicum*, (r) *angulatum*, (u) *monospermum*, (f.) *condens*.

TYPHA. G. P. 1040.

MASC. Amentum cylindricum. *Cal.* obsoletus, 3-phyllus. *Cor.* o.

FEM. Amentum cylindricum, infra masculos. *Cal.* capillo villosa. *Cor.* o. *Sem.* 1, infidens Pappo capillari. S. N. 614.

727. TYPHA, *latifolia*, foliis subensiformibus, spica mascula femineaque approximatis. *Linn. Spec.* 1377. (*Hall.* 1305.)

H. in fossis & stagnis ad *Greiffstein* & *Emmerichenhayn*. Floret Julio. ✕.

Typhæ *fructificationis partes sufficienter examinare*, mihi nondum licuit.

C. TETRANDRIA.

URTICA. G. p. 1054.

MASC. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* o. *Nectarium* centrale, cyathiforme.

FEM. *Cal.* 2-valvis. *Cor.* o. *Sem.* 1, nitidum. S. N. 621.

728. URTICA, *urens*, foliis oppositis ovalibus. *Linn. Spec.* 1396. (*Hall.* 1615.)

H. in

H. in cultis, juxta parietes & sepes hortorum passim. Floret Junio & sequ.

Pharm. URTICÆ MINORIS Herba.

729. URTICA, dioica, foliis oppositis cordatis, racemis geminis. *Linn. Spec.* 1396. (*Hall.* 1614.)

H. ad sepes ubique. Floret aestate.

Pharm. URTICÆ MAJORIS Herba, Radix.

In hac & precedente Calyx femineus tetraphyllus: foliolis duobus ovato-cordatis, duobus oppositis ovatis exiguis, quadruplo minoribus.

BETULA, G. P. 1052.

MASC. Cal. 1-phyllus 3-fidus, 3-florus. Cor. 4-partita.

FEM. Cal. 1-phyllus, sub 3-fidus, 2-florus. Semina utrinque membrana alata. S. N. 621.

730. BETULA, alba, foliis ovatis acuminatis serratis. *Linn. Spec.* 1393. (*Hall.* 1628.)

H. in sylvis ad Ballersbach; am. Homburg. Floret Majo.

Amenta mascula cylindracea brevia, solitaria vel gemina, simplici pedunculo pendula. Calyx squamis constat tribus: media majore; pubescente, laterales 2 obtegente. Corollæ tres patentes, laciniis inaequalibus; quarum extrema reliquis quadruplo major; huic opposita multo minor, utraque oblonga; reliqua dua opposita, ovata, exiguae, staminibus breviores. Amenta feminea solitaria cylindracea, graciliora, pedunculis petiolaribus pendula. Strobilus cylindricus, squamis membranaceis imbricatus. Semina alata.

731. BETULA, Alnus; pedunculis ramosis. *Linn. Spec.* 1394. (*Alnus.* *Hall.* 1630.)

H. ad ripas Dilla am. Steinern Waag, & alibi frequens. Floret Aprili.

Amenta mascula inferiora, cylindracea, longa; feminea superiora, pauciora, ex uno eodemque pedunculo ramoso pendula. Calyx squamis constat quinque: media majori, laevi, laterales 4 semiobtegente. Corollæ 3 aequales: laciniis erecto-patulis. Strobilus ovatus: squamis coriaceis, duris, ternis semper oppositis instructus. Semina depressa, nuda, non alata.

D. PO.

D. P O L Y A N D R I A.

Stamina plura quam 7.

MYRIOPHYLLUM. G. P. 1066.

MASC. Cal. 4-phyllus. Cor. o. Stam. 8.

FEM. Cal. 4-phyllus; Cor. o. Pistill. 4. Stylus o. Sem. 4, nuda. S. N. 628.

732. MYRIOPHYLLUM, *spicatum*, floribus masculis interrupte spicatis. Linn. Spec. 1409. (*Pentapteris* Hall. 993.)

H. in fossis & fluviis; auf der neuen Wiese, in der Mühlbach, in der Dille vor dem Gebäude frequens. Floret Julio.

Masc. Flores corollati, duplici Calyce instructi; quorum exterior 4-phyllus: foliolo extimo ovato, acuto; lateralibus 2 duplo minoribus; quarto cauli proximo exiguo, saepe nullo. Calyx corollae monophyllus, semiquadrifidus: laciniis erecto patulis, ovatis, acutis, serratis. Corollae Petala quatuor, calycis incisuris inserta, oblonga, convexa, erectiuscula, subpurpurea, Stamina includentia, his erumpentibus mox decidua. Stamina petalis duplo longiora, erecta. Germen exiguum in fundo Calycis sterile. Feminel flores apetalis cum Descriptione Generica exacte conveniunt; Capsulas tamen 4 connatas, s. 4-loculares, 4-partibiles, singulam 1 spermam, observo.

733. MYRIOPHYLLUM, *verticillatum*, floribus omnibus verticillatis hermaphroditis. Linn. S. N. 628. Spec. 1409. (*Pentapteris*. Hall. 992.)

H. in piscina Theriotrophei semel lectum. Flores nondum satis examinare licuit. Floret Julio.

CERATOPHYLLUM. G. P. 1065.

MASC. Cal. multipartitus. Cor. o. Stamina 16-20.

FEM. Cal. multipartitus. Cor. o. Pist. 1. Styl. o. Sem. 1, nudum. S. N. 628.

734. CERATOPHYLLUM, *demersum*, foliis dichoromobigeminis, fructibus trispinosis. Linn. Spec. 1409. (Hall. 1599.)

H. in piscinis & fossis ad Beilstein. Floret Julio.

735. CERATOPHYLLUM, *submersum*, foliis dichotomis
trigeminis, fructibus muticis. *Linn. Spec.* 1409.
H. cum præcedente varius. Floret Jullo. †

POTERIUM. G. P. 1069.

MASC. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-partita. Stam.
30-40.

FEM. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-partita. Pist.
2. Bacca e tubo corollæ indurato. S. N.
629.

736. POTERIUM, *Sanguisorba*, inerme, caulibus
subangulosis. *Linn. Spec.* 1411. (*Pimpinella*
Hall. 706.)

H. in pascuis & pratis siccis ubique. Floret Junio.

Pharm. PIMPINELLÆ MINORIS, SANGUISORBÆ Herba.
In flore masculino etiam Germen & stigmata; at imperfecta steri-
linaque omnia, uti in VATERIANA dioica.

FAGUS. G. P. 1072.

MASC. Cal. 5-fidus, campanulatus. Cor. o.
Stam. 12.

FEM. Cal. 4-dentatus. Cor. o. Styli 3. Ca-
psula (Calyx antea) muricata, 4-valvis.
Sem. 2. S. N. 630.

737. FAGUS, *sylvatica*, foliis ovatis obsolete serra-
tis. *Linn. Spec.* 1416. (*Hall.* 1622.)

H. in sylvis pervulgaris. Floret Majo.

QUERCUS. G. P. 1070.

MASC. Cal. 5-fidus fere. Cor. o. Stam. 5-
10.

FEM. Cal. 1-phyllus, integerrimus scaber.
Cor. o. Styli 2-5. Sem. 1, ovatum. S. N.
629.

738. QUERCUS, *Robur*, foliis deciduis oblongis
superne latioribus: sinubus acutioribus: an-
gulis obtusis. *Linn. Spec.* 1414. (*Hall.* 1626.)

H. cum præcedente, vastissimas Sylvas constituens. Floret
Majo.

Pharm. QUERCUS Folia, Cortex.

JUGLANS.

JUGLANS, G. P. 1071.

MASC. *Cal.* 1-phyllus, squamiformis. *Cor.* 6-partita. *Filamenta* 18.

FEM. *Cal.* 4-fidus, superus. *Cor.* 4-partita. *Styli* 2. *Drupa* nucleo sulcato. S. N. 630.

739. JUGLANS, *regia*, foliolis ovalibus glabris subserratis subæqualibus. *Linn. Spec.* 1415. (*Hall.* 1624.)

H. arbor culta intra & extra urbem, *vor dem untern Thor*. Floret Majo.

CORYLUS, G. P. 1074.

MASC. *Cal.* 1-phyllus, 3-fidus, squamiformis, 1-florus. *Cor.* 0. *Stam.* 8.

FEM. *Cal.* 2-phyllus, lacerus. *Cor.* 0. *Styli* 2. *Nux* ovata. S. N. 631.

740. CORYLUS, *Avellana*, stipulis ovatis obtusis. *Linn. Spec.* 1417. (*Hall.* 1625.)

H. in sylvis montosis, ad sepes passim. Floret Martio.

CARPINUS, G. P. 1073.

MASC. *Cal.* 1-phyllus: squama ciliata. *Cor.* 0. *Stam.* 20.

FEM. *Cal.* 1-phyllus: squama ciliata. *Cor.* 0. *Germine* 2. *Styli* singulis 2. *Nux* ovata. S. N. 631.

741. CARPINUS, *Betulus*, squamis strobilorum planis. *Linn. Spec.* 1416. (*Hall.* 1627.)

H. in sylvis passim. Floret Aprili, Majo.

E. MONADELPHIA.

PINUS, G. P. 1077.

MASC. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 0. *Stam.* plurima. *Antherae* nudæ.

O 2

FEM.

FEM. *Cal.* strobili: squama 2-flora. *Cor.* 0.

Pist. 1. *Nux* ala membranacea excepta.

S. N. 632.

742. PINUS, *sylvestris*, foliis geminis: primordiis libus solitariis glabris. *Linn. Spec.* 1418. (Hall. 1660.)

H. in sylvis montosis passim. Floret Majo.

Pharm. PINI Turiones & Summitates, Resina.

743. PINUS, *Abies*, foliis solitariis subulatis mucronatis laevibus bifariam versis. *Linn. Spec.* 1421. (Hall. 1656.)

H. in sylvis infrequens. Floret Majo.

Pharm. ABIETIS Resina.

F. SYNGENESIA.

BRYONIA. G. P. 1093.

MASC. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-partita. *Filamenta.* 3.

FEM. *Cal.* dentatus. *Cor.* 5-partita. *Stylus* 3-fidus. *Bacca* subglobosa, polysperma. S. N. 640.

744. BRYONIA; *alba*, foliis palmatis utrinque calloso-scabris. *Linn. Spec.* 1438. (Hall. 574.)

H. in dumetis & sepibus passim. Floret Junio, Julio.

Pharm. BRYONIA Radix.

- Bryonia nostra constanter est dioica. Mas & Femina loco natali plerumque a se invicem remotissimo crescent; Semel tantum, & quidem unico in loco, in sepibus ad viam: nach dem Rosenwäldgen; Feminam cum Mare promiscue scandentem observavi, Caulibus tamen ex diversa Radice provenientibus.

Maris Pedunculi folio longiores, multi - (10-20) flori; Pedicellis pedunculo brevioribus, sparsis. Floribus majoribus sterilibus, deciduis; Antheris polliniferis; Pistillo nullo instructis; Feminæ Pedunculi brevissimi, pauci - (3-6) flori; Pedicellis umbellaribus vel subcymosis, sub florescentia pedunculo longioribus. Floribus triplo minoribus, albidioribus; Stamini-bus nullis; Pistillo perfecto fertili; Bacca globosa, rubra, 5 s. 6-sperma.

CLASSIS.

CLASSIS XXII.

D I O E C I A.

A. D I A N D R I A.

SALIX. G. P. 1098.

MAS. *Amenti squamæ. Cor. o. Glandula basileos nectarifera.*

FEM. *Amenti squamæ. Cor. o. Stylus 2-fidus. Caps. 1-locularis, 2-valvis, Sem. papposa. S. N. 647.*

a. *Foliis glabris serratis.*

745. SALIX, *triandra*, foliis serratis glabris, floribus triandris. *Linn. Spec. 1442. (Hall. 1637.)*

H. Mas, ad ripas *Dilla gegen dem Schiesplatz über*; Femina *bey dem Sinnerhoff*. Floret Majo.

Amenta pedunculata, foliata. Glandula duplex singula squama: unica major, convexa, submarginata, supra filamenta squamæ basi, & unica minor infra filamenta squamæ medio affixa. Similes glandulas duplices, figura & magnitudine diversas, in omnibus fere Salicibus nostratibus observavi. In nonnullis utraque glandula basi coalita, filamentorum basin vestiens; in aliis inferior longior ipsa superiori, in aliis vice versa.

746. SALIX, *phylicifolia*, foliis serratis glabris lanceolatis: crenis undatis. *Linn. Spec. 1442.*

H. Mas, in salicetis *bey dem Sinnerhoff*. Floret Majo.

747. SALIX, *vitellina*, foliis serratis ovatis acutis glabris: ferraturis cartilagineis, petiolis calloso-punctatis. *Linn. Spec. 1442. (Hall. 1635. β?)*

H. Mas, *an der Mühlbach*; *am Sieghäuserweg*. Floret Majo.

748. SALIX, *amygdalina*, foliis serratis glabris lanceolatis petiolatis, stipulis trapeziformibus. *Linn. Spec. 1443. (Hall. 1636.)*

H. Femina, ad ripas *Dilla gegen dem Schiesplatz über*, inter *S. triandr. & fragilem*. Floret Aprili.

749. SALIX, *bastata*, foliis serratis glabris subovatis acutis scissilibus, stipulis subcordatis. *Linn. Spec. 1443. (Hall. 1654?)*

O 3

H. in

H. in salicetis *auf der Sandruisse* parcius. Floret Aprili.
Majo.

750. *SALIX, fragilis*, foliis ferratis glabris ovato-lanceolatis, petiolis dentato-glandulosis, *Linn. Spec. 1443 (Hall. 1638.?)*

H. Mas, & Femina ad ripas *Dilla; am steinern Waag.* Floret Majo.

751. *SALIX, purpurea*, foliis ferratis glabris lanceolatis: inferioribus oppositis, *Linn. Spec. 1444.*

H. Mas, *an der Mühlbach; bey dem Sieghaus.* Floret Majo.

752. *SALIX, Helix*, foliis ferratis glabris lanceolato-linearibus: superioribus oppositis obliquis, *Linn. Spec. 1444. (Hall. 1640.)*

H. Mas ad ripas *Dilla, auf der Weißgärberwiese; & alibi non infrequens.* Floret Aprili.

Amenta in junioribus ramis opposita, in adultioribus alternata: Squamis constanter monandris. Anthera crassa, tetradyma, juvenilis coccinea.

753. *SALIX, myrsinites*, foliis ferratis glabris ovatis venosis. *Linn. Spec. 1445. (Hall. 1645?)*

H. Femina, *an der Mühlbach bey der ohern Walckmühle; ad marginem pratorum auf dem Schlüssel.* Floret Aprili.

b. Foliis integerrimis, villosis.

754. *SALIX, aurita*, foliis integerrimis utrinque villosis obovatis appendiculatis. *Linn. Spec. 1446. (Hall. 1652.)*

H. Femina, in sylvaticis *am Hamberg; in sepibus am Heiligen-Fluß.* Floret Majo.

755. *SALIX, arenaria*, foliis integris ovatis acutis: supra subvillosis, subtus tomentosis. *Linn. Spec. 1447. (Hall. 1642.)*

H. Mas, ad ripas *Dilla, auf der Weißgärberwiese; Femina an der Mühlbach bey dem Sieghaus, alibique.* Floret Aprili.

c. Foliis subserratis, villosis.

756. *SALIX, caprea*, foliis ovatis rugosis: subtus tomentosis undatis, superne denticulatis. *Linn. Spec. 1448. (Hall. 1653.)*

H. Mas, *unter der neuen Brücke; Femina, in der Callenbach, vulgaris.* Floret Aprili.

757. *SALIX, viminalis*, foliis subintegerrimis lanceolato-linearibus longissimis acutis subtus sericeis, ramis virgatis. *Linn. Spec.* 1448. (*Hall.* 1641.)

H. Mas, ad ripas *Dilla* unter der neuen Brücke; Femina ibidem & am steinern Wagg. Floret Aprili.

758. *SALIX, cinerea*, foliis subserratis oblongo-ovatis: subtus subvillosis, stipulis dimidiato-cordatis. *Linn. Spec.* 1449.

H. Femina, ad ripas *Dilla* cum præcedente. Floret Aprili.

759. *SALIX, alba*, foliis lanceolatis acuminatis serratis utrinque pubescentibus: ferraturis infimis glandulosis. *Linn. Spec.* 1449. (*Hall.* 1635.)

H. Femina, an der Mühlbach; am Sieghäuserweg. Floret Majo.

B. TETRANDRIA.

VISCUM. G. P. 1105.

MAS. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* o. *Filamenta.* o. *Antheræ* calyci adnatæ.

FEM. *Cal.* 4-phyllus, superus. *Stylus* o. *Cor.* o. *Bacca* 1-sperma. *Sem.* cordatum. S. N. 650.

760. *VISCUM, album*, foliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo, spicis axillaribus. *Linn. Spec.* 1451. (*Hall.* 1609.)

H. in Pyro, Malo, imprimis Quercu. parasitica; ad pagum Saalbach frequens. Floret Martio.

Pharm. Visci Lignum.

C. PENTANDRIA.

CANNABIS. G. P. 1115.

MAS. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o.

FEM. *Cal.* 1-phyllus, integer, latere hi-ans. *Cor.* o. *Styli* 2. *Nux* 2-valvis, intra calycem clausum. S. N. 653.

761. *CANNABIS, sativa.* *Linn. Spec.* 1457. (*Hall.* 1616.)

H. in cultis & agris, inter segetes in der *Aue* rarius, Floret Julio.

Pharm. CANNABIS Semina.

HUMULUS, G. P. 1116.

MAS. Cal. 5-phyllus. Cor. o.

FEM. Cal. 1-phyllus, oblique patens, integer. Cor. o. Styli 2. Sem. 1, intra calycem foliatum. S. N. 653.

762. HUMULUS, *Lupulus*, Linn. Spec. 1457. (*Lupulus*. Hall. 1618.)

H. in dumetis & sepibus am *Sieghäuserweg*; alibique copiosissime. Floret Julio.

Pharm. LUPULI Flores, (potius Strobili.)

D, OCTANDRIA.

POPULUS, G. P. 1123.

MAS. Amenti Cal. lamina lacera. Cor. turbinata, obliqua, integra.

FEM. Amenti Cal. & Cor. maris. Stigma 4-fidum: Caps. 2-locularis. Sem. multa, papposa. S. N. 656.

763. POPULUS, *alba*, foliis subrotundis dentato-angulatis subtus tomentosis. Linn. Spec. 1463. (Hall. 1634.)

H. Mas, ad pagos frequens; ad ripas *Dilla* alibique parcius. Floret Martio, Aprili.

Gemmae floriferae ovata, fusca, nitida: squamis interioribus marginate lacris, scariosis. Amenta crassiora, longiora, quam in *P. nigra*, ex ovata basi cylindracea. Cal. squamæ semimultifida: laciniis simplicibus, villosis. Stamina 8.

764. POPULUS, *tremula*, foliis subrotundis dentato-angulatis utrinque glabris. Linn. Spec. 1464. (Hall. 1633.)

H. Mas in sylvaticis am *Geistlichenberg*, alibique frequens; Femina am *Hirschberg bey der Hoerbacher Mühle*. Floret Martio.

Hujus partes fructificationis uti in præcedente.

765. *POPULUS, nigra*, foliis deltoidibus acuminatis ferratis. *Linn. Spec. 1464. (Hall. 1632.)*

H. Mas ad ripas Dilla passim. Floret Martio.

Pharm. *POPULI* Geminae.

Geminae floriferæ ovato-oblonga, acuminata: squamis integris, viscosis. Amenta cylindracea. Cal. squamæ 3-f. 4-partita: laciniis pinnatifido-multifidis, nudis. Stamina 16.

E. ENNEANDRIA.

MERCURIALIS. G. P. 1125.

MAS. Cal. 3-partitus. Cor. o. Stam. 9-f. 12. Antheræ globosæ, didymæ.

FEM. Cal. 3-partitus. Cor. o. Styli 2. Capsula dicocca, 2-locularis, 1-sperma. S. N. 657.

766. *MERCURIALIS, perennis*, caule simplicissimo, foliis scabris. *Linn. Spec. 1465. (Hall. 1601.)*

H. in nemorosis ad *Erbach* copiosissime, in sylvaticis montosis am *Homburg über der Lithau*; am *Callenbachsberg* rarius. Floret Aprili, Majo.

767. *MERCURIALIS, annua*, caule brachiato, foliis glabris, floribus spicatis. *Linn. Spec. 1465. (Hall. 1600.)*

H. in cultis inter olera rarius. Floret Julio.

Pharm. *MERCURIALIS* Herba.

F. MONADELPHIA.

JUNIPERUS. G. P. 1134.

MAS. *Amepti* Calyx squamæ. Cor. o. Stam. 3.

FEM. Calyx 5-partitus. Petala 3. Styli 3. Bacca 3-sperma, tribus tuberculis calycis inæqualis. S. N. 660.

768. *JUNIPERUS, communis*, foliis ternis patentibus mucronatis, bacca longioribus. *Linn. Spec. 1470. (Hall. 1661.)*

H. sylvis & montosis sterilibus passim. Floret Aprili, Majo.

Pharm. *JUNIPERI* Radix, Lignum, Baccæ, Resina: (*SANDARACA*.)

Antheræ sub squamis lateralibus sæpe 5.

Squamae atro-purpureae, nervo flavo, albido-marginatae: masculae oblongae, obtusae; (♂ a) femineae ovatae, acutae, (♀. a.) capsulis breviores. Capsulae paucae, inflatae, subglobosae: vel confertiores flavescentes, vel remotiores alternae, saepe atrae, apice brevissimo bifido, recurvo. (p. 1°).
 Variat a. Spica feminea suprema saepe androgyna; b. Spica feminea tertia ex basi culmi prodeunte, longissime pedunculata; c) Capsulis ustilagine correptis, majoribus, globosis, crusta cinerea nitida induratis.

d. Spicis sexu distinctis: masculis pluribus.

723. CAREX, acuta, spicis masculis pluribus, femineis subsessilibus, capsulis obtusiusculis.
Lim. Spec. 1388.

nigra, α. Cyperoides nigro-luteum vernum minus. Scheuchz. Agr. 460. (Hall. 1406.) Tab. XVI. Fig. 1. ♀.

rufa. β. Cyperoides latifolium spica rufa, five caule triangulo. Scheuchz. Agr. 458. (Hall. 1404) Tab. XVI. Fig. 1.

H. α, in pratis inundatis passim; β, ad ripas Dilla, auf der Weißgärberwiese, & alibi frequens. Floret Majo.

T. XVI. f. 1. ♀. Var. α., Culmo palmari, s. spithamao, spicis omnibus atris, magis approximatis, & feminea saepe unica tantum, absque nervo viridi squamarum, differt.

T. XVI. f. 1. Var. β. Radix crassa, subrepens. Culmi 2-3-pedales, triquetri, firmi, hispidi, ad medium usque foliati. Folia culmea latiuscula, carinata, apice involuta, marginibus & pariter carina hispida, superiora longitudine culmi. Spica terminalis & tres s. quatuor laterales masculae; sessiles, alternae, approximatae: quarum unica ex infimis saepe androgyna, ad basin pluribus spiculis minimis aucta. Spicae femineae duae, rarius tres, remotae, cylindratae, masculis longiores; florentes sessiles, fructu maturo pedunculata, erecta, subangulata. Malt. Bractaeae atro-spicae,

dicea, truncata interjecto mutrone setaceo, nervo viridi. Androgynae Bractea foliacea, angusta, sessilis, basi auriculata, propria spica longior. Fem. Bracteae Folia sessilia, masculam terminalem non superantia, duo tantum culmi latera basi amplexentia, auriculata: squamis 2, subrotundis, atro-spadiceis, tertio lateri culmi adpressis. Cal. squamae obovatae, spadiceae, nervo viridi plus minusve conspicuo. Stylus in hac semper bifidus. (o. O.) Capsulae hinc convexa bisulcata, inde planiuscula apice brevissimo bifido, calyce majores. (p. P.)

724. CAREX, vesicaria, spicis masculis pluribus, femineis pedunculatis, capsulis inflatis acuminatis. Linn. Spec. 1388.

α. Cyperoides vesicarium, spicis viridantibus & subfuscis. Scheuchz. Agr. 470? (Hall. 1409?) Tab. XVI. Fig. 2. II.

β. Cyperoides latifolium, spica spadiceo-viridi majus. Scheuchz. Agr. 464. & Cyperoid. angustifol. 452. (Hall. 1398. & 1399?) Tab. XVI. Fig. 2. I.

γ. Cyperoides vesicarium, spicis teretibus erectis majus. Scheuchz. Agr. 476. (Hall. 1401?) Tab. XVI. Fig. 2. III.

H. α & β in paludosis ad pagum Sinn; γ, in fossis urbis & cœmeterii; auf dem Judenvueyer; ad ripas Dilla am steinern Waag frequens. Floret Majo.

T. XVI. f. 2. Var. α, (II) differt: Foliis angustissimis, longissimis; Spicis femineis gracilioribus, pendulis: (♀) quarum infima saepe minoribus spiculis basi aucta; Capsulis minoribus divergentibus. Var. β. (I) Spicis masculis paucioribus, (sape 2,) crassioribus; (♂) infima androgyna; (♂ ♀) Capsulis ellipticis, convexis, subfuscis. (1 p) Hec plurimis notis fructu maturo ad Car. acutae var. β accedit, at stylus semper trifidus.

Var. γ, (III.) Radix crassa, profundissime descendens. Culmi 2-f. 3-pedales, foliati, triquetri, hispidi. Folia lata, carinata, hispida, culmo longiora. Spicae masculae 2 f. 3 terminales, subremora, sessiles, cylindræ: deflorata ventricosiores, squamis laxis. Spicae femineae 2. rarius 3, pendula

dunculata, remota: florentes graciles, (♀, fig. infer.) maturo fructu crassiores, erecta. (♀, fig. super.) Bractæae foliaceae, subvaginantes, inferiores culmum superantes. Cal. squamæ subfusca, nervo viridi: mascula oblonga, acutiuscula; (2 A. ♂) feminea lanceolato-setacea, (2 a) Capsulis breviores. Stylus Nectario acutissime bifido (1 L*) brevior, (n N.) constanter trifidus. (o) Capsulae erecto-patentes, inferiores remotiores: ventricosae, inflatae, striatae, flavescentes, collo acuminato, brevissime birostri. (p. P.)

725. CAREX, *hirta*, spicis remotis: masculis pluribus, femineis subpedunculatis erectis, capsulis hirtis. Linn. Spec 1389. (Hall. 1403.)

H. in pratis udis im Stübersgrund copiose; ad fossas in der Alexbach frequens. Floret Majo.

- T. XVI. f. 3. Radix crassa, teres, subarticulata, squamis vestita setosis; horizontaliter profunde sub terra repens. Culmi spithamai, demum ultrapedales, subfoliati, subirigoni, inter spicas triquetri. Folia latiuscula, carinata, firma, scabra. Spica terminalis, & 1 f. 2 laterales duplo minores masculae, sessiles, oblongae, ventricosae, subapproximatae; Bracteis sessilibus, setaceis, brevibus: (♂) quarum infima carinata, longitudine propriae spicae. Spicae femineae duae, a masculis remotae, pedunculatae, erectae, florentes graciles. (1 ♀) Bractæae foliaceae, vaginantes, carinatae, longitudine masculae terminalis. Cal. squamæ masculae obovatae, purpurascens, nervo viridi apice prominulo; (♂) femineae lanceolato-setaceae, capsulis longiores; inferiores remotiores, alternae. (♀ 2. p) Nectarium apice profunde bifidum. (L. l.) Capsulae ventricosae, acuminata, subbiornes, (p.) supra planiusculae.

In hac Vaginae, Folia, Culmi apex, Squamæ masculae, Capsulae, omnia albedo villosa, Pedunculi & Squamæ femineae tantum. nuda laeves.

SPAR.

SPARGANIUM. G. P. 1041.

TAB. XIII. f. 11. MASC Amentum subrotundum.

(♂) Cal. 3-phyllus. (c. ♂ C.) Cor. nulla.

FEM. Amentum subrotundum. (♀) Cal. 3-phyllus. (♀ c. C.) Cor. nulla. Stigma bifidum. (o) Drupa exsucca, (p) 1-sperma. (r. u. f.) S. N. 615.

726. SPARGANIUM, *erectum*, foliis erectis triquetris. Linn. Spec. 1378. (Hall. 1303.)H. in fossis urbis im *Quiden-vuey*; ad ripas *Dilla am Rockshayn*, alibique frequens. Floret Junio.

Spica simplici & ramosa variat. Calycis foliola erecta, superne latiora, apice inflexo subtrifido. (c) Stamina Calyce longiora. (m. M.) Stigma sapissime unicum, rima longitudinali. (O* o) rarius duo. (o) Drupa (p) Nucleum plerumque unicum, (r) angulatum, (u) monospermum, (f.) condens.

TYPHA. G. P. 1040.

MASC. Amentum cylindricum. Cal. obsoletus, 3-phyllus. Cor. o.

FEM. Amentum cylindricum, infra masculos. Cal. capillo villosa. Cor. o. Sem. 1, infidens Pappo capillari. S. N. 614.

727. TYPHA, *latifolia*, foliis subensiformibus, spica mascula femineaque approximatis. Linn. Spec. 1377. (Hall. 1305.)H. in fossis & stagnis ad *Greifflein* & *Emmerichenhayn*. Floret Julio. †.

Typhæ fructificationis partes sufficienter examinare, mihi nondum licuit.

C. TETRANDRIA.

URTICA. G. p. 1054.

MASC. Cal. 4-phyllus. Cor. o. Nectarium centrale, cyathiforme.

FEM. Cal. 2-valvis. Cor. o. Sem. 1, nitidum. S. N. 621.

728. URTICA, *urens*, foliis oppositis ovalibus. Linn. Spec. 1396. (Hall. 1615.)

H. in

H. in cultis, juxta parietes & fepes hortorum passim. Floret Junio & sequ.

Pharm. URTICÆ MINORIS Herba.

729. URTICA, *dioica*, foliis oppositis cordatis, racemis geminis. *Linn. Spec.* 1396. (*Hall.* 1614.)

H. ad fepes ubique. Floret æstate.

Pharm. URTICÆ MAJORIS Herba, Radix.

In hac & precedente Calyx femineus tetraphyllus: foliolis duobus ovato-cordatis, duobus oppositis ovatis exiguis, quadruplo minoribus.

BETULA, G. P. 1052.

MASC. Cal. 1-phyllus 3-fidus, 3-florus. Cor. 4-partita.

FEM. Cal. 1-phyllus, sub 3-fidus, 2-florus. Semina utrinque membrana alata. S. N. 621.

730. BETULA, *alba*, foliis ovatis acuminatis serratis. *Linn. Spec.* 1393. (*Hall.* 1628.)

H. in sylvis ad Ballersbach; am Homberg. Floret Majo.

Amenta mascula cylindræca breviora, solitaria vel gemina, simplici pedunculo pendula. Calyx squamis constat tribus: media majore; pubescente, laterales 2 obtegente. Corollæ tres patentes, laciniis inequalibus: quarum extimæ reliquis quadruplo major; huic opposita multo minor, utraque oblonga; reliquæ duæ oppositæ, ovatæ, exiguæ, staminibus breviores. Amenta feminea solitaria cylindræca, graciliora, pedunculis petiolaribus pendula. Strobilus cylindricus, squamis membranaceis imbricatus. Semina alata.

731. BETULA, *Alnus*, pedunculis ramosis. *Linn. Spec.* 1394. (*Alnus.* *Hall.* 1630.)

H. ad ripas Dilla am steinern Waag, & alibi frequens. Floret Aprili.

Amenta mascula inferiora, cylindræca, longa; feminea superiora, pauciora; ex uno eodemque pedunculo ramoso pendula. Calyx squamis constat quinis: media majori, latiori, laterales 4 semiobtegente. Corollæ 3 æquales: laciniis erecto-patulis. Strobilus ovatus: squamis coriaceis, duris, ternis semper oppositis instructus. Semina depressa, nuda, non alata.

D. PO-

D. POLYANDRIA.

Stamina plura quam 7.

MYRIOPHYLLUM. G. P. 1066.

MASC. Cal. 4-phyllus. Cor. o. Stam. 8.

FEM. Cal. 4-phyllus; Cor. o. Pistill. 4. Stylus o. Sem. 4, nuda. S. N. 628.

732. MYRIOPHYLLUM, *spicatum*, floribus masculis interrupte spicatis. Linn. Spec. 1409. (*Pentapteris* Hall. 993.)

H. in fossis & fluviis; auf der neuen Wiese, in der Mühlbach, in der Dille vor dem Gebäude frequens. Floret Julio.

Masc. Flores corollati, duplici Calyce instructi; quorum exterior 4-phyllus: foliolo extremo ovato, acuto; lateralibus 2 duplo minoribus; quarto cauli proximo exiguo, saepe nullo. Calyx corollae monophyllus, semiquadrifidus: laciniis erecto patulis, ovatis, acutis, serratis. Corollae Petala quatuor, calycis incisuris inserta, oblonga, convexa, erectiuscula, subpurpurea, Stamina includentia, his erumpentibus mox decidua. Stamina petalis duplo longiora, erecta. Gerinen exiguum in fundo Calycis sterile. Feminei flores apetalii cum Descriptione Generica exacte conveniunt; Capsulas tamen 4 connatas, s. 4-loculares, 4-partibiles, singularem 1 spermam, observo.

733. MYRIOPHYLLUM, *verticillatum*, floribus omnibus verticillatis hermaphroditis. Linn. S. N. 628. Spec. 1409. (*Pentapteris*. Hall. 992.)

H. in piscina Theriotrophei semel lectum. Flores nondum satis examinare licuit. Floret Julio.

CERATOPHYLLUM. G. P. 1065.

MASC. Cal. multipartitus. Cor. o. Stamina 16-20.

FEM. Cal. multipartitus. Cor. o. Pist. 1. Styl. o. Sem. 1, nudum. S. N. 628.

734. CERATOPHYLLUM, *demersum*, foliis dichoromobigeminis, fructibus trispinosus. Linn. Spec. 1409. (Hall. 1599.)

H. in piscinis & fossis ad Beilstein. Floret Julio.

735. CERATOPHYLLUM, *submersum*, foliis dichotomis trigeminis, fructibus muticis. *Linn. Spec.* 1409.
H. cum præcedente rarius. Floret Jullo. †

POTERIUM. G. P. 1069.

MASC. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-partita. Stam. 30-40.

FEM. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-partita. Pist. 2. Bacca e tubo corollæ indurato. S. N. 629.

736. POTERIUM, *Sanguisorba*, inerme, caulibus subangulosis. *Linn. Spec.* 1411. (*Pimpinella*. Hall. 706.)

H. in pascuis & pratis ficcis ubique. Floret Junio.

Pharm. PIMPINELLÆ MINORIS f. SANGUISORBÆ Herba.
In ore masculino etiam Germen & stigmata; at imperfecta steriliaque omnia, uti in VAETERIANA dioica.

FAGUS. G. P. 1072.

MASC. Cal. 5-fidus, campanulatus. Cor. o. Stam. 12.

FEM. Cal. 4-dentatus. Cor. o. Styli 3. Capsula (Calyx antea) muricata, 4-valvis. Sem. 2. S. N. 630.

737. FAGUS, *sylvatica*, foliis ovatis obsolete serratis. *Linn. Spec.* 1416. (Hall. 1622.)

H. in sylvis pervulgaris. Floret Majo.

QUERCUS. G. P. 1070.

MASC. Cal. 5-fidus fere. Cor. o. Stam. 5-10.

FEM. Cal. 1-phyllus, integerrimus scaber. Cor. o. Styli 2-5. Sem. 1, ovatum. S. N. 629.

738. QUERCUS, *Robur*, foliis deciduis oblongis superne latioribus: sinubus acutioribus: angulis obrusis. *Linn. Spec.* 1414. (Hall. 1626.)

H. cum præcedente, vastissimas Sylvas constituens. Floret Majo.

Pharm. QUERCUS Folia, Cortex.

JUGLANS.

JUGLANS, G. P. 1071.

MASC. Cal. 1-phyllus, squamiformis. Cor. 6-partita. *Filamenta* 18.

FEM. Cal. 4-fidus, superus. Cor. 4-partita. *Styli* 2. *Drupa* nucleo sulcato. S. N. 630.

739. JUGLANS, regia, foliolis ovalibus glabris subferratis subæqualibus. *Linn. Spec.* 1415. (*Hall.* 1624.)

H. arbor culta intra & extra urbem, *ut dem unum Ther.* Floret Majo.

CORYLUS, G. P. 1074.

MASC. Cal. 1-phyllus, 3-fidus, squamiformis, 1-florus. Cor. o. *Stam.* 8.

FEM. Cal. 2-phyllus, lacerus. Cor. o. *Styli* 2. *Nux* ovata. S. N. 631.

740. CORYLUS, *Avellana*, stipulis ovatis obtusis. *Linn. Spec.* 1417. (*Hall.* 1625.)

H. in sylvis montosis, ad sepes passim. Floret Martio.

CARPINUS, G. P. 1073.

MASC. Cal. 1-phyllus: squama ciliata. Cor. o. *Stam.* 20.

FEM. Cal. 1-phyllus: squama ciliata. Cor. o. *Germiina* 2. *Styli* singulis 2. *Nux* ovata. S. N. 631.

741. CARPINUS, *Betulus*, squamis strobilorum planis. *Linn. Spec.* 1416. (*Hall.* 1627.)

H. in sylvis passim. Floret Aprili, Majo.

E. MONADELPHIA.

PINUS, G. P. 1077.

MASC. Cal. 4-phyllus. Cor. o. *Stam.* plurima, *Antherae* nudæ.

O 2

FEM.

FEM. *Cal.* strobili: squama 2-flora. *Cor.* o.

Pist. 1. *Nux* ala membranacea excepta.

S. N. 632.

742. PINUS, *sylvestris*, foliis geminis: primordia-
libus folitariis glabris. *Linn. Spec.* 1418. (*Hall.*
1660.)

H. in sylvis montosis passim. Floret Majo.

Pharm. PINI Turiones s. Summitates, Resina.

743. PINUS, *Abies*, foliis folitariis subulatis mu-
cronatis lœvibus bifariam versis. *Linn. Spec.*
1421. (*Hall.* 1656.)

H. in sylvis infrequens. Floret Majo.

Pharm. ABIEIS Resina.

F. SYNGENESIA.

BRYONIA. G. P. 1093.

MASC. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-partita. *Fila-*
menta. 3.

FEM. *Cal.* dentatus. *Cor.* 5-partita. *Stylus* 3-
fidus. *Bacca* subglobosa, polysperma.
S. N. 640.

744. BRYONIA; *alba*, foliis palmatis utrinque cal-
loso-scabris. *Linn. Spec.* 1438. (*Hall.* 574.)

H. in dumetis & sepibus passim. Floret Junio, Julio.

Pharm. BRYONIAE Radix.

Bryonia nostra constanter est dioica. Mas & Femina loco
natali plerumque a se invicem remotissimo crescunt; Semel
tantum, & quidem unico in loco, in sepibus ad-viam:
nach dem Rosenwäldgen; Feminam cum Mare promiscue
scandentem observavi, Caulibus tamen ex diversa Radice
provenientibus.

Maris Pedunculi folio longiores, multi- (10-20) flori; Pedi-
cellis pedunculo brevioribus, sparsis. Floribus majoribus steri-
libus, deciduis; Antheris polliniferis; Pistillo nullo instructis.
Feminæ Pedunculi brevissimi, pauci- (3-6) flori; Pedi-
cellis umbellaribus vel subcymosis, sub florescentia pedunculo
longioribus. Floribus triplo minoribus, albidioribus; Stamini-
bus nullis; Pistillo perfetto fertili; *Bacca globosa, rubra,*
5 s. 6-sperma.

CLASSIS.

CLASSIS XXII.

D I O E C I A.

A. D I A N D R I A.

SALIX. G. P. 1098.

Mas, *Amenti squamæ*, Cor. o. Glandula basios neëtarifera.

FEM. *Amenti squamæ*, Cor. o. Stylus 2-fidus. Caps. 1-locularis, 2-valvis, Sem. papposa. S. N. 647.

a. *Foliis glabris serratis.*

745. SALIX, *triandra*, foliis serratis glabris, floribus triandris. Linn. Spec. 1442. (Hall. 1637.)

H. Mas, ad ripas Dilla gegen dem Schiesplatz über; Femina bey dem Sinnerhoff. Floret Majo.

Amenta pedunculata, foliata. Glandula duplex singula squamæ: unica major, convexa, subemarginata, supra filamenta squamæ basi, & unica minor infra filamenta squamæ medio affixa. Similes glandulas duplices, figura & magnitudine diversas, in omnibus fere Salicibus nostratibus observavi. In nonnullis utraque glandula basi coalita, filamentorum basin vestiens; in aliis inferior longior ipsa superiori, in aliis vice versa.

746. SALIX, *phylicifolia*, foliis serratis glabris lanceolatis: crenis undatis. Linn. Spec. 1442.

H. Mas, in salicetis bey dem Sinnerhoff. Floret Majo.

747. SALIX, *vitellina*, foliis serratis ovatis acutis glabris: ferraturis cartilagineis, periolis callosopunctatis. Linn. Spec. 1442. (Hall. 1635. β?)

H. Mas, an der Mühlbach; am Sieghäuserweg. Floret Majo.

748. SALIX, *amygdalina*, foliis serratis glabris lanceolatis periolatis, stipulis trapeziformibus. Linn. Spec. 1443. (Hall. 1636.)

H. Femina, ad ripas Dilla gegen dem Schiesplatz über, inter S. triandr. & fragilem. Floret Aprili.

749. SALIX, *bastata*, foliis serratis glabris subovatis acutis scissilibus, stipulis subcordatis. Linn. Spec. 1443. (Hall. 1654?)

H. in salicetis auf der Sandwiese parcius. Floret Aprili, Majo.

750. *SALIX, fragilis*, foliis ferratis glabris ovato-lanceolatis, petiolis dentato-glandulosis, *Linn. Spec. 1443 (Hall. 1638.?)*

H. Mas, & Femina ad ripas Dilla; am steinern Waag. Floret Majo.

751. *SALIX, purpurea*, foliis ferratis glabris lanceolatis: inferioribus oppositis, *Linn. Spec. 1444.*

H. Mas, an der Mühlbach; bey dem Sieghaus, Floret Majo.

752. *SALIX, Helix*, foliis ferratis glabris lanceolato-linearibus: superioribus oppositis obliquis, *Linn. Spec. 1444. (Hall. 1640.)*

H. Mas ad ripas Dilla, auf der Weißgärberwiese; & alibi non infrequens. Floret Aprili.

Amenta in junioribus ramis opposita, in adultioribus alterna: Squamis constanter monandris. Anthera crassa, tetradyma, juvenilis coccinea.

753. *SALIX, myrsinites*, foliis ferratis glabris ovatis venosis, *Linn. Spec. 1445. (Hall. 1645?)*

H. Femina, an der Mühlbach bey der ohern Walckmühle; ad marginem pratorum auf dem Schlüssel. Floret Aprili.

b. Foliis integerrimis, villosis.

754. *SALIX, aurita*, foliis integerrimis utrinque villosis obovatis appendiculatis, *Linn. Spec. 1446. (Hall. 1652.)*

H. Femina, in sylvaticis am Hamberg; in sepibus am Heiligen-Fluß. Floret Majo.

755. *SALIX, arenaria*, foliis integris ovatis acutis: supra subvillosis, subtus tomentosis, *Linn. Spec. 1447. (Hall. 1642.)*

H. Mas, ad ripas Dilla, auf der Weißgärberwiese; Femina an der Mühlbach bey dem Sieghaus, alibique, Floret Aprili.

c. Foliis subserratis, villosis.

756. *SALIX, caprea*, foliis ovatis rugosis: subtus tomentosis undatis, superne denticulatis, *Linn. Spec. 1448. (Hall. 1653.)*

H. Mas, unter der neuen Brücke; Femina, in der Callenbach, vulgaris. Floret Aprili.

757. *SALIX, viminalis*, foliis subintegerrimis lanceolato-linearibus longissimis acutis subtus fericeis, ramis virgatis. *Linn. Spec. 1448.* (*Hall. 1641.*)

H. Mas, ad ripas *Dilla* unter der neuen Brücke; Femina ibidem & am steinern Waag. Floret Aprili.

758. *SALIX, cinerea*, foliis subserratis oblongo-ovatis: subtus subvillosis, stipulis dimidiato-cordatis. *Linn. Spec. 1449.*

H. Femina, ad ripas *Dilla* cum præcedente. Floret Aprili.

759. *SALIX, alba*, foliis lanceolatis acuminatis serratis utrinque pubescentibus: ferraturis infimis glandulosis. *Linn. Spec. 1449.* (*Hall. 1635.*)

H. Femina, an der Mühlbach; am Sieghäuserweg. Floret Majo.

B. TETRANDRIA.

VISCUM. G. P. 1105.

MAS. *Cal. 4-partitus. Cor. o. Filamenta. o. Antheræ calyci adnatæ.*

FEM. *Cal. 4-phyllus, superus. Stylus o. Cor. o. Bacca 1-sperma. Sem. cordatum. S. N. 650.*

760. *VISCUM, album*, foliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo, spicis axillaribus. *Linn. Spec. 1451.* (*Hall. 1609.*)

H. in Pyro, Malo, imprimis Quercu. parasitica; ad pagum Seelbach frequens. Floret Martio.

Pharm. Visci Lignum.

C. PENTANDRIA.

CANNABIS. G. P. 1115.

MAS. *Cal. 5-partitus. Cor. o.*

FEM. *Cal. 1-phyllus, integer, latere hians. Cor. o. Styli 2. Nux 2-valvis, intra calycem clausum. S. N. 653.*

761. *CANNABIS, sativa. Linn. Spec. 1457.* (*Hall. 1616.*)

H. in cultis & agris, inter segetes *in der Aus rarius*, Floret Julio.

Pharm. CANNABIS Semina.

HUMULUS. G. P. 1116.

MAS. Cal. 5-phyllus. Cor. o.

FEM. Cal. 1-phyllus, oblique patens, integer. Cor. o. Styli 2. Sem. 1, intra calycem foliatum. S. N. 653.

762. HUMULUS, *Lupulus*, Linn. Spec. 1457. (*Lupulus*, Hall. 1618.)

H. in dumetis & sepibus *am Sieghäuserweg*; alibique copiosissime. Floret Julio.

Pharm. LUPULI Flores, (potius Strobili.)

D. OCTANDRIA.

POPULUS. G. P. 1123.

MAS. Amenti Cal. lamina lacera. Cor. turbinata, obliqua, integra.

FEM. Amenti Cal. & Cor. maris. Stigma 4-fidum: Caps. 2-locularis. Sem. multa, papposa. S. N. 656.

763. POPULUS, *alba*, foliis subrotundis dentato-angulatis subtus tomentosis. Linn. Spec. 1463. (Hall. 1634.)

H. Mas, ad pagos frequens; ad ripas *Dilla* alibique parcius. Floret Martio, Aprili.

Gemmæ floriferae ovata, fusca, nitida: squamis interioribus margine laceris, scariosis. Amenta crassiora, longiora, quam in *P. nigra*, ex ovata basi cylindracea. Cal. squamæ semimultifida: laciniis simplicibus, villosis. Stamina 8.

764. POPULUS, *tremula*, foliis subrotundis dentato-angulatis utrinque glabris. Linn. Spec. 1464. (Hall. 1633.)

H. Mas in sylvaticis *am Geistlichenberg*, alibique frequens; Femina *am Hirschberg bey der Hoerbacher Mühle*. Floret Martio.

Hujus partes fructificationis uti in præcedente.

765. *POPULUS, nigra*, foliis deltoidibus acuminatis ferratis. *Linn. Spec. 1464. (Hall. 1632.)*

H. Mas ad ripas Dilla passim. Floret Martio.

Pharm. *POPULI* Geminae.

Geminae floriferae ovato-oblonga, acuminata: squamis integris, viscosis. Amenta cylindracea. Cal. squamæ 3- f. 4- partita: laciniis pinnatifido-multifidis, nudis. Stamina 16.

E. ENNEANDRIA.

MERCURIALIS. G. P. 1125.

MAS. Cal. 3-partitus. Cor. o. Stam. 9- f. 12. Antheræ globosæ, didymæ.

FEM. Cal. 3-partitus. Cor. o. Styli 2. Capsula dicocca, 2-locularis, 1-sperma. S. N. 657.

766. *MERCURIALIS, perennis*, caule simplicissimo, foliis scabris. *Linn. Spec. 1465. (Hall. 1601.)*

H. in nemorosis ad *Erbach* copiosissime, in sylvaticis montosis am *Homburg über der Lithau*; am *Callenbachsberg* rarius. Floret Aprili, Majo.

767. *MERCURIALIS, annua*, caule brachiato, foliis glabris, floribus spicatis. *Linn. Spec. 1465. (Hall. 1600.)*

H. in cultis inter olera rarius. Floret Julio.

Pharm. *MERCURIALIS* Herba.

F. MONADELPHIA.

JUNIPERUS. G. P. 1134.

MAS. *Amepti* Calyx squamæ. Cor. o. Stam. 3.

FEM. Calyx 3-partitus. Petala 3. Styli 3. Bacca 3-sperma, tribus tuberculis calycis inæqualis. S. N. 660.

768. *JUNIPERUS, communis*, foliis ternis patentibus mucronatis, bacca longioribus. *Linn. Spec. 1470. (Hall. 1661.)*

H. sylvis & montosis sterilibus passim. Floret Aprili, Majo.

Pharm. *JUNIPERI* Radix; Lignum, Baccæ, Resina: (*SANDARACA*.)

Antheræ sub squamis lateralibus sæpe 5.

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

A. MONOECIA.

HOLCUS. G. P. 1146.

HERMAPHROD. Cal. Gluma 1 - f. 2 - flora.
Cor. Gluma aristata. Stamina 3. Styli 2.
Semi. 1.

MASC. Cal. Gluma 2 - valvis. Cor. 6. Stam.
3. S. N. 669.

769. HOLCUS, *mollis*, glumis bifloris nudiusculis:
flosculo hermaphrodito murico; masculo aris-
ta geniculata. *Linu. Spec. 1485. (Avena.*
Hall. 1485.)

H. in dumetis & sepibus in der Alzbach; am Geistlichenberg;
im Fischruveyhergrund copiose. Floret Julio; Augusto.

T. VII. f. 7. Radix repens. Culmi pauci, 2 f. 3 - pedales, foliati,
7 - f. 9 - node: a. laevi, prostrati, vel erecti: articulis infimis 3 f. 4
procumbentibus: Geniculis subrotundis, villosis. Folia lata,
plana, apicem versus involuta, laevia, supra villis raris vix
per lentem conspicuis tactu mollia: Vaginis laevibus; Ligula
ovata, crenulata. Panicula 3 - f. 4 - pollicaris, sub florescen-
tia patens, albida; demum contracta, flavescens. Pedunculi
& Pedicelli gemini, pauciflori, patentes, stricti, levissime villosi.
basi callosi. Calyx inaequalis, ovato-acuminatus, compressus,
carinatus, subciliatus: (a. A) Valv. exterior brevior, acuta
albido-virens, basi purpurascens: interior major, mucronata,
nervis tribus viridibus: quorum duo laterales carina approxi-
mati, eisdemque paralleli, a margine remoti. Flosculi duo-
calyce minores: quorum inferior subsessilis, hermaphroditus:
(♂) superior pedicellatus, masculus, angustior; (♂) sin-
guli Valv. exterior ventricosa, trinervia, interior plana,
mutica, subaequalis. Masculus infra apicem Aristam exsertit
dorsalem, scabram, rectam, demum geniculo subreflexam, (♂. X.)
Calyce longiore. In utroque Flosculo Stamina tria, calyce
breviora: Antheris flavescens. Hermaphroditi Nectaria
2, lanceolata-acuminata (l. L.) Germine longiora. Ger-
men subovatum. (n. ♀.) Styli patentes, plumosi. Semen ovatum,
acutum,

acutum, corolla adnatum, (f. S.) calyce tectum, (a. f.)
Maris Germen Nectarique exigua. (♂, n) Styli brevif-
simi, villosi. Semen abortiens.

Variat rarius; a) Flosculo utroque Hermaphrodito, fertili.
 b, Calyce uno alterove trivalvi, trifloro: quorum im-
 finus flosculus masculus; reliqui duo pedicello opposite affixi
 hermaphroditi, unus infra apicem Aristam unicam, alter ex
 ipso apice Aristas duas exserit rectas.

770. *Holcus, lamatus*, glumis bifloris villosis:
 flosculo hermaphrodito mutico, masculo ari-
 sta recurva. *Linn. Spec. 1485. (Avena. Hall.*
1484.)

T. VII. f. 6- Radix multiplex, densa, fibrosissima, radiculis submontosis.
 Culmi plures, aggregati, foliati, erecti, articulo uno alterove infe-
 riore obliquo: Geniculis 3 f. 4, cylindraccis, incrassatis, villosis.
 Folia lata, plana, utrinque mollissime villosa: Vaginis laxis,
 friatis, villosis, suprema ventricostis; Ligula truncata cre-
 nulata. Panícula 4 f. 6- pollicaris, patens, subdiffusa, vario
 & pulchre colorata, demum pallescens. Pedunculi gemini,
 multiflori, horizontales, mollissime sericeo-villofi. Calyx bi-
 florus uti in precedenti, glumis majoribus, oblongioribus, pu-
 bescentibus, magis coloratis, carina setis patulis distinctioribus
 ciliatis: (a A) interioris Valvulæ Nervi laterales duo a ca-
 rina remoti, margini (nec carina) paralleli. Flosculi duo
 uti in H. molli; Hermaphroditus setis paucis basi subhirsutus. (♀)
 Maris Arista glabra, recta, (X*) demum recurva, uncinata,
 calyce brevior. (X ♂) Anthææ rubra seu flavæ. Nectararia
 duo lanceolata, longitudine germinis. (l l.) Germen Hermaphro-
 diti, (n. N. ♀.) Maris, (n. N. ♂) & reliqua uti
 in H. molli. In hoc sæpius observantur: Flosculi pauci in ra-
 mulis Panícula inferioribus minores, albidi, steriles, emarcescendi
 pediculi.

VALANTIA. G. P. 1151.

HERMAPHROD. Cal. o. Cor. 4- partita. Stam. 4-
 Stylus 2- fidus. Sem. 1.

MASC. Cal. o. Cor. 3- f. 4- partita. Stam. 3-
 f. 4. Pistillum obsoletum. S. N. 672.

771. VALANTIA, *Cruciata*, floribus masculis qua-
 drifidis, pedunculis diphyllis. *Linn. Spec. 1491.*
(Galium. Hall. 709)

H. in

H. in dumetis & sepibus ad pagum *Breitscheid* copiose; *auf dem Schiesplatz* parcius. Floret Majo, junio.

Pharm. CRUCIATÆ Herba.

Radix fibrosa, perennis. Caules plures, simplices, infirmi, erecti-
sculi, tetragoni, pilosi. Folia quaterna, ovato-lanceolata,
marginibus carinisque pilosa. Pedunculi axillares, utrinque
tres, diphylli, pilosi, trifidi: Pedicellus intermedius simplex,
brevior. Flore hermaphrodita, (a) seu a parte masculina
sterili, fructifero, instructus; duo laterales ramoso-quadrifidi;
quorum infimus Peduncellus utrinque Florem hermaphroditum
(b) seu a parte feminea sterilem; reliqui tres Flores masculos
(c) proferunt. Flores masculi (c) Antheris polliniferis,
Pistillo nullo instructi, steriles, decidui. Hermaphroditi (b.)
Anthera pollinifera; Germen exiguum; Stylus bifidus, brevissi-
mus; Fructus rudimentum abortiens, nutans. Hermaphro-
dita Floris (a) Anthera polline destituta; Germen didymum;
Stylus semibifidus; Fructus unicus plerumque, altero abor-
tiente, reniformi-globosus, glaber, nervosus, monospermus;
pedicello revolutus, foliis reflexis caulique arcte adpressis occul-
tatus. Foliolis floralibus tribus, Floribusque tam masculis quam
hermaphroditis quinquefidis, saepe ludis.

ACER. G. P. 1155.

HERMAPHROD. Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala,
Stam. 8. Pistill. 1. Caps. 2 s. 3, mono-
spermæ, ala terminatæ.

MASC. Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala. Stam.
8. S. N. 674.

772. ACER, *Pseudo-Platanus*, foliis quinquelobis
inæqualiter ferratis, floribus racemosis. *Linn.*
Spec. 1495. (*Hall.* 1029. ****)

H. pulcherrima arbor altitudine cum *Quercu* certans, in nemo-
ribus *Steinkammern* vulgo dictis, ad pagum *Erbach* frequens.
Floret Majo.

Racemi subovati, cernui. Flores flavo-virentes. Capsularum
ala erecta.

773. ACER, *Platanoides*, foliis quinquelobis acumi-
natis acute dentatis glabris, floribus corym-
bosis. *Linn. Spec.* 1496. (*Hall.* 1029. ****)

H. in sylvis im *Hirschberg* rarius. Floret Majo. †.

774. ACER, *campestre*, foliis lobatis obtusis emar-
ginatis. *Linn. Spec.* 1497. (*Hall.* 1029. *****)

H. in

H. in sepibus hortorum passim sterilis; in sylvaticis montosis
am Beilslein ad viam publicam & *am Callenbachsberg* fertilis.
 Floret Majo.

Corymbi triplices flores, flavi: a, Flores masculi reliquis mi-
 nores: Antheris polliniferis, Pistillo nullo; b, Hermaphro-
 diti: Antheris polliniferis Pistilloque imperfecto sterili; c, Fl.
 hermaphroditæ majores: Filamentis corolla brevioribus,
 Antheris polline æstuantis, Pistillo perfecto fertili, instructis.
 Capsularum ala patentes. Receptaculum proprium columnare,
 apice bifido.

ATRIPLEX. G. P. 1153.

HERMAPHROD. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Stam.
 5. Stylus 2- partitus. Sem. 1, depressum.
 FEM. Cal. 2-phyllus. Cor. o. Stam. o. Stylus
 2- partitus. Sem. 1. compressum. S. N.
 673.

775. ATRIPLEX, *bortensis*, caule erecto herbaceo,
 foliis triangularibus. *Linn. Spec. 1493.*

H. in cultis in der *Pitze*, quasi spontanea frequens. Floret Julio.

776. ATRIPLEX, *bastata*, caule herbaceo, calycinis
 valvulis femineis magnis deltoidibus sinuatis.
Linn. S. N. 673. Spec. 1494. (Hall. 1617.)

H. ad vias, in cultis in der *Pitze*; vor dem *Homburg*, & alibi
 frequens. Floret Julio, Augusto.

Calycinæ valvulæ femineæ haud raro in hac etiam disco dentata.

777. ATRIPLEX, *patula*, caule herbaceo patulo, fo-
 liis subdeltoideo-lanceolatis, calycibus feminum
 disco dentatis. *Linn. Spec. 1494. (Hall. 1616*)*

H. in cultis passim. Floret Julio, Augusto.

B. D I O E C I A.

FRAXINUS. G. P. 1160.

HERMAPHROD. Cal. o. Cor. o. Stam. 2. Pist.
 1. Sem. 1, lanceolatum.

FEM. Pist. 1. lanceolatum. S. N. 679.

778. FRAXINUS, *excelsior*, foliolis serratis, floribus
 apetalis. *Linn. Spec. 1509. (Hall. 528.)*

H. ad ripas *Dilla*; an der *Mühlbach*; in sepibus im *Rosen-
 waldgen*. Floret Aprili.

Pharm. FRAXINI Cortex. Semina.

CLASSIS

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

A. F I L I C E S.

* *Fructificationes spicatæ.*

EQUISETUM. G. P. 1169.

*Spica fructificationibus peltatis, basi dehiscen-
tibus multivalvi. S. N. 684.*

779. EQUISETUM, *sylvaticum*, caule spicato, frondibus compositis. *Linn. Spec. 1516. (Hall. 1680.)*

H. in sylvis in der Hoerre copiose, circa Langenbach, Rehe, & Breitscheid frequens; am Beilstein rarius. Floret Aprili, Majo.

Frondes 3 s. 4- pedales: Caule gracili, scabro; Vaginis amplis, dilatatis: dentibus latis. Folia in singulo Verticillo 16-24, longa, stricta, tenuia, tetragona, subscabra, iterum verticillata; Foliolis quinis vel septenis. Spica terminalis elongata in eadem fronde.

780. EQUISETUM, *arvense*, scapo fructificante nudo; sterili frondoso. *Linn. Spec. 1516. (Hall. 1676.)*

H. in agris in der Aue; in cultis in der Pitze copiosissime. Floret Aprili, Majo.

Pharm. EQUISETI Herba.

Scapus fructificans brevis, crassus, aphyllus, marcescens: Vaginis amplis, laxis. Spica oblonga, ventricosa, acuta. Frondes steriles superiores, sesquipedales, scabra: Caule tenui; Vaginis multidentatis; Foliis 12-15 in singulo verticillo, subramosis.

781. EQUISETUM, *palustre*, caule angulato, frondibus simplicibus. *Linn. Spec. 1516. (Hall. 1677. α. & β III.)*

β, Equisetum palustre minus polystachyon. *Bauh. Pin. 16. (Hall. 1677. α II.)*

H. α in pratis paludosis hinter dem Homberg; β, in pratis aquosis auf der Burgermeisterwiese rarius. Floret Junio.

Scapus fructificans pedalis, angulato sulcatus, levius, nudus: Spica reliquis minore, ovata, destituta graciliori, lineari. Sub florascencia Folia 6 s. 10 ex Vaginis atris enascuntur brevia, dentata.

demum longiora, sulcata, lavis; apice caulis antea spicifero, in mucronem folio similem longissimum producto.

Hujus Pollen ex Spica Peltis recens excussum, omnium vivacissima saltata vidi.

Pollen hoc Spharula constat nitidis; quarum singula juxta basim emittit fila quatuor albida aequalia, duo semper duplo longiora, omnia apice in tendiculam terminata; ante explicationem globulorum arcte circumligantia. Si charta imponuntur, fila omnia elasticè simul, annexa basi, dissiliunt; alternaque contractione & dilatatione, sphaerula tripudiare, & pyroboli instar subsultus facere, per lentem observantur.

Var. β , differt: Frondibus minoribus; Foliiis fere omnibus apice spiciferis; caulina Spica reliquis duplo majore.

782. *EQUISETUM, fluviatile, caule striato, frondibus subsimplicibus. Linn. Spec. 1517. (Hall. 1675.)*

H. in fossis auf der neuen Wiese, am Bockshayn copiose. Floret Majo, Junio.

Scapus fructificans 3 f. 4-pedalis, crassitie digiti minoris, aphyllus, strictus, fistulosus, glaber. Spica coloratiuscula: Polline carulescente. Frondes steriles majores, laeves; Vaginis multidentatis; Foliiis in singulo verticillo 24-36-simpliciusculis, tetragonis, sulcatis, lavis.

783. *EQUISETUM, limosum, caule subnudo laevi. Linn. Spec. 1517. (Hall. 1677. β . II.)*

H. in paludibus am Mühlberg circa Sinn copiosissime. Floret Majo.

Specimina mea vix credo differre a precedente; Caulis minus sulcatus, Vaginæ ampliores, argutius dentata. Folia pauciora, saepe nulla. Spica similima.

784. *EQUISETUM, hyemale, caule nudo scabro basi subramoso. Linn. Spec. 1517. (Hall. 1679.)*

H. in sylvaticis uliginosis im Freitscheiderwald; ad Langenbach, bey dem vilden Weiberhäusen frequens. Floret Majo.

Caulis 3-4-5-pedalis simplex, teres, strictus, sulcatus, asperimus, basi tantum rariis foliosus; Vaginis brevibus, artèis, albis; denticibus nigris. Equisetum hoc ob eximiam durabilioremque asperitatem, Scriniariis, Tornatoribus & Aurisabris necessarium; ad levigationem & politionem aptissimum.

OPHIOGLOSSUM. G. P. 1171.

Spica articulata, disticha: articulis transversim dehiscentibus. S. N. 684.

785. OPHIOGLOSSUM, *vulgatum*, frondè ovata. Linn. Spec. 1518. (Hall. 1685. Weis. Plant. crypt. 283.)

H. in pratis editoribus subhumidis in der Alzbach; am Homberg; im Guldnersgrund; im Thiergarten copiose. Floret Junio.

Pharm. OPHIOGLOSSI Herba.

OSMUNDA. G. P. 1172.

Spica ramosa: Fructificationibus globosis. S. N. 684.

786. OSMUNDA, *Lunaria*, scapo caulino solitario, fronde pinnata solitaria. Linn. Spec. 1519. (Hall. 1686. Weis. P. c. 285.)

H. in pratis & pascuis siccioribus hinter dem Homberg; im Thiergarten bey dem alten Ham copiose; am Rehberg parcius. Floret Majo, Junio.

Pharm. LUNARIÆ Herba.

787. OSMUNDA, *Spicant*, frondibus lanceolatis pinnatifidis: laciniis confluentibus integerrimis parallelis. Linn. Spec. 1522. (Strutbiopteris. Hall. 1687. Weis. P. c. 287.)

H. in sylvaticis circa Niederäresselndorff & Burbach rarius. Floret Junio.

** Fructificationes frondosæ; in pagina inferiore.

ACROSTICHUM. G. P. 1173.

Fructificationes discum totum frondis tegentes. S. N. 685.

788. ACROSTICHUM, *septentrionale*, frondibus nudis linearibus laciniatis. Linn. Spec. 1524. (Hall. 1714. Weis. P. c. 301.)

H. in fissuris rupium am Homberg; im Beilstein, alibique. Floret Aprili.

POLYPODIUM. G. P. 1179.

Fructificationes in punctis subrotundis, sparsis per discum frondis. S. N. 691.

a. Frondè pinnatifida lobis coadunatis.

789. POLYPODIUM, *vulgare*, frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis subferratis obtulis, radice squamata. Linn. Spec. 1544. (Hall. 1696. Weis. P. c. 303.)

H. ad

H. ad radices Quercuum inque rupium fissuris, *am Hornberg & Beilstein* rarius; *im Hirschberg* ad *Guntersdorf* alibi que copiose. Floret April.

Pharm. POLYPODI: Radix.

b. *Fronde pinnata.*

790. POLYPODIUM, *fontanum*, frondibus pinnatis laciniatis: foliolis subrotundis argute incis, stipite lævi. *Linn. S. N. 693. Spec. 1550. Hall. 1706.*

H. ad radices rupium *am Galgenberg*, parcius. Floret Majo. ✕

c. *Fronde subbipinnata.*

791. POLYPODIUM, *cristatum*, frondibus subbipinnatis: foliolis ovato-oblongis: pinnis obtusiusculis apice acute ferratis. *Linn. Spec. 1551. Hall. 1705. Weis. P. c. 317. var. Fil. fem.*

H. in dumetis *auf dem Galgenberg*. Floret Majo.

792. POLYPODIUM, *Filix mas*, frondibus bipinnatis: pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo. *Linn. Spec. 1551. Hall. 1701. Weis. P. c. 310.*

H. in sylvis, ad sepes locis umbrosis passim. Floret Junio, Julio.

Pharm. FILICIS Radix.

793. POLYPODIUM, *Filix femina*, fronde bipinnata: pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis. *Linn. Spec. 1551. Hall. 1703. Weis. P. c. 313.*

H. in sylvaticis *am Hornberg*, in nemorosis ad *Erbach* frequens. Floret Julio.

794. POLYPODIUM, *aculeatum*, frondibus bipinnatis: pinnis lunularis ciliato-dentatis, stipite strigoso. *Linn. Spec. 1552. Hall. 1712. Weis. P. c. 322.*

H. in nemorosis ad *Breitscheid*; *im Hirschberg*, & alibi infrequens. Floret Julio.

795. POLYPODIUM, *fragile*, frondibus bipinnatis: foliolis remotis: pinnis subrotundis incis. *Linn. Spec. 1553. Hall. 1707. Weis. 319. α.*

H. in muris pomœrii, in rupium fissuris *bey dem Kalkofen*; in nemorosis circa *Erbach* copiosissime. Floret Julio.

796. POLYPODIUM, *regium*, frondibus bipinnatis: foliolis suboppositis: pinnis alternis laciniatis. *Linn. S. N. 694. Spec. 1553. Hall. 1708. Weis. P. c. 321. β. var. præc.*

R

H. in

H. in rupibus ad arcem Beilstein frequens. Floret Julio.

d. *Fronde supradecomposita.*

797. *POLYPODIUM*, *Dryopteris*, frondibus supradecompositis: foliolis ternis bipinnatis. *Linn. Spec.* 1555. *Hall.* 1699. *Weisf. P. c.* 324.

H. in fissuris rupium bey dem Eulenhause; am Homberg; im Hirschberg copiose. Floret Julio.

ASPLENIUM, G. P. 1178.

Fructificationes in lineolis disci frondis sparsis. S. N. 689.

a. *Fronde pinnatifida.*

798. *ASPLENIUM*, *Ceterach*, frondibus pinnatifidis: lobis alternis confluentibus obtusis. *Linn. S. N.* 689. *Spec.* 1538. *Hall.* 1694.

H. in fissuris rupium bey der Krebsgrube im Kamp; im Thiergarten frequens. Floret Junio, Julio.

Pharm. CETERACH Herba.

b. *Fronde pinnata.*

799. *ASPLENIUM*, *Trichomanes*, frondibus pinnatis: pinnis subrotundis crenatis. *Linn. Spec.* 1540 *Hall.* 1693. *Weisf. P. c.* 296.

H. in rupium fissuris hinter dem Schloß copiose. Floret Aprili.

Pharm. ADIANTI RUBRI f. TRICHOMANIS Herba.

800. *ASPLENIUM*, *Ruta muraria*, frondibus alternatim decompositis: foliolis cuneiformibus crenulatis. *Linn. Spec.* 1541. *Hall.* 1694. *Weisf. M. M.* 298.

H. in muris antiquis passim. Floret Aprili.

Pharm. RUTÆ MURARIÆ Herba.

801. *ASPLENIUM*, *germanicum*. *Weisf. P. c.* 399.

Asplenium caule pinnato, pinnis imis trifoliatis, superioribus simplicibus dentatis. *Hall.* 1690.

H. in rupium fissuris am Homberg, am geistlichen Berg; im Beilstein; & alibi parcius. Floret Majo.

Diversissimum a precedente. Frondes multo angustiores, altiores, magisque erecta, simpliciter pinnata. Stipes subtrigonus, uno latere planiore, ad duas tertias partes nudus, inferne fusco-purpureus, demum rufescens, inter folia flexuosus. Pinnæ 5 l. 7, subopposita, angusta, cuneiformi-oblonga, erecta, apice obtuso, inciso-crenato, albo sulcato; quarum infima dua subpetiolata,

lata, subtrifoliata, f. trilobata; lobo infimo ad petiolum usque diviso; reliqua pinna simpliciores, subbifida; terminali longiore subdentata. Fruct. Lineolæ 2 f. 5, longa, distincta, squama albida longitudinaliter rupta, cinæa; demum non confluentes. Foliolique discum minime obtegentes, uti in R. muraria. Capsulæ pauciores, subsusca, annulo crassiore.

802. *ASPLENIUM, Adiantum nigrum*, frondibus subtripinnatis: foliolis alternis: pinnis lanceolatis inciso ferratis. *Linn. Spec. 1541. Hall. 1692.*

H. in rupibus *am Homberg* parcius; *im Beilstein* frequens. Floret Martio.

PTERIS. G. P. 1174.

Fructificationes in lineis marginalibus. S. N. 687.

803. *PTERIS, aquilina*, frondibus supradecompositis: foliolis pinnatis: pinnis lanceolatis: infimis pinnatifidis; superioribus minoribus. *Linn. Spec. 1533. Weis. P. c. 289. Filix. Hall. 1688.*

H. in sylvis ad *Breitscheid; Schönbach; & Niederdreßelndorf*. Floret Julio. ✱.

B. M U S C I.

• *Acalyptrati.*

LYCOPODIUM. G. P. 1185.

Anthera bivalvis, sessilis. Calyptra nulla. S. N. 697.

804. *LYCOPODIUM, clavatum*, foliis sparsis filamentosis, spicis teretibus peduncularis geminis. *Linn. Spec. 1564. Hall. 1722. Weis. P. c. 269. Neck. Method Musc. 150.*

H. in sylvis in der *Hoerre* circa *Bicken*; im *Hirschberg* copiose. Floret Julio.

Pharm. MUSCI CLAVATI Herba; *LYCOPODII* Semen.

805. *LYCOPODIUM, annotinum*, foliis sparsis quinque fariis subserratis, surculis annotino-articulatis, spicis terminalibus glabris erectis. *Linn. Spec. 1566. Hall. 1720. Weis. P. c. 272. Neck. M. M. 146.*

H. in sylvis montosis ad *Haynchen* versus *Siegen*. *Ebertz. M. D.* Floret Julio. ✱.

SPHAGNUM. G. P. 1187.

Anthera operculata: ore lævi. Calyptra nulla.
S. N. 698.

- 806: SPHAGNUM, *palustre*, ramis deflexis, Linn. Spec. 1569. Hall. 1724. Weisf. P. c. 263. Hypn. cubile. Neck. M. M. 188.

β. Sphagnum palustre molle deflexum, squamis capillaceis. Dillen. H. M. 243 T. 32. f. 2.

H. α. & β. in paludosis unter dem Sinnerhof copiose. Floret Julio.

PHASCUM. G. P. 1189.

Anthera operculata: ore ciliata. Calyptra minura. S. N. 699.

807. PHASCUM, *acaulon*, acaule, anthera sessili, foliis ovatis acutis. Linn. S. N. 699. Spec. 1570. Weisf. P. c. 266. Sphagnum. Hall. 1726. Br. bulbiforme. Neck. M. M. 230.

β. Shagnum acaulon bulbiforme minus. Dillen. H. M. 252 T. 32. f. 12.

α, in areis hortorum passim; β. ad scrobes & vias cavae humidas am Homberg. Floret Martio, Aprili.

Surculi in α, basi ramosi, in β. simplices. Folia nervo centrali non destituta: superiora triplo majora, apice pilifera. Anthera subglobosa, subpedunculata, rufa. Calyptra Antheram oblique semivestiens, rostrata. Operculum rostratum, rectum, in hoc & sequente non deciduum. Ciliis nondum vidi.

808. PHASCUM, *subulatum*, acaule, anthera sessili, foliis subulato-fetaceis patulis. Linn. Spec. 1570. Weisf. P. c. 268. Sphagnum. Hall. 1727. Bryum ericetorum. Neck. M. M. 231.

H. ad aggeres fossarum, am Homberg alibique frequens. Floret Martio.

Surculi caulescentes, simplices, ad duas tertias partes terra absconditi. Folia inferiora ovato-acuminata, carinata, reflexa: superiora longissima, lineari-subulata, plana, nervo destituta; juniora subsecunda. Anthera ovalis, pedunculata, flava. Calyptra & Operculi rostrum obliquum.

.. Calyptrati declini.

POLYTRICHUM. G. P. 1192.

Anthera operculata, apophysi minimæ insidens. Calyptra villosa.

Stella

Stella feminea in distincto individuo. S.N. 700.

809. *POLYTRICHUM, commune*, caule simplici, anthera parallelepipedæ. *Linn. Spec. 1573.*

α. majus, *Weis. P. c. 168. Neck. M. M. 124. Mnium. Hall. 1835.*

β. minus, *Weis. P. c. 171. Mn. Hall. 1835. α. γ.*

γ. pilosum, *Weis. P. c. 172. Neck. M. M. 123. Mpium. Hall 1836.*

H. in sylvis passim; α, in uliginosis spongiosis im *Beilstein, & Hirschberg* copiose; β, in pascuis editioribus subudis, am *Homburg & geistlichen Berg*; γ, in montosis siccis auf dem *Eulenhause* alibique. Floret Novembr. in ver usque.

Pharm. α, ADIANTI AUREI Herba.

Pol, hoc Calyptra gaudet duplici: exteriore pilosa, interiora multo minore, membranacea, albida, laevi, exteriore obtecta. In Var. γ. Folia apice pilifera, certe margine non serrata

810. *POLYTRICHUM, urnigerum*, caule ramosissimo, pedunculis axillaribus. *Linn. Spec. 1573. Neck. M. M. 120. Bryum. Hall. 1801*

H. in montosis sylvaticis Theriotrophei, alibique frequens. Floret autumnò in ver usque.

Surculi juniores simplices, fere acaules, sequentis simillimi; Foliis serratis viridibus stellatim expansis: Pedunculo terminali; adultiores demum ex latere ramosi, 2- f. 3- pollicares, subdichotomi, ramis fastigiatis, apice incrassatis. Folia inferiora bimpatula, rufa; superiora annotina arcta, viridia. Pedunculi axillares, lateralesque, rubri, 2- 3- pollicares: Vagina rufa: Tuberculo flavescente, acuto, non bulboso. Anthera ovato-cylindracea, rufa, erecta; demum obliqua f. subcernua basi, ventricosa albida: Operculo fulvo, cuspidè albida: Ore annulato, membrana albida tecto; Ciliis 32; Apophysi nulla.

Surculi feminei simplices, 2- pollicares; Foliis vestiti confertis, patulis, superioribus contractis; terminalibus confertioribus, majoribus, radianibus. Stella in centro sessilis, scyphiformis, simplex, uti in Pol. communi; at multo minor, non prelifera.

811. *POLYTRICHUM, nanum*, capsula cylindrica erecta; furculis, brevissimis, foliis ferrulatis. *Weis. P. c. 173.*

α. Mnium, polytrichoides, calyptra villosa, var. β *Linn. Spec. 1577. Hall. 1837. Polytr. mnioides. Neck. M. M. 123. Dillen. H. M. 429. T. 55. f. 7.*

β. Mn. polytr. var. α. *Linn. Spec. 1576. Hall. 1838. Polytr. nanum folio non serrato. Weis. P. c. β. 175. Neck. M. M. 119. Dillen. H. M. 428. T. 55. f. 6.*

H. α, ad terram in ericetis udis Theriotrophei, am Graben nach dem alten Haus; β, in der Hoerre; im Hirschberg frequens. Floret Februar. & sequ.

Ob Surculos demum ex latera proliferos; Folia serrata; Antheras demum albidas, membrana testas; Ciliis 32; & Apophysin nullam, suspicor hoc Pol. meram Varietatem juniorem esse præcedentis. In huius Individuis femineis quorum Folia in stellam expansa sunt, nullum verum disco scobiferum reperire potui; In aliis vero surculis obverse-conicis, vix tres vel quatuor lineas longis, Foliis adpressis: Stellam scyphiformem. repetito-proliferam, observo.

MNIUM, G. P. 1193.

Anthera operculata. Calyptra lævis
Fem. capitulum nudum, pulverulentum,
remotum. S. N. 700.

812. MNIUM, pellucidum, caule simplici, foliis ovatis. Linn. 1574. Hall. 1853. Weis. P. c. 161. Neck. M. M. 233.

H. in pascuis uliginosis im Stübersgrund; am steinern Berg frequens. Floret Martio.

Anthera & Capitula in distincto individuo simplici. Calyptra albidæ, longæ, conicæ, apice fulvæ, basi 5 - 6-fidæ. Capitula terminalia, scyphiformia, composita: Foliolis 3 f. 5 erectiusculis, disco convexo: scobe foliis per lentem simillima.

813. MNIUM, fontanum, caule simplici geniculis inflexo. Linn. Spec. 1574. Weis. P. c. 145. Hall. 1851. Bryum. Neck. M. M. 209.

H. in pratis udis scaturiginosis, im Fischruveyher. & Guldnersgrund; in uliginosis unter dem Sinnerhof copiose. Floret Majo.

Folia serrulata, patula; in junioribus individuis subsecunda. In hoc & Mn. palustri individua stellata & antherifera basi ita arte coherens, ut ambo ex eodem caule enasci, primo intuitu, videantur; Si cultello caute vero separentur, semper distinctis surculis, femineis simplicioribus, reperiuntur.

814. MNIUM, palustre, caule dichotomo, foliis subulatis. Linn. Spec. 1574. Hall. 1855. Weis. P. c. 165. Bryum. Neck. M. M. 210.

H. in pratis uliginosis cum præcedente. Floret æstate.

815. MNIUM, androgynum, caule ramoso, androgynum. Linn. Spec. 1574. Hall. 1854. Weis. P. c. 163, Mn. angustifolium. Neck. M. M. 234.

β. Mniium prolixum. Neck. M. M. 235. Hall. 1856. Dillen. H. M. 235. T. 31. f. 4.

H. locis

H. locis umbrosis uliginosis passim; β . im Stübersgrund. Floret Aprili, Majo.

Antheræ & Capitula in eodem individuo ramoso. Capitula terminalia, pedunculata, subglobosa, nuda: composita foliolis exiguis confertissimis, receptaculo ovato affixis, deciduis, caulinis foliis per lentem simillimis. Antheras seriatim profert.

Var. β . Caule 2-3-pollicari, ramosissimo, ramis caule brevioribus, attenuatis, omnibus apice capituliferis, differt. Capitula caducissima.

816. *MNIUM, hygrometricum*, acaule, anthera nutante, calyptra reflexa tetragona. *Linn. Spec. 1575. Hall. 1812. Weis. P. c. 147. Bryum. Neck. M. M. 221.*

H. ad muros; in umbrosis ad sepes passim. Floret Febuario. Martio.

817. *MNIUM, purpureum*, caule dichotomo: axillis pedunculiferis, anthera erecta, foliis carinatis. *Linn. Spec. 1575. Bryum. Hall. 1816. Weis. P. c. 128. Neck. M. M. 211.*

β . Var. major: Surculis 2-pollicaribus dichotomo-ramosis, operculo conico. *Hall. 1818. Dillen. 387. T. 49. f. 52.*

H. ad muros cœmeterij & urbis; ad terram auf dem Hinterland;

β . in sylvarum umbrosis im Beilstein; am Homberg alibique copiosissime. Floret Febuario, Martio.

818. *MNIUM, setaceum*, antheris crectis, operculis filiformibus longitudine antherarum. *Linn. Spec. 1575. Hypnum. Hall. 1788. Weis. P. c. 206. Bryum. Neck. M. M. 212.*

H. ad muros cum præcedente, vulgatissimum. Floret Febuario, Martio.

819. *MNIUM, cirratum*, foliis arefactione revolutis. *Linn. Spec. 1576. Hypnum. Hall. 1786. Weis. P. c. 207. Bryum. Neck. M. M. 213.*

H. ad muros; in tectis vetustis ligneis vor dem Homberg rarius. Floret Martio, Aprili.

820. *MNIUM, annotinum*, foliis ovaris acuminatis pellucidis, pedunculis subradicalibus, antheris nutantibus. *Linn. S. N. 700. Spec. 1576. Weis. P. c. 151. Bryum. Neck. M. M. 221.*

H. in locis udis sylvarum; am Homberg; im Beilstein: in ambularis hortorum in denen Sieghausgärten frequens. Floret Junio;

Individua juniora sterilia bulbifera: Bulbulis purpureis subrostratis, pellucidis, foliariis, sessilibus in foliorum alis.

821. *MNIUM, bornum*, antheris pendulis, pedunculo curvato, surculo simplici, foliolis margine scabris *Linn. Spec. 1576. Hall. 1846. Weisf. P. c. 149. a. Bryum. Neck. M. M. 215.*

H. in nemorosis, ad terram udam *im Hirschberg* frequens. Floret Aprili, Majo.

822. *MNIUM, capillare*, antheris pendulis, foliis ovatis setiferis carinatis, pedunculis longissimis. *Linn. S. N. 700. Bryum capillare. Spec. 1586. Hypnum. Hall. 1791. Weisf. P. c. 205. Bryum. Neck. M. M. 214.*

H. ad muros cum Mn. caespitio, *am Kirchhof; im Zwünger*; in uliginosis *am Beilstein* Pedunculis longioribus. Floret Aprili, Majo.

823. *MNIUM, caespitium*, antheris pendulis, foliis lanceolatis acuminato - setaceis, pedunculis longissimis. *Linn. Spec. sub nom. Br. caespit. 1586. Br. Neck. M. M. 228. Hypnum. Hall. 1790. Weisf. P. c. 203.*

H. ad intus pontis novi cœmeterii & urbis, alibique passim. Floret Martio, Aprili.

Ob individua stellifera Muiis associandum. Surculi feminei distincti, simplicissimi, 4 - 5. lineas longi, erecti, graciliores. Foliis vestiti raris, minoribus, ceterum simillimis. Stella terminalis bulbiformis, rarius expansa; Foliis latioribus, Capitulum pulverulentum, convexum, fuscum, semicirculantibus.

824. *MNIUM, crudum*, antheris pendulis, calyptra recurvata, foliis pellucidis *Linn. Spec. 1576. Hall. 1843? Bryum. Neck. M. M. 223.*

H. ad terram umbrosam, in sylva *aus der Amdorf hinter dem Weitzberg, linker Hand nach dem Thiergarten zu.* Floret Aprili.

Individua antherifera sesquipollicaria, simplicissima: Foliis superioribus triplo longioribus, confertis, erecto - patulis. Anthera ovato - cylindracea, erecta: dein nudans, demum iterum erecta. Calyptra erecta, mutansq. Anthera recurva. Operculum hemisphaericum, ore crassius, umbilico protuberante brevi. Individua stellifera vix semipollicaria; Foliis superioribus latioribus, majoribus, in stellam expansis; disco pulverulento subsusco.

825. *MNIUM, serpillifolium*, pedunculis aggregatis, foliis patentibus pellucidis. *Linn. Spec. 1577.*

*, pun.

α, punctatum Dillen. H. M. 416. T. 53. f. 81. & forte 80. Hall. 1845. Weis. P. c. 153. Bryum. Neck. M. M. 216. & β. 217.

β, cuspidatum. Dillen. H. M. 413. T. 53. f. 79. Hall. 1841. Weis. P. c. 153. Bryum. polymorph. Neck. M. M. 218.

γ, proliferum. Dillen. H. M. 411. T. 52. f. 77. Hall. 1839. Mj. roseum Weis. P. c. 157. Bryum roseum. Neck. M. M. 219.

δ, undulatum. Dillen. H. M. 410. T. 52. f. 76. Hall. 1844. Weis. P. c. 158. Bryum dendroides. Neck. M. M. 218.

H. α. in sylvis ad Erbach; locis opacis ad radices rupium am Geißlichenberg; β. similibus in locis Theriotrophei; γ. locis udis umbrosis hinter dem Schloß in der Höhle; δ. in pomariis ad sepes unter der neuen Brücke; bey dem Hayn-winkelgen copiose. Floret Martio, Aprili.

826. MNIMUM, triquetrum, foliis trifariis patulis subulato-lanceolatis carinatis. Linn. Spec. 1578. Hall. 1849. Bryum. Neck. M. M. 208.

β. Mmium Hall. 1847. Dillen. H. M. 405. T. 51. f. 73. & Hall. 1850. Dill. 412. T. 52. f. 78.

H. in paludosis am Mühlberg; am Geißlichenberg; β. am Beilstein ad viam publicam alibique. Floret Majo.

827. MNIMUM, trichomanis, foliis distichis integerrimis. Linn. Spec. 1578. Neck. M. M. 236. no. 4. Jungermannia. Hall. 1858.

H. iisdem in locis cum sequente; im Hirschberg copiosissime. Floret Aprili.

Ip hoc Perichætia frondulis abscondita vidi: ergo Jungermannia associandum.

828. MNIMUM, fissum, foliis distichis bifidis. Linn. Spec. 1579. Hall. 1864. Neck. M. M. 236. no. 5.

H. ad radices & parietes rupium, in nemorosis ad Erbach. Floret Majo.

Mmium fissum foliis bidentatis apice globuliferis Neck. M. M.

237. no. 6. mera est varietas: Foliis viridioribus, magis approximatis, umbrosioribus locis proveniens. In utroque Folia duobus apicibus globulifera, haud raro observavi.

*** Calyptrati monoclini.

BRYUM. G. P. 1194.

Anthera operculata. Calyptra lævis. Filamentum e tuberculo terminali ortum. S. N

a. *Antheris sessilibus.*

829. BRYUM, *apocarpum*, antheris sessilibus terminalibus, calyptra minima. *Linn. Spec.* 1779. *Weisf. P. c.* 179. *Neck. M. M.* 199. *Hypnum. Hall.* 1793.

β. *Sphagnum nodosum hirsutum incanum.* *Dillen. H. M.* 246. *T.* 32. *f.* 5. *Bryum. Weisf. P. c.* 180. *Hypnum. Hall.* 1792.

H. ad saxa & terram truncosque arborum, *am Homberg* alibique frequens. Floret Februario, Martio.

830. BRYUM, *striatum*, antheris sessilibus sparsis, calyptris striatis sursumve pilosis. *Linn. S. N.* 701. *Spec.* 1579.

α. majus. *Dillen. H. M.* 430. *T.* 55. *f.* 8. *Polytrich. bryoides*

α. *Weisf. P. c.* 175. *Polytrich. striat. Neck. M. M.* α. 121. *Bryum. Hall.* 1799. β.

β. minus. *Dillen. H. M.* 431. *T.* 55. *f.* 9. *Weisf. P. c.* 176. *Neck. M. M.* 122. β. *Hall.* 1799. α.

γ. medium. *Dillen. H. M.* 432. *Tab.* 55. *f.* 10. *Hall.* 1799. γ.

δ. capillaceum. *Dillen. H. M.* 433. *T.* 55. *f.* 11. *Weisf. P. c.* 177. *Neck. M. M.* 122. γ. *Hall.* 1798.

H. α. ad truncos arborum passim; β, ad muros & saxa *am Homberg*; γ. in rupibus *am Galgen- und Geistlichenberg*; δ, in sylvis ad truncos Fagorum Quercuumque. Floret Februario, Martio.

b. *Antheris pedunculatis erectis.*

831. BRYUM, *pomiforme*, antheris erectis sphaericis. *Linn. Spec.* 1580. *Hall.* 1803. *Weisf. P. c.* 181. *Neck. M. M.* 208.

H. in rimis rupium earumque cavernulis *am Homberg*; *Galgenberg*; Var. β, *Hall.* l. c. *im Thiergarten.* Floret Martio, Aprili.

832. BRYUM, *pyriforme*, antheris erectis obovatis, calyptra subulata, furculis acaulibus, foliis ovatis muticis. *Linn. Spec.* 1580. *Hall.* 1832. *Weisf. P. c.* 183. *Neck. M. M.* 197.

H. in areis hortorum *in denen Sieghansgärten*; *in aggeribus*, & ad parietes rivulorum *im Fischruveyher- und Stübersgrund.* Floret Martio, Aprili. 833.

833. *BRYUM, extinctorium*, anthera erecta oblonga minori, calyptris laxis æqualibus. *Linn. Spec.* 1581.

α. minus, *Dillen. H. M.* 349. *T.* 45. *f.* 8. *Hall.* 1829. *Weif. P. c.* 185. *Neck. M. M.* 207. α.

β. majus. *Dillen. H. M.* 350. *T.* 45. *f.* 9. *Hall.* 1828. *Weif. P. c.* 187. β. *Neck. M. M.* β. 207.

- H. α. ad muros urbis & cæmeterii; in rimis rupium *am Homberg* alibique frequens; β. ad radices rupium *am Geißlichenberg*; var. maxima in muris pomærii frequens. Floret Martio, Aprili.

Suspicio *Mnii horni* Var. *integrifoliam*, *Clar. Weif. P. c.* 150. hujus Varietatem esse maximam; Surculis 2-3 pollicaribus, ramosis, semper sterilibus.

834. *BRYUM, subulatum*, antheris erectis subulatis, furculis acaulibus. *Linn. Spec.* 1581. *Hall.* 1827. *Weif. P. c.* 187. *Neck. M. M.* 194.

H. in cavis semitis *hinter dem Schloß*; in fissuris rupium *am Geißlichenberg*, alibique frequens. Floret Martio, Aprili.

835. *BRYUM, rurale*, antheris erectiusculis, foliis piliferis recurvis. *Linn. Spec.* 1581. *Neck. M. M.* 225. *Hypnum. Hall.* 1789. *Weif. P. c.* 210.

H. in sylvis ad truncos arborum passim. Floret Februar. Martio.

836. *BRYUM, murale*, antheris erectis, foliis piliferis erectiusculis, furculis simplicibus cæspitosis. *Linn. Spec.* 1581. *Hall.* 1825. *Weif. P. c.* 189. *Neck. M. M.* 196.

β. minus, foliis non piliferis. *Hall.* 1826. *Weif. P. c.* β. 191. *Neck. M. M.* 197. *Dillen. H. M.* 356. *T.* 45. *f.* 15.

H. α. ad parietes hortorum; in muris, & rupium fissuris *hinter dem Schloß*, alibique; β. ad terram glareosam *vor dem Homberg*. Floret Martio, Aprili.

837. *BRYUM, scoparium*, antheris erectiusculis, pedunculis aggregatis, foliis secundis recurvatis, caule declinato. *Linn. Spec.* 1582. *Neck. M. M.* 223. *Hypnum. Hall.* 1777. *Weif. P. c.* 213.

H. in sylvis, ad truncos arborum putridos passim. Floret Februario, Martio. •

838. *BRYUM, undulatum*, antheris erectiusculis, pedunculis subsolitariis, foliis lanceolatis carinatis undulatis patentibus ferratis, *Linn. Spec. 1582. Hall. 1823. Weisf. P. c. 196. Br. phyllitidifolium Neck. M. M. 203.*

H. in aggeribus humidis umbrosis *hinter dem Schloß in den Höhle; am Homberg; in sylvis passim.* Floret Februar-Martio.

839. *BRYUM, pellucidum*, antheris erectiusculis, foliis recurvis acutis, caule hirsuto, *Linn. Spec. 1583. Hall. 1824. Neck. M. M. 204.*

H. in paludosis sylvaticis ad pagum *Erbach.* Floret Octobri.

840. *BRYUM, heteromallum*, antheris erectis, foliis setaceis secundis, *Linn. Spec. 1583. Hall. 1807. Neck. M. M. 229. Hypnum. Weisf. P. c. 215.*

H. ad terram in ericetis ad *Hoerbach & Hirschberg.* Floret autumnino in ver usque.

841. *BRYUM, tortuosum*, antheris erectis, foliis setaceis imberbibus: arefactione retortis. *Linn. S. N. 702. Spec. 1583. Neck. M. M. 227. Hypnum. Hall. 1787.*

H. in rimis & cavernulis rupium, *im Thiergarten bey dem alten Haus copiose.* Floret autumnino in ver usque.

842. *BRYUM, truncatulum*, antheris erectis subrotundis: operculo mucronato. *Linn. Spec. 1584. Hall. 1833. Weisf. P. c. 191. Neck. M. M. 195.*

H. ad terram argillosam, locis humidis umbrosis, *am Homberg frequens.* Floret Aprili.

843. *BRYUM, viridulum*, antheris erectis ovaris, foliis lanceolatis acuminatis imbricato-parulis. *Linn. Spec. 1584. Hall. 1809. Weisf. P. c. 193. Neck. M. M. 206.*

H. locis umbrosis argillosis ad terram, *am Homberg cum Phasco subulato copiose.* Floret primo vere.

844. *BRYUM, hypnoides*, antheris erectis, furculo erectiusculo, ramis lateralibus brevibus fertilibus, *Linn. Spec. 1584.*

α. majus

- α.* majus, Dillen, H. M. 372. T. 47. f. 32. Morison, Hist. Oxon. III. Sect. XV. Tab. 5. ser. 3. f. 7. fig. optima. Neck. M. M. 226. Hymn. Hall. 1780. Hypn. canesc. *α.* Weis. P. c. 211.
β. minus, Dillen, H. M. 368. T. 47. f. 27. Linn. Flor. succ. II. 1003.
 var. *β.* Weis. P. c. 213. *β.*

γ. medium, Dillen, H. M. 371. T. 47. f. 31.

H. in sylvis *α.*, inter saxa ad terram *am* Homberg; *β.*, ad rupes in monte Galgenberg; *γ.* in rupibus & ad terram *am* Geisflichenberg; Homberg, alibique copiose. Floret circa ver;

845. BRYUM, *verticillatum*, antheris erectis, pedunculis arefactione confertis; foliis piliferis, furculis fastigiatis. Linn. S. N. 702. Spec. 1585. Hall. 1811? (potius Br. *æstivum*.)

H. in rupibus *im* Beilstein. Floret Aprili, ♀

c. Antheris nutantibus.

846. BRYUM, *argenteum*, antheris pendulis, furculis cylindricis imbricatis lævibus. Linn. Spec. 1586. Hall. 1821. Weis. P. c. 199. Neck. M. M. 201.

β. viride, Dillen, H. M. 394. T. 50. f. 63.

H. *α.* in tectis rupibus & muris; ad terram sabulosam *auf* dem Hinter sand; in ambulacris hortorum copiose; *β.*, similibus in locis parcius. Floret hyeme.

847. BRYUM, *pulvinatum*, antheris subrotundis, pedunculis reflexis, foliis piliferis. Linn. Spec. 1586. Hall. 1822. Weis. P. c. 201. Neck. M. M. 200.

H. in rupibus, ad muros antiquos passim. Floret primo vere.

848. BRYUM, *carneum*, antheris pendulis subglobosis, foliis acutis alternis. Linn. Spec. 1587. Hall. 1834. Neck. M. M. 202.

H. in pascuis uliginosis *in* der Callenbach; ad terram humidam, & in ambulacris hortorum umbrosis *am* Homberg; *am* Sieghause, alibique parcius. Floret Aprili.

849. BRYUM, *simplex*, antheris nutantibus oblongis, foliis subulatis, furculo simplicissimo: medio

dio pedunculifero. *Linn. Spec.* 1587. *Hall.* 1808. & 1813. *Neck. M. M.* 202.

H. ad parietes rivulorum in pratis depressis *hinter dem Homberg*. Floret hyeme.

HYPNUM. G. P. 1195.

Antbera operculata. Calyptra lævis. Filamentum laterale, ortum e perichætiō. S.N. 702.

a. *Frondebz pinnatis.*

350. HYPNUM, *taxifolium*, fronde simplicissima pinnata lanceolata basi pedunculifera. *Linn. Spec.* 1587. *Hall.* 1775. *Weis. P. c.* 216. *Neck. M. M.* 151.

H. in sylvis, locis umbrosis ad terram, circa *Erbach* florens copiose; in cavernulis rupium *am Galgenberg*, alibique sterile. Floret Octobri.

351. HYPNUM, *denticulatum*, fronde pinnata simplici: pinnis duplicatis, basi pedunculifera. *Linn. Spec.* 1588. *Hall.* 1772. *Neck. M. M.* 154.

H. in sylvis ad terram umbrosam humidam *hinter dem Homberg*, *im Tiergarten*, ad *Erbach* copiose. Floret Aprili.

352. HYPNUM, *bryoides*, fronde simplicissima pinnata lanceolata apice pedunculifera. *Linn. Spec.* 1588. *Hall.* 1776. *Weis. P. c.* 217. *Neck. M. M.* 152.

H. ad terram udam, locis sylvarum umbrosis, *am Homberg*, *Galgen- & Gaislichenberg* frequens. Floret Februar. Martio.

353. HYPNUM, *adiantoides*, fronde pinnata ramosa erecta medio pedunculifera. *Linn. Spec.* 1588. *Hall.* 1774. *Neck. M. M.* 153.

H. in pratis paludosis *hinter dem Homberg*, alibique frequens. Floret Februar. Martio.

In hoc, *taxifolio*, & *bryoideo Hypno*, Frondis Folia latere superiore in duas laminas conduplicatas longitudinaliter, non vero ad apicem usque fissa. In hoc & *taxifolio*, Folia apice serrata, in *bryoideo* acuminata integerrima.

354. HYPNUM, *complanatum*, fronde pinnata ramosa: foliolis imbricatis acutis complicatis compressis. *Linn. Spec.* 1588. *Hall.* 1771. & var. 1778. *Weis. P. c.* 218. *Neck. M. M.* 155.

H. in

H. in sylvis, ad arborum truncos *in Thiargarten; am Homberg*, alibique copiosissime. Floret Aprili.

b. *Surculis vagis*.

855. HYPNUM, *rugosum*, furculis vagis erectiusculis: foliis secundis recurvatis basi rugosis. *Linn. S. N. 703. Mantissa 131. Hall. 1735. Hypn. lycopodioides. Neck. M. M. 168. a.*

H. locis sylvaticis muscosis apricis *am Homberg. Geißlichenberg; in Thiargarten* frequens Floret rarius Aprili.

856. HYPNUM, *undulatum*, furculis ramosis, frondibus subpinnatis: foliolis undulatis complicatis. *Linn. Spec. 1589. Hall. 1770. Weisf. P. c. 220. Neck. M. M. 156.*

H. locis saxosis in sylvis, circa *Hoerbach, am Steinern Berg*. Floret vix unquam.

857. HYPNUM, *crispum*, furculis ramosis, frondibus subpinnatis: foliolis undulatis planis. *Linn. Spec. 1589. Hall. 1769. Weisf. P. c. 221. Neck. M. M. 153.*

H. in rupe *am Galgenberg gegen Burgk* parcius sterilis; in nemorosis ad *Erbach* florens copiose. Floret Octobri.

858. HYPNUM, *triquetrum*, ramis vagis recurvis, foliolis ovatis recurvatis parulis. *Linn. Spec. 1589. Hall. 1729. Weisf. P. c. 222. Neck. M. M. 185.*

H. in sylvis & pratis sterilibus vulgatissimum. Floret Aprili.

859. HYPNUM, *rutabulum*, ramis vagis subrepentibus, foliolis ovatis mucronatis imbricatis. *Linn. Spec. 1590. Hall. 1730. Weisf. P. c. 224. Neck. M. M. 178.*

β. Operculis cuspidatis, *Dillen. H. M. 297. T. 38. f. 30. majus & minus.*

H. α. in pomeriis ad arborum truncos ubique copiose, β. *majus*, in sylvaticis *am Homberg; minus, an der Stadt-mauer bey dem Haynwinkelgen.*, Floret Februario, Martio.

860. HYPNUM, *ruscifolium*, furculo repente, ramis imbricatis, setiferis, foliis carinatis, capitulo subrotundo, incurvo, acuminato. *Neck. M. M. 181. Hall. 1731? Weisf. P. c. 225. Dillen. H. M. 298. T. 38. f. 31.*

H. locis

H. locis saxosis aquosis *unter der neuen Brücke; am Wassergraben, auf der Herrenwiese gegen Burgk über; alibique.* Floret Martio.

Var. *precedentis?*

c. *Surculus pennatis.*

861. HYPNUM, *filicinum*, furculis pennatis: ramulis distantibus, foliolis imbricatis incurvis acutis secundis *Linn. Spec. 1590. Hall. 1766. Neck. M. M. 164. Weis. P. c. 228. α. spicatum.*

β. *ramoso-pinnatum. Weis. P. c. 229. Hall. 1767. Dillen. H. M. 286. T. 36. f. 22.*

H. in paludosis passim; *im Callenbachs- & Stübergrund secus rivulos; β. in pratis udis auf der Weißgärberwiese.* Floret Majo, Junio.

862. HYPNUM, *proliferum*, furculis proliferis plano-pinnatis, pedunculis aggregatis. *Linn. Spec. 1590. Hall. 1764? Weis. P. c. 230. H. tamariscifolium. Neck. M. M. 158.*

H. in sylvis ad *Erbach; in pratis humidis auf der Herrenwiese alibique.* Floret Martio.

863. HYPNUM, *parietinum*, furculis plano-pinnatis continuatis, pedunculis aggregatis. *Linn. Spec. 1590. Hall. 1765. Weis. P. c. 232. Neck. M. M. 157.*

H. in sylvis ad terram, ubique copiosissime. Floret Aprili.

864. HYPNUM, *compressum*, furculo erecto, ramoso, ramis basi setiferis, planis recurviusculis, stipite triplo brevioribus. *Neck. M. M. 159. Hall. 1742. Dillen. H. M. 312. T. 40. f. 47.*

H. in sylvarum locis humidis opacis, *am Homberg* frequens. Floret Aprili.

Nec *distinctissima species; (Neck. l. c.) nec H. cuspidati varietas; (Weis. P. c. 253.) sed potius Varietas est Hypni puri.*

865. HYPNUM, *prælongum*, furculis subpinnatis decumbentibus: ramulis remotis, foliolis ovatis, antheris cernuis. *Linn. Spec. 1591. Hall. 1758. Weis. P. c. 235. Neck. M. M. 174.*

H. ad

H. ad terram & truncos arborum *hinter dem Schloß in der Höhle*; in pomariis udis *vor dem Hemberg* copiose florens. Floret Martio, Aprili.

866. HYPNUM, *crista castrensis*, furculis pinnatis & ramulis approximatis: apicibus recurvis. *Linn. Spec. 1591. Hall. 1768. Weis. P. c. 233. Neck. M. M. 165.*

H. ad terram sterile in sylvis passim; in nemorosis ad *Erbach* fructificans, rupes operiens copiosissime. Floret autumnio in ver usque.

867. HYPNUM, *abietinum*, furculis pinnatis teretiusculis remotis inæqualibus. *Linn. Spec. 1591. Hall. 1762. Weis. P. c. 236. Neck. M. M. 163.*

H. in sylvis am *Geißlichenberg*; im *Thiergarten* frequens; semper fructificatione destitutum. Floret -

868. HYPNUM, *plumosum*, furculis pinnatis repentibus, ramis confertis, foliis imbricatis subulatis, antheris erectis. *Linn. Spec. 1592. Weis. P. c. 237. Neck. M. M. 173. var. β . sericea.*

H. in sylvis ad arborum truncos; in saxis am *Geißlichenberg*. Floret Aprili.

d. *Foliis reflexis.*

869. HYPNUM, *cupressiforme*, furculis subpinnatis, foliis secundis recurvis apice subulatis. *Linn. Spec. 1592. Hall. 1737. Weis. P. c. 238. Neck. M. M. 166.*

H. in sylvis, ad arborum truncos passim. Floret Octobri in ver usque.

870. HYPNUM, *aduncum*, furculis erectiusculo-subramosis, foliis secundis recurvis subulatis, ramis recurvatis. *Linn. S. N. 704. Spec. 1592. Hall. 1736. Weis. P. c. 240. Neck. M. M. 167.*

H. in paludosis *unter dem Sinner Hof, am Mühlberg*. Floret Junio, Julio.

871. HYPNUM, *viticulosum*, furculis repentibus, ramis vagis teretibus, foliis patulis acuminatis. *Linn. Spec. 1592. Hall. 1739. Weis. P. c. 241. Neck. M. M. 169.*

H. in sylvis, ad arborum truncos am *Geißlichen Berg*; am *Hemberg*; alibique frequens. Floret Hyeme.

872. HYPNUM, *squarrosum*, ramis vagis, foliis lanceolatis complicato - carinatis quinquefariam recurvatis. *Linn. S. N. 704. Spec. 1593.*

α. majus. *Hall. 1732 ? Weis. P. c. 242. Neck. M. M. 171.*

β. minus. *Hall. 1733. Weis. P. c. 243.*

H. α. in sylvarum locis udis passim; in pomariis *am Sieghaus vor dem Homberg*; alibique fructificans; *β.* similibus in locis *im Thiergarten*. Floret Octobri in ver usque.

873. HYPNUM, *lorcum*, furculis reptantibus, ramis vagis erectis, foliis secundis, antheris subrotundis. *Linn. Spec. 1593. Weis. P. c. 244. Neck. M. M. 170.*

H. in sylvis ad terram *in der Hölre*; circa *Breitscheid*; *im Hirschberg* ad *Gundersdorf* copiose. Floret Aprili.

c. *Surculis dendroidibus, f. fasciculatis.*

874. HYPNUM, *dendroides*, furculo erecto, ramis fasciculatis terminalibus simpliciusculis, antheris erectis. *Linn. Spec. 1593. Hall. 1747. Weis. P. c. 245. Neck. M. M. 187.*

H. in pratis sylvaticis udis *im Fischruveyberggrund*; in pomariis *vor dem Homberg*. Floret Octobri in ver usque.

Caulis palmaris, erectus, vestitus squamis obtusiusculis, adpressis. Frons erecta, ramis subaequalibus, simpliciusculis, teretibus, erecto-pauculis, arbusculam exacte referens. Folia subjerrata. Pedunculi numerosi, fronde longiores. Anthera cylindracea, erecta, calyptra ad pedunculum usque semitecta. Operculo conico, erecto. Stylus ex pedunculo elongato antheram perforans, Pollenque colligens, supra anthera orificium prominens, operculo hinc egre decidente, interne affixus, fere uti in *Buxbaumia*. Similem Stylium s. columnam in *Pol. communi*, & aliis quidem, non vero supra Antheram prominentem, operculoque coherentem, vidi.

875. HYPNUM, *alopecurum*, furculo erecto, ramis fasciculatis terminalibus subdivisis, antheris subnutantibus. *Linn. Spec. 1594. Hall. 1748. Weis. P. c. 246. Neck. M. M. 186.*

H. in nemorosis ad *Erbach*, *bey denen Steinkammern*, arborum truncos rupesque operiens copiosissime. Floret autumnus.

Caulis

Caulis 4 l. 5 - pollicaris, obliquus, squamis vestitus acuminatis, patulis, albidis. Frons incurva, depressiuscula: ramis subdepressis, inaequalibus, superioribus subpinnatis. Folia serrata. Pedunculi fronde breviores, incurvi. Antheræ ovales, obliquæ: Operculo rostrato, incurvo.

f. *Surculis teretiusculis.*

876. *HYPNUM, curtispiculum*, furculis vagis teretibus, foliis ovatis acutis patulis, antheris pendulis. *Linn. Spec.* 1594. *Hall.* 1740. *Weis. P. c.* 248. *Neck. M. M.* 177.

H. in sylvis, ad arborum truncos am *Hamburg*, alibique frequens. Floret Aprili.

877. *HYPNUM, purum*, furculis pinnato - sparsis subulatis, foliis ovatis obtusis conniventibus. *Linn. Spec.* 1594. *Hall.* 1743. *Weis. P. c.* 249. *Neck. M. M.* 160.

H. in sylvis & pomariis passim. Floret Martio.

878. *HYPNUM, riparium*, furculis teretibus ramosis, foliolis acutis patulis distantibus. *Linn. Spec.* 1595. *Hall.* 1746. *Weis. P. c.* 250. *Neck. M. M.* 184.

H. in rivulis bey der Lohmühle vor dem obern Thor, alibique rarius. Floret Septembri.

879. *HYPNUM, cuspidatum*, furculis vagis: apice foliis convolutis acuminato. *Linn. S. N.* 704. *Spec.* 1595. *Hall.* 1741. *Weis. P. c.* 251. var. *α. pungens*, nec *β.* *Neck. M. M.* 163.

H. in pratibus & pomariis adis hinter dem *Hamburg*, alibique vulgarissimum. Floret Majo, Junio.

g. *Surculis confertis.*

880. *HYPNUM, sericeum*, furculo repente, ramis confertis erectis, foliis subulatis, antheris erectis. *Linn. Spec.* 1595. *Hall.* 1750. *Weis. P. c.* 254. *Neck. M. M.* 173. *α.*

β. *Hypn. strigosum.* *Neck. M. M.* 179. *Dillen.* 327. T. 42. f. 62.

γ. *Hypn. ramosum.* *Neck. M. M.* 180. *Hall.* 1753. *Dillen.* 327. T. 42. f. 60.

11. ad truncos arborum & muros passim. Floret Martio, Aprili.

Folia striata, nervo carinali, superiora subserrata.

881. HYPNUM, *velutinum*, furculo repente, ramis confertis erectis, foliis subulatis, antheris subnutantibus. *Linn. Spec.* 1595. *Hall.* 1754. *Neck. M. M.* 172. *Weisf. P. c.* 256.

H. ad arborum truncos ubique. Floret Febuario, Martio.
Folia serrata, nervo carinali nullo.

882. HYPNUM, *serpens*, furculis repentibus, ramis filiformibus, foliis oblitteratis *Linn. Spec.* 1596. *Hall.* 1756. & var. *min.* 1757. *Weisf. P. c.* 257. *Neck. M. M.* 175.

H. ad terram udam & arborum radices, locis umbrosis passim. Floret Majo & sequ.

883. HYPNUM, *sciuroides*, furculis erectis ramosis incurvatis. *Linn. Spec.* 1596. *Hall.* 1749. *Weisf. P. c.* 258. *Neck. M. M.* 175.

β. Hypn. *palatinum*, *Neck. M. M.* 182. *Dillen.* 320. T. 41. f. 55.

H. in sylvis, pomariis, ad arborum truncos, sibi que frequens; β in tecto ligneo domunculæ *am Homberg*. Floret Octobri in ver usque.

884. HYPNUM, *myosuroides*, furculis ramosissimis: ramis subulatis utrinque attenuatis teretibus. *Linn. Spec.* 1596. *Hall.* 1752. *Weisf. P. c.* 259. *Neck. M. M.* 183. α.

β. *Dillen. H. M.* 316. f. 50. *Hall.* 1745. *Neck. M. M.* 183. β.

H. in sylvis: α, *am Homberg*, & *Geistlichen Berg*; β. ad terram *im Beilstein*. Floret Aprili, Majo.

Var. β, Antheris erectis vix differt.

FONTINALIS. G. P. 1190.

Anthera operculata, *Calyptra* sessilis, perichætio inclusa. S. N. 699.

885. FONTINALIS, *antipyretica*, foliis complicato-carinatis trifariis acutis, antheris lateralibus. *Linn. Spec.* 1571. *Weisf. P. c.* 261.

Hypn.

Hypn. Hall. 1794. Hypn. *antipyreticum*. Neck. M. M. 191.
H. in stagnis pratorum eorumque rivulis *auf der Ahr, im Wassergraben auf der Herrenwiese*; in paludosis sylvaticis *im Hirschberg*. Floret Autumno in ver usque.

886. FONTINALIS, *minor*, foliis ovatis concavis trifariis acutis passim geminis, antheris terminalibus. Linn. S. N. 699. Spec. 1571.

Hypn. Hall. 1795. Neck. M. M. 192. var. *praced.* β.

H. similibus in locis *auf der Herren Wiese*, intra aquam fluentem *am Wehr*. Hujus fructificationes nondum vidi.

BUXBAUMIA. G. P. 1188.

Anthera operculata, hinc membranacea. *Calyptra* caduca; intra operculum sacculus pollinis. S. N. 699.

887. BUXBAUMIA, *aphylla*. Linn. Spec. 1570. Hall. 1728.

H. unico in loco in ericetis muscosis circa pagum *Hirschberg* rarius. Primum lecta a Filio *Henn. Paul.* Floret Febuario, Martio.

C. A L G A E.

* *Terrestres.*

MARCHANTIA. G. P. 1198.

MASC. *Calyx* peltatus, subtus tectus Corollis 1-petalis. *Antheræ* multifidæ.

FEM. *Calyx* sessilis, campanulatus, polyspermus. S. N. 707.

888. MARCHANTIA, *polymorpha*, calyce communi decemfido. Linn. Spec. 1603.

α. major, Mich. N. G. T. 1. f. 1. Dillen. H. M. 523. T. 76. f. 6. Hall. 1891. Weis. P. c. 132. Neck. M. M. 114.

β. minor, Mich. N. G. T. 1. f. 2. Dillen. H. M. 527. T. 77. f. 7. Hall. 1892. α.

γ. octopartita, Mich. N. G. T. 1. f. 5. Weis. P. c. 133. β.

H. α. in pratis udis ad rivos *im Pulversgrund*; β. ibidem cum α; γ. locis uliginosis *unter dem Sinnerhof* alibique. Floret Majo.

Pharm. HEPATICÆ FONTANÆ f. LICHENIS STELLATI Herba.

889. MARCHANTIA, *hemisphærica*, calyce communi quinquefido hemisphærico, perichætio nullo. *Linn. Spec.* 1604. *Hall.* 1890. *Neck. M. M.* 118.

H. ad terram locis umbrosis humidis, in cavernulis rupium *am Galgenberg*, alibique rarius. Floret Majo.

890. MARCHANTIA, *conica*, calyce communi quinqueloculari subovato. *Linn. Spec.* 1604. *Hall.* 1889. *Neck. M. M.* 115.

H. in nemorosis ad radices rupium circa *Erbach* copiosissime; *im Beilstein* rarius. *Filius*. Floret Majo.

JUNGERMANNIA. G. P. 1196.

MASC. pedunculatus, nudus. *Anthera* 4-valvis

FEM. sessilis, nudus, seminibus subrotundis. S. N. 705.

o. Frondibus pinnatis secundis.

891. JUNGERMANNIA, *asplenoides*, frondibus simpliciter pinnatis: foliolis pinnatis ovatis subciliatis. *Linn. S. N.* 705 *Spec.* 1597. *Hall.* 1868. *Weisf. P. c.* 110. *Neck. M. M.* 133.

β. Foliolis alternis minoribus. *Hall.* l. c. β. *Mieb. T.* 5. f. 1. 2.

H. in nemorosis udis ad *Erbach*; *im Hirschberg*; *am Homberg* alibique frequens. Floret Majo.

892. JUNGERMANNIA, *viticulosa*, frondibus simpliciter pinnatis: foliolis planis nudis linearibus. *Linn. S. N.* 705. *Spec.* 1597. *Hall.* 1869. *Weisf. P. c.* 112. *Neck. M. M.* 134

H. in nemorosis udis *im Hirschberg* parcius. Floret Majo.

893. JUNGERMANNIA, *polyanthos*, frondibus simpliciter pinnatis: foliolis integerrimis imbricatis convexis. *Linn. Spec.* 1597. *Hall.* 1870. *Weisf. P. c.* 113. *Neck. M. M.* 132.

H. locis umbrosis udis, in sylvis circa *Hörbach am Steinern Berg*; *im Hirschberg* ad *Gundersdorf*. Floret Aprili.

894. JUNGERMANNIA, *lanceolata*, frondibus simpliciter pinnatis lanceolatis apice floriferis, foliolis integerrimis *Linn. Spec.* 1597. *Hall.* 1871. *Weisf. P. c.* 114. *Neck. M. M.* 131.

H. ad terram udam in sylvarum locis umbrosis, *im Hirschberg bey Gundersdorf* parcius. Floret Aprili.

895. JUNGERMANNIA, *bidentata*, frondibus simpliciter pinnatis apice floriferis, foliolis bidentatis. *Linn. Spec.* 1598. *Hall.* 1877? *Weisf. P. c. α.* major. 115. *Neck. M. M.* 130. *Dillen. H. M.* 487. T. 70. f. 11.

β. *bidentata* minor. *Hall.* 1865? *Weisf. P. c.* 116. *Dill. H. M.* 488. T. 70. f. 12.

H. in terra umbrosa humida, in sylvis ad *Erbach* alibique. frequens. Floret Octobri.

896. JUNGERMANNIA, *bicuspidata*, frondibus simpliciter pinnatis medio floriferis, foliolis bidentatis. *Linn. Spec.* 1598. *Hall.* 1878. *Weisf. P. c.* 117. *Neck. M. M.* 129. *Dillen. H. M.* 488. T. 70. f. 13.

H. in sylvis *im Hirschberg* ad *Gundersdorf & Erbach*, Floret Aprili.

Hujus Folia unico dente globulifera, semel vidi. Figura Dilleniana cum nostra melius quam Michelianna convenit.

897. JUNGERMANNIA, *quinquedentata*, frondibus pinnatis ramosis apice floriferis, foliolis quinquedentatis. *Linn. Spec.* 1598. J. *trilobata*. *Weisf. P. c.* 118. *Neck. M. M.* 132.

H. sylvarum locis umbrosis udis *am Homberg; im Thiergarten; in scopulis & rupium rimis am Galgenberg & Geisblichenberg*. Floret Aprili.

b. Frondibus pinnatis: pinnulis auriculatis superne tectis.

898. JUNGERMANNIA, *nemorosa*, frondibus supra bipinnatis apice floriferis, foliolis ciliatis. *Linn. Spec.* 1598. *Hall.* 1859. *Weisf. P. c.* 121. *Neck. M. M.* 136.

H. in nemorosis circa *Erbach; im Breitscheider Wald*; Floret Aprili.

899. JUNGERMANNIA, *resupinata*, frondibus supra bipinnatis inferne floriferis; foliolis crenulatis imbricatis rotundis. *Linn. Spec.* 1599. *Neck. M. M.* 136.

H. in scopulis & rupium fissuris *am Galenberg*. Floret vix unquam.

900. JUNGERMANNIA, *albicans*, frondibus supra bipinnatis apice floriferis: foliolis linearibus recurvatis. *Linn. Spec.* 1599. *Weisf. P. c.* 122. *Neck. M. M.* 135.

H. in nemorosis subudis *im Hirschberg* rarius. Floret Majo.

901. JUNGERMANNIA, *trilobata*, frondibus subtus bipinnatis, foliolis quadratis obsolete trilobis. *Linn. Spec.* 1599. *Hall.* 1866. *Neck. M. M.* 137.

H. in sylvis ad radices rupium *im Hirschberg* parcius. Floret Aprili.

902. JUNGERMANNIA, *reptans*, frondibus subtus bipinnatis apice reptantibus, foliolis quadridentatis. *Linn. Spec.* 1599. *Hall* 1879. *Weisf. P. c.* 119. *Neck. M. M.* 138.

H. ad radices truncorum putridorum in sylvarum umbrosis *im Hirschberg*; circa *Härbach* copiose. Floret Aprili.

c. *Frondibus imbricatis.*

903. JUNGERMANNIA, *complanata*, furculis repentibus: foliolis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis æqualibus. *Linn. Spec.* 1599. *Hall.* 1860. *Weisf. P. c.* 124. *Neck. M. M.* 142.

H. ad arborum truncos ubique copiosissime. Floret Martio, Aprili.

In hac Folia saepe in pollen defluentia vidi.

904. JUNGERMANNIA, *dilatata*, furculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis apice latioribus. *Linn. Spec.* 1600. *Hall.* 1874. *Weisf. P. c.* 126. *Neck. M. M.* 140.

H. in pomariis & sylvis, ad truncos arborum passim. Floret Martio.

905. JUNGERMANNIA, *tamariscifolia*, foliis imbricatis serie duplici: superioribus subrotundis convexis obtusis quadruplo majoribus. *Linn. Spec.*

Spec. 1600. *Hall.* 1873. *Weisf. P. c.* 128. *Neck. M. M.* 141.

H. in sylvarum rupibus & truncis arborum; *am Homberg* alibique frequens. Floret Martio, Aprili.

- 906 JUNGERMANNIA, *ptatypphylla*, furculis procumbentibus subtus imbricatis, foliis cordatis acutis. *Linn. Spec.* 1600. *Hall.* 1872. *Weisf. P. c.* 125. *Neck. M. M.* 142.

H. in sylvis ad truncos arborum; in rupibus *am Homberg*; *Geistlichenberg*; *im Thiergarten* copiose. Floret Aprili.

907. JUNGERMANNIA, *ciliaris*, furculis repentibus, foliolis duplicato-imbricatis: inferne auriculatis ciliatis. *Linn. Spec.* 1601?

H. in testro ligneo semiputrido domunculæ *am Homberg*; alibi nondum observata. Floret Aprili.

Jungermannia nostra vel nova, vel a Jungermannia ciliari plurimum notis diversissima. Caspites format densissimos, ambitu semipedales, pulvinatos, rubiginoso-ferrugineos, Hypno compressiformi primo intuitu simillimos. Frondes steriles vix pollicem transversum longa, adscendentes, subpinnata, apicibus ramorum incrassatis, recurvis; supra convexa; subtus planiuscula, densibus seu ciliis foliorum reflexu, villosa. Frondes florentes breviores, minus ramosa, semiconsumpta, erectiuscula, apice florifera, numerosissimis perichætiis aggregatis occultata, demum deliquescentes.

Foliola ordine duplici imbricata, supra convexa, se invicem semitegentia, recurva: superiora subquadrata, trifida; inferiora lanceolata; utraque margine in numerosissimas lacinulas ciliares divisa; ob exiguitatem nondum observare potui, an sint auriculata, nec ne. Perichætia magnitudine & figura *Jung. platyphylla*, ventricosa, laevia, non pilosa, subfusca, apice conniventi quadridentato. Pedunculi tetragoni, pollicares, argentei. Anthera subglobosa subfusca: laciniiis dehiscensibus 4 obtusis: Polline & villis subfuscis.

Ad Lichenastrum scorpioides pulchram villosum *Dillen. H. M.* 481. *T.* 69. *f.* 3. accedit; at multo minor-teneriorque est omnibus suis partibus.

d. Surculis undique imbricatis: foliolis sparsis.

908. JUNGERMANNIA, *trichophylla*, furculis teretibus, foliolis capillaceis æqualibus. *Linn. Spec.* 1601. *Hall.* 1880. *Weisf. P. c.* 130. *Neck. M. M.* 144.

H. ad terram humidam umbrosam, in sylvis frequens. Floret Aprili.

Foliola alternata usque ad basin fere tri- s. quadripartita, laciniis subulatis, incurvis, articulatis: articulis subglobosis. Perichætia terminalia, longa, subteretia, apice quadrifido, setoso. Pedunculus semipollicaris: Anthera nigra.

e. Acaules frondibus simplicibus.

909. JUNGERMANNIA, *epiphylla*, acaulis, foliolo frondi innato. *Linn. Spec. 1602. Hall. 1883. Weisf. P. c. 106. Neck. M. M. 127.*

H. ad parietes rivulorum in pratis udis sylvaticis *hinter dem Homberg, im Stübersgrund; im Thiergarten* alibique. Floret Aprili.

910. JUNGERMANNIA, *pinguis*, acaulis, fronde oblonga sinuata pingui. *Linn. Spec. 1602. Hall. 1884. Weisf. P. c. 107. Neck. M. M. 126.*

H. similibus in locis cum præcedente; in rivulis: Frondibus confertis sterilibus copiosissime; ad terram udam unibrosam in pomariis *vor dem Homberg* fructificans. Floret Aprili.

911. JUNGERMANNIA, *multifida*, acaulis, fronde bipinnatifida. *Linn. Spec. 1602. Weisf. P. c. 109. Neck. M. M. 129.*

H. in pratis udis sylvaticis; secus rivulos ad latera perpendicularia *hinter dem Homberg, im Stübers- und Gölbersgrund* frequens. Floret Aprili.

912. JUNGERMANNIA, *furcata*, acaulis, fronde lineari-ramosa: extremitatibus furcatis obtusiusculis. *Linn. Spec. 1602. Hall. 1885. Weisf. P. c. 108. Neck. M. M. 128.*

H. in sylvis ad truncos arborum passim. Floret Aprili. Frondes *marginibus ciliata, ciliis reflexis. Perichætia & Antherae pilosa. In frondibus sterilibus & floriferis ex nervo medio subsus exeresunt globuli hemispharici s. reniformes subhirti, in pollen defluentes.*

913. JUNGERMANNIA, *pusilla*, acaulis fronde subpinnatifida: lobis imbricatis, perichætio plicato. *Linn. Spec. 1602. Hall. 1887.*

H. ad terram humidam, & in cortice arborum dejecto semiputrido in nemorosis circa *Erbach bey denen Steinkammern*. Floret Aprili.

Frondes *digitato-partita, lobis linearibus simplicibus, seu furcatis, obtusis, crassiusculis, planis, ascendentibus, nullo nervo distinctis: Perichætia saepe gemina.*

ANTHO-

ANTHOCEROS. G. P. 1201.

MASC. *Cal.* sessilis, cylindricus, integer.

Anthera subulata, longissima, 2-valvis.

FEM. *Cal.* 6-partitus. *Sem.* 3. S. N. 708.

914. ANTHOCEROS, *punctatus*, frondibus indivisis sinuatis punctatis. *Linn. Spec.* 1606. *Neck. M. M.* 43.

H. in agris humidis *hinter dem Schloß; in der Alzbach* frequens; lectus a Filio H. P. 1770. Floret Octobri.

915. ANTHOCEROS, *lævis*, frondibus indivisis sinuatis lævibus. *Linn. Spec.* 1606. *Hall.* 1893. *Neck. M. M.* 44.

H. locis graninosis secus rivulos *im Wiesengrund hinter dem Homberg*; lectus 1771. Floret Octobri.

Vereor ne sit (noster) Varietas præcedentis. Frondes more Jung. pinguis terra incumbentes, gramine occultata, plana, sinuato-lobata, lobis semipollicem longis; supra lævibus, nempe absque excrescentibus pulverulentis uti in præcedente, verrucis tamen frondi immerfis, sæpe ternis, subglobosis, atrocaruleis; transversis granulosis, atris. *Antheræ* longitudine digiti minoris, numerosissima. Feminæ Flores nec in hoc nec in præcedente hucusque reperire potui.

BLASIA. G. P. 1199.

MASC. ? *Cal.* cylindricus granis repletus.

FEM. ? *Cal.* nudus. Fructu subrotundo, foliis immerso, polyspermo. S. N. 707.

916. BLASIA, *pufilla*. *Linn. Spec.* 1605. *Hall.* 1857.

H. ad parietes rivulorum perpendiculares, horizontali directione, *im Wiesengrund hinter dem Homberg*. Pulcherrima Plantula a me lecta 1770. & 1772, cum Floribus Novembri.

RICCIA. G. P. 1200.

Cal. o. nisi cavitatem vesicularem intra folii substantiam. *Cor.* o. *Anthera* cylindrica, sessilis, germiini imposita. *Pist.* *Germen* turbinatum. *Stylus* filiformis, antheram perforans. *Pericarp.* sphaericum, coronatum anthera emarcida *Semina* hemisphaerica, pedicellata. S. N. 708.

917. *RICCIA, crystallina*, frondibus superficie papillofis. *Linn. Spec.* 1605. *Hall.* 1896. *Weisf. P. c.* 328. *Neck. M. M.* 41.

H. ad terram humidam umbrosam, in sylvis *am Geiſtlichenberg* rarius; in nemorosis *bey denen Steinkammern* circa *Erbach* copiose. Floret autumnno in ver usque.

918. *RICCIA, minima*, frondibus glabris bipartitis acutis. *Linn. Spec.* 1605. *Neck. M. M.* 43.

H. in agris *hinter dem Schloß*; alibique frequens.

Frondulae exiguae; planae, bi- s. 4- partita, nullo sulco supra exarata; demum per maturitatem superficie longitudinaliter rupta, capsula atra in lineam ordinata visui patens, uti in sequente, cuius varietas est junior?

919. *RICCIA, glauca*, frondibus glabris canaliculatis bilobis obtusis. *Linn. Spec.* 1605. *Hall.* 1897. *Neck. M. M.* 42.

H. in ambulacris hortorum sabulosis umbrosis humidis passim. Floret Autumnno.

LICHEN. G. P. 1202.

MASC. *Receptaculum* subrotundum, planiusculum, nitidum.

FEM. *Farina* foliis adspersa. S. N. 708.

920. *LICHEN, scriptus*, leprosus albicans, lineolis nigris ramosis characteriformibus. *Linn. Spec.* 1606. *Hall.* 2079. *Weisf. P. c.* 37. *Neck. M. M.* 45.

H. in cortice laevi arborum, in sylvis passim.

921. *LICHEN, geographicus*, leprosus flavescens, lineolis nigris mappam referens. *Linn. Spec.* 1607. *Hall.* 2063. & senescens 2064? *Weisf. P. c.* 38. *Neck. M. M.* 46.

H. in rupibus *am Homberg*, alibique vulgatissimus.

922. *LICHEN, byssoides*, leproso-farinaceus, pectis stipitatis subglobosis. *Linn. S. N.* 709. *Mantif.* 133.

H. ad terram glareosam, locis umbrosis ad radices montis *Galgenberg* frequens. Floret Autumnno.

Crusta cinereo-viridis, foliolis sub lente constat sinuato-laciniosis, obtusis. Capitula subrotunda stipitata uti in *L. ericetorum*, at maiora plerumque ex pluribus Tuberculis subsuicis constructa, stipite longiore, crassioreque.

923. LICHEN, *vernalis*, leprofus albidus, tuberculis subrotundis ferrugineis. *Linn. S. N. Tom. III. p. 234. Hall. 2070. Dillen. H. M. 126. T. 18. f. 4.*
H. in cortice arborum putrescente, primo vere ubique frequens.
Crusta granulosa cinerea s. alba, humore irrigata viridescens; Tubercula carnea. subglobosa, sessilia, carnea; demum convexa, subfusca.
924. LICHEN, *lacteus*, leprofus albus, tuberculis concoloribus hemisphaericis. *Linn. S. N. 709. Mantiss. 132. Hall. 2071?*
H. in rupibus am Homberg; am Stüzelberg; bey dem Säuwiesgen, alibique.
Crusta exacte lactei coloris, senescens fusca: lineis concentricis marginalibus; Tubercula conferta demum in pollen defluentia.
925. LICHEN, *rupicola*, leprofus albidus, tuberculis pallidis albo-marginatis. *Linn. S. N. 709. Mantiss. 132. Hall. 2060?*
H. in rupibus, in montosis sylvaticis am Homberg; im Thiergarten alibique.
926. LICHEN, *pertusus*, leprofus: verrucis subtesellatis lævigatis pertusis poro uno alterove cylindrico. *Linn. S. N. 709. Mantiss. 131. Hall. 2053.*
H. in rupibus arborumque corticibus passim; im Thiergarten & am Homberg frequens.
927. LICHEN, *rugosus*, leprofus albicans, lineolis simplicibus punctisque nigris confertis. *Linn. Spec. 1607. Hall. 2077. 2083. Neck. M. M. 46. Weis. P. c. 41.*
H. in sylvis, ad truncos arborum vulgatissimus.
928. LICHEN, *sanguinarius*, leprofus cinereo-virens, tuberculis atris. *Linn. Spec. 1607. Hall. 2065. 2066. 2055. 2061. Neck. M. M. 48.*
H. in rupibus truncisque arborum frequens.
929. LICHEN, *fuscoater*, leprofus fuscus, tuberculis atris. *Linn. Spec. 1607. Hall. 2062? Neck. M. M. 49. Weis. P. c. 39?*
H. ad scopulos, locis umbrosis in dem hohlen Weg hinter dem Schloß; am Stüzelberg, alibique.

930. LICHEN, *calcarius*, leprosus candidus, tuberculis atris. *Linn. Spec.* 1607. ? *Hall.* 2058 ? *Neck. M. M.* 48. *Weisf. P. c.* 40.

11. in rupibus calcariis am *Homburg*; bey dem Kalkofen; am *Rehberg*, alibique.

Crusta crassa, inequalis, levis, (nostri) sulphurea, dein albida, rimosa, tessellata, decidua. Tubercula magnitudine Sem. Coriandri, crassa immersa, rufa, demum erumpentia atra.

931. LICHEN, *cinereus*, leprosus, tuberculis nigris albo-marginatis. *Linn. S. N.* 709. *Mantiss.* 132. *Hall.* 2059.

H. in rupibus marioris copiose am *Homburg*.

932. LICHEN, *fagineus*, leprosus albus, tuberculis albis farinaceis. *Linn. Spec.* 1608. *Hall.* 2086. *Weisf. P. c.* 43. *Neck. M. M.* 50.

H. in cortice Fagi aliarumque arborum passim.

933. LICHEN, *carpineus*, leprosus cinereus, tuberculis albidis rugosis. *Linn. Spec.* 1608. *Hall.* 2088. 2091 ? *Weisf. P. c.* 42. *Neck. M. M.* 47.

H. in cortice arborum imprimis *Carpini* frequens.

934. LICHEN, *ericetorum*, leprosus candidus, tuberculis incarnatis. *Linn. Spec.* 1608. *Hall.* 2042. Tuberculis fuscis 2043. *Neck. M. M.* 49. *Weisf. P. c.* 44.

H. inter muscos ad terram; in rupium cavernulis am *Galgenberg nach der Ahr* zu frequens.

Crusta granulosa, nec foliacea, candida, humore irrigata cinereo-virens. Tubercula convexa, Agarici Pileum referentia, carnea, dein fusca, stipite brevis.

b. *Leprosi scutellati.*

935. LICHEN, *candelarius*, crustaceus flavus, scutellis luteis. *Linn. Spec.* 1608. *Hall.* 2023 ? *Weisf. P. c.* 46 ?

H. ad corticem arborum in pomariis passim. Hyeme imprimis pluvia vigen.

Crusta sulphurea seu pallide flava, tenerrima, subius nivea; dum sicca hyflo candelari simillima; a qua facile distingui potest: a, Crusta foliosa: Frondulis crispis, per lentem lobatis: lobis sinuato-lacinatis; lacinis erectis; v. obtusis, villosis. b. Scutellis planissimis, concoloratis: limbo plano farinaceo. In aliis Individuis Frondulae observantur minores. Scutellis destituta:

Foliolis

Foliolis imbricatis minus laciniatis, margine in pollen defluentibus.

936. LICHEN, *tartareus*, crustaceus ex albedo - virescens, scutellis flavescentibus: margine albo. *Linn. Spec.* 1608. *Hall.* 2051.

H. in rupibus passim.

937. LICHEN, *pallefcens*, crustaceus albicans, scutellis pallidis. *Linn. Spec.* 1608. *Hall.* 2024. *Weisf. P. c.* 47. *Neck. M. M.* 54.

H. in truncis arborum; in parietibus ligneis *im Thiergarten* frequens,

938. LICHEN, *subfuscus*, crustaceus albicans, scutellis nigris: junioribus urceolaris cavis. *Linn. S. N.* 710. *Spec.* 1609. *Weisf. P. c.* 48. *Neck. M. M.* 53.

α. Scutellis rufis albedo-marginatis, *minor.* *Hall.* 2049.

β. - - - - *major.* *Hall.* 2043.

γ. - - - - nigris albedo-marginatis. *Hall.* 2056.

δ. - - - - subfuscis - - - - *Hall.* 2047.

ε. - - - - luteis - - - - *Hall.* 2050.

2057. 2058. *Lich. ochroleucus* *Neck. M. M.* 52

H. α, β, δ, ε, in cortice arborum passim; γ, & ε, in rupibus.

939. LICHEN, *Parellus*, crustaceus albus, peltis concavis obtusis pallidis. *Linn. S. N.* 710. *Mantiss.* 132. *Hall.* 2048. *Neck. M. M.* 50.

H. in muris urbis, in rupibus *am Homberg* frequens.

c. *Imbricati.*

940. LICHEN, *centrifugus*, imbricatus, foliolis obsolete multifidis lævibus albidis centrifugis, scutellis rufo-fuscis. *Linn. S. N.* 710. *Spec.* 1609. *Hall.* 2015. *Neck. M. M.* 99. *Weisf. P. c.* 54.

H. in rupibus passim; *am Geißlichenberg* copiose.

941. LICHEN, *saxatilis*, imbricatus, foliolis sinuatis scabris lacunosis, scutellis badiis. *Linn. S. N.* 710. *Spec.* 1609. *Hall.* 2011. *Neck. M. M.* 90. *Weisf. P. c.* 55.

H. in rupibus & cortice arborum ubique frequens; cum scutellis sæpillime occurrit *bey der obern Walkmühle.*

942. LICHEN, *omphalodes*, imbricatus, foliolis multifidis glabris obtusis incanis, punctis vagis eminentibus. *Linn. Spec.* 1609. *Neck. M. M.* 99.
H. in arborum cortice passim; in rupibus *am Homberg*, alibi-
bique frequens.
943. LICHEN, *olivaceus*, imbricatus foliolis lobatis nitidis lividis. *Linn. Spec.* 1610. *Hall.* 2014. *Neck. M. M.* 93. *Weis. P. c.* 58.
H. in truncis arborum, & ad latera rupium ubique.
944. LICHEN, *crispus*, imbricatus, foliolis lobatis truncatis crenatis atro-viridibus, scutellis concoloribus. *Linn. S. N.* 710. *L. murorum. Neck. M. M.* 85. *Dillen. H. M.* 139. *T.* 19. f. 23.
H. ad terram rupibus superstratam *am Geistlichenberg*; ad latera rupium *bey dem Thiergarten* copiose.
945. LICHEN, *nigrescens*, gelatinosus membranaceus, exasperatus, convolutus, atroviridis, scutellis rubris. *Hall.* 2037. *Dillen. H. M.* 138. *T.* 19. f. 20.
H. in rupibus *am Geistlichenberg*; *am Thiergarten*; alibi-
bique.
946. LICHEN, *cristatus*, imbricatus dentato-ciliatus, scutellis folio majoribus. *Linn. S. N.* 710. *Spec.* 1610. *Hall.* 2039. *Neck. M. M.* 86. var.
α. Dillen. H. M. 140. *T.* 19. f. 26. & var.
β. Dillen. 140. *T.* 19. f. 25.
H. in rupibus *am Geistlichenberg*; *β. am Thiergarten; am Galgenberg.*
947. LICHEN, *tremelloides*, frondibus erectis planis margine crispo lacinulato. Tremella *Lichenoides.* *Linn. Spec.* 1625. *Hall.* 2032. *Dillen. H. M.* 145. 146. *Tab.* 19. f. 31. 32. 33. 34. & 35. *Weis. P. c.* 52. *Neck. M. M.* 87.
H. ad terram, aliis muscis plerumque intertextus, in sylvarum umbrosis passim.
Scutellæ in minoribus varietatibus frequentiores; in majori seu Tremella *Lichenoides* Linn. Dill. f. 31, rariores. Hujus unicuique specimen scutelliferum legi in sylvaticis ad pagum Burck, Octobri: Fronde margine minus ciliata, Scutellis numerosissimis totum Frondis discum fere obtegentibus, subpedunculatis, disco carneo, concavo, limbo albido tumido.

948. LICHEN, *pulcher*, gelatinosus viridis, exasperatus, undique concolor. *Hall.* 2036. *Dillen. H. M.* 138. T. 19. f. 22.

H. in rupibus & ad terram, in nemorosis circa *Erbach*, bey *dener Steinhammarn* copiose. Octobri. Martio cum scutellis. Frondes imbricata, carnosae, gelatinosae, crassae, obtusae subsinuatae, pulcherrime & viridi carulescentes, subpellucida; steriles tuberculis immersis concoloribus fere obiecta; scutellifera planiores, tenuioresque, Scutellus numerosus, magnus, carnosus: Disco rufescente, limbo tumido, crenulato, concolore.

949. LICHEN, foliis pulposis, calcariis, glauco poliline villosis, scutellis atris. *Hall.* 2028. *Mich. N. G. Ord.* XXXVI. T. 54. f. 2. accedit, absque scyphis.

H. in rupibus inter Br. *apocarpum*, am *Geistlichen Berg* frequens Octobri.

Frondes calcareae, crassae, durae, irrigatione vix emollienda, albidulae. Scutellae atrae, frondi immersae. Scyphi graciles quatuor lineas longi, pedunculati, ex ipsa frondis substantia, inter scutellas prodeunt.

950. LICHEN, foliis pulposis, calcariis, fuscis, imbricatis, scutellis nigris. *Hall.* 2031. T. 47. f. 3. *Dillen. H. M.* 228. T. 30. f. 134. *Mich. N. G. Ord.* XXXVI. Tab. 54. f. 4?

H. in rupibus am *Geistlichen Berg*, inter Brya, Octobri. Foliola exigua imbricata, fusca, humore irrigata virentia. Scutellae immersae, numerosae, poro tantum in superficie conspicuae.

951. LICHEN, *orbicularis*, fronde semipinnata, rotunde lobata, cinerea, scutellis nigris. *Hall.* 2016. *Neck.* 88. *Dillen. H. M.* 177. T. 24. f. 71. & var. 72.

H. in cortice arborum imprimis *Carpini* in hortis passim.

952. LICHEN, *parietinus*, imbricatus foliis crispis fulvis, peltis concoloribus fulvis. *Linn. Spec.* 1610. *Hall.* 2021. *L. fulvus. Neck. M. M.* 51.

H. ad muros antiquos urbis & caemeterii; in testis schistis passim.

Differt a *L. dendelario* & *juniperino*: Frondibus centrifugis, fulvis, durioribus, linearibus, calcariis, convexis, lobatis: lobis obtusissimis, incrassatis; Scutellis minoribus vix marginatis, fulvis. Hic semper rupestris; illi arboris sunt.

953. LICHEN, *physodes*, imbricatus: laciniis obtusis subinflatis. *Linn. Spec.* 1610. *Hall.* 2018. *Neck. M. M.* 91. *Weisf. P. c.* 57. male pro varietate Lich. saxatilis.

H. in cortice arborum, in testis ligneis *vor dem Homberg* copiosissime; cum scutellis pedunculatis confertis *im Thiergarten* frequens.

954. LICHEN, *stellaris*, imbricatus: foliolis oblongis laciniatis angustis cinereis, scutellis pullis. *Linn. Spec.* 1611. *Hall.* 2017. *Neck. M. M.* 89. *Weisf. P. c.* 60.

H. in ramis arborum ubique.

955. LICHEN, fronde rotunde lobata, glauca, poliline concolore scabra, subtus hirta & atra. *Hall.* 2008. *Mich. N. G. T.* 45. f. 1.

H. in cortice arborum, an denen Linden - Bäumen, auf dem Schießplatz copiose; in rupibus *am Homberg* frequens.

Frondes glauco-cinerea, non lacunosa, dum sicca alba, eleganter lobata, lobis rotundis, sinuato-crenatis; supra ad oram laeves, versus centrum fursure cinereae, demum sordide fusco tota obiecta; subtus radiculis simplicibus confertissimis atris hirta. Scutellas nondum vidi. Pollen furfuraceum, quo hoc & plerique Lichenes imbricari obiecti sunt, si lentis ope inspicitur, corpusculis constat stipitatis simplicibus, confertis, in hoc & centrifugo ramosis, arbusculam referentibus. Corpuscula haec ovata, subrotunda, vel clavaformi figura variantia, apice poro hiant, pollen impalpabile efflant, quo forte Lichenes propagantur. In Lichenibus crustaceis seu leprosis, similia corpuscula plerumque clavaformia, rarius ramosa, apice pollen exhalantia, intermixtis aliis organis pelvisformibus sessilibus, furfuracea scobe repletis, lentis ope observantur.

956. LICHEN, viridis concolor, scutellis planis serratis. *Hall.* 2006. an *L. Acetabulum* *Neck. M. M.* 94?

H. in arborum cortice, in der Alzbach; *vor dem Homberg*; alibiue rarius.

Frondes imbricatae virides, rugosa uti in *L. caperato*. Scutellae numerosae, subpedunculatae, magna: disco concavo badio, limbo crenulato cinereo, uti in *L. saxatili*.

- 957 LICHEN, *ciliaris*, foliaceus erectiusculus: laciniis linearibus ciliatis, scutellis pedunculatis crenatis.

naris. *Linn. Spec.* 1611. *Hall.* 1980. *Neck. M. M.* 101. *Weisf. P. c.* 62.

H. in cortice arborum passim, am *Geistlichen* - & *Homburg*; in sylvis frequens.

958. LICHEN, *bispidus*, fronde semipinnata canaliculata cinerea. *Hall.* 2019. *Dillen. H. M.* 152. T. 20. f. 46.

H. in cortice arborum, imprimis ramulorum, in pomariis ubique vulgarissimus.

Certe non est Var. præcedentis, plurimis notis diversissimus.

959. LICHEN, *pulmonarius*, foliaceus laciniatus obtusus glaber: supra lacunofus; subtus tomentosus. *Linn. Spec.* 1612. *Hall.* 1986. *Neck. M. M.* 108. *Weisf. P. c.* 64.

H. in sylvis ad truncos arborum passim.

Pharm. PULMONARIÆ ARBOREÆ Herba.

960. LICHEN, fronde obtuse lobata, inferne scabra, maculis rotundis varia. *Hall.* 1980. *Dillen H. M.* 216. T. 29. f. 114. *Mich. N. G.* Tab. 49. *optime.* Ord. XXI. pag. 90.

H. in sylvis ad radices rupium im *Thiergarten*, alibique frequens.

Fronidium lobis obtusissimis, rotundatis, sinuato-lacinulatis; supra glaucis, subtus lutescentibus, densum villosis; Scutellis carneis, submarginatis, in frondis disco, non margine, sessilibus & a præcedente, satis hic Lichen se distinguit. Ceterum Frondes lacunosa, minus tamen tuberculis reticulata sunt. Et dum sicca non coriacea tenaces, sed duriores, fragiliores, totaque alba evadunt. Scutellæ a Michelio accurate depictæ, visu variores; in unico specimine tantum paucas vidi.

961. LICHEN, *furfuraceus*, foliaceus decumbens furfuraceus: laciniis acutis; subtus lacunofis atris. *Linn. Spec.* 1612. *Hall.* 1976. *Neck. M. M.* 107. *Weisf. P. c.* 65.

H. ad arborum truncos & parietes *Theriotrophei*, ad asseres in hortis *vor dem obern Thor*.

962. LICHEN, *farinaceus*, foliaceus erectus compressus ramosus: verrucis marginalibus farinosis. *Linn. Spec.* 1613. *Hall.* 1981. *Neck. M. M.* 104. *Weisf. P. c.* 66.

Var. β . *Dillen. H. M.* T. 21. f. 57.

H. ad arborum truncos in sylvis abunde, β . in rupibus *am Geißlichen Berg*.

963. LICHEN, *calycaris*, foliaceus erectus linearis ramosus lacunofus convexus mucronatus. *Linn. Spec.* 1613 *Hall.* 1983. *Neck. M. M.* 106. *Weis. P. c.* 67.

H. ad arborum truncos, in pomariis sylvisque frequens.

964. LICHEN, *fraxineus*, foliaceus rectus oblongus lanceolatus sublaciniatus lacunofus glaber, scutellis subpedunculatis. *Linn. Spec.* 1614. *Hall.* 1985. *Neck. M. M.* 105. *Weis. P. c.* 72.

H. ad arborum truncos in sylvis pomariisque frequens.

965. LICHEN, *prunastri*, foliaceus erectiusculus lacunofus: subtrus tomentosus albus. *Linn. Spec.* 1614. *Hall.* 1984. *Neck. M. M.* 103. *Weis. P. c.* 73.

H. in cortice Pruni, aliarumque arborum, in pomariis sylvisque copiosissime.

966. LICHEN, *juniperinus*, foliaceus laciniatus crispus fulvus, peltis lividis. *Linn. Spec.* 1614. *Neck. M. M.* 96.

H. in arborum cortice passim.

967. LICHEN, *caperatus*, pallide viridis rugosus margine undulatus. *Linn. Spec.* 1614. *Hall.* 2005. *Neck. M. M.* 95. *Weis. P. c.* 74.

H. in arboribus & ad saxa passim. Scutellæ rarissimæ.

968. LICHEN, *glaucus*, foliaceus depresso lobatus glaber: margine crispo farinaceo. *Linn. Spec.* 1615. *Hall.* 2007. *Neck. M. M.* 100. *Weis. P. c.* 75.

H. in arboribus *im Thiergarten*, alibique; in testis ligneis *am Homberg* rarius.

c. *Coriacei*.

969. LICHEN, *resupinatus*, coriaceus repens lobatus, peltis marginalibus posticis. *Linn. Spec.* 1615. *Neck. M. M.* 81.

P. in sylvis, inter lapidum acervos *am Homberg*, alibique frequens.

Individua sterilia frequentiora: Frontes rigidiores, crassiores, margine adscendente flexuoso tuberculato, in pollen defluente: Tuberc-

Tuberculis aliis disco immersis concoloribus. Individua scutellifera rariora: frondes tenuiores, latiores, utrinque laeves. Peltæ in singulo frondis lobo sæpius quinque, tres majores & duo laterales minores, orbiculata, submarginata, rufa, postica parti laciniarum adscendentium adnata.

970. LICHEN, *venosus*, coriaceus repens ovatus planus: subtus venosus villosus, peltis marginalibus horizontalibus. *Linn. Spec. 1615. Hall. 1993. Neck. M. M. 82. Weis. P. c. 82.*

H. ad terram im hohlen Weg, & in der Höhle hinter dem Schloß; in sylvis im Thiergarten alibique frequens.

971. LICHEN, *aphtosus*, coriaceus repens lobatus obtusus planus, verrucis sparsis, pelta marginali adscendente. *Linn. Spec. 1616. Hall. 1992. Neck. M. M. 80. Weis. P. c. 80.*

H. ad terram, in sylvis passim; am Homberg frequens.

972. LICHEN, *caninus*, coriaceus repens lobatus obtusus planus: subtus venosus villosus, pelta marginali adscendente. *Linn. Spec. 1616. Hall. 1988. Neck. M. M. 79. Weis. P. c. 78.*

H. in sylvis ad terram, am Homberg; im Thiergarten; alibique.

973. LICHEN, *horizontalis*, coriaceus repens planus subtus aënius, peltis marginalibus horizontalibus. *Linn. S. N. 712. Mantiss. 132. Hall. 1991. Neck. M. M. 78.*

H. ad terram & radices rupium am Geißlichen Berg copiose.

974. LICHEN, *rufescens*, fronde lobata obtusa aënia, margine sinuata, subtus villosa: peltis subrotundis. *Neck. M. M. 79. Hall. 1990.*

H. ad terram in sylvis am Beilstein; im Thiergarten; alibique frequens.

Peltæ postica parte verrucosa, verrucis viridibus. Frondes juveniles supra verrucosa, hinc L. aphoso nimis adfusus.

975. LICHEN, *polydactylon*, fronde oblonga, subtus venoso-villosa: marginibus subrevolutis adscendentibus. *Neck. M. M. 85.*

H. ad terram, similibus locis sylvaticis montosis, am Homberg.

Var. *precedentis*. Lichenes hi tres inter se plurimis notis convenientes, ob discum Frondis inferiorem semper plus minusve venosum, saepe villosum, LICH. canino, aphosoque ita adfusus, ut pro meris varietatibus haberi possint.

976. LICHEN, *perlatus*, coriaceus repens lobatus glaber subtrus ater, scutellis pedunculatis integris. *Linn. S. N.* 712. *Neck. M. M.* 97. *Dillen. H. M.* 147. T. 20. f. 39.

H. in cortice arborum in pomario *bey der oberen Walchmühle*; in saxis *am Geistlichen Berg*; rarius.

A l. *glauco & saxatili cause distinguendus.*

977. LICHEN, *sylvaticus*, coriaceus repens lacinia-
tus lacunofus, peltis marginalibus adscenden-
tibus. *Linn. S. N.* 712. *Hall.* 1987. *L. poly-*
schides. *Neck.* 84. *Mich. N. G.* 84. T. 43. *Dil-*
len. H. M. 199. T. 27. f. 101.

H. in sylvis, locis umbrosis ad radices & latera rupium in
sylva *auf der Steinseite*; im *Thiergarten* copiose

Odor in sicco Lichene nullus, humore irrigato, urinosus, nauseo-
sus, mihi ingratisissimus. Peltas in unico individuo tantum vi-
di, terminales, exiguas. *L. canino* quadruplo minores, rufas.

978. LICHEN, *saccatus*, foliaceus repens subrotun-
dus: peltis depressis subtrus saccatis. *Linn. Spec.*
1616. *Hall.* 1995. *Neck. M. M.* 83.

H. ad terram in rupium rimis *hinter dem Weitzberg, lincker*
Hand nach dem Thiergarten zu copiosissime.

f. *Umbilicatus*, *squalens* quasi *fuligine*.

979. LICHEN, *pustulatus*, umbilicatus subtrus lacu-
nosus, furfure nigro adpersus. *Linn. Spec.*
1617. *Hall.* 1996. *Neck. M. M.* 75.

H. in rupibus *am Galgen-Berg gegen Burgk* rarius.

g. *Scyphiferi.*

980. LICHEN, *cocciferus*, scyphifer simplex integer-
rimus, stipite cylindrico, tuberculis coccineis.
Linn. Spec. 1618. *Hall.* 1918. 1927. 1928. *Neck.*
M. M. 57. *Weisf. P. c.* 90. v. f.

H. in ericetis & rupibus *am Homberg*, alibique.

Pharm. MUSCI PYXIDATI Herba.

981. LICHEN, *cornucopioides*, scyphifer simplex fo-
lio brevior, tuberculis coccineis. *Linn. Spec.*
1619. *Hall.* 1929. *Neck. M. M.* 58. β.

H. in ericetis *am Homberg*, in sylvaticis montosis *am Geistli-*
chen. & Galgen-Berg frequens.

982. LICHEN, *pyxidatus*, scyphifer simplex crenulatus, tuberculis fuscis. *Linn. Spec.* 1619. *Hall.* 1912. 1923. *Neck. M. M.* 55. *Weis. P. c.* 84. α. & 85. β.
H. in sylvaticis montosis sterilibus passim.
983. LICHEN, *fimbriatus*, scyphifer simplex denticulatus, stipite cylindrico. *Linn. Spec.* 1619. *Hall.* 1915. 1916. *Neck. M. M.* 55. β. *Weis. P. c.* 88. e
H. in sylvaticis sterilibus *am Galgen - Berg*; *am Homberg* frequens.
984. LICHEN, *gracilis*, scyphifer ramosus denticulatus filiformis. *Linn. Spec.* 1619. *Hall.* 1924. 1916. 1915. 1946. *Neck. M. M.* 56. *Weis. P. c.* 93. h
H. in sterilibus montosis *am Galgen Berg*, *Rehberg* & *Homberg*, infrequens.
985. LICHEN, *digitatus*, scyphifer ramosissimus, ramis cylindricis, calycibus integris nodosis. *Linn. Spec.* 1620. *Hall.* 1939. 1940. & β. var. *cornuta* 1910. *Neck. M. M.* 59. *Weis. P. c.* 91.
H. in sterilibus montosis *am Homberg*, alibique; β. in tectis ligneis semiputridis frequens.
986. LICHEN, *cornutus*, scyphifer simpliciusculus subventricosus, calycibus integris. *Linn. Spec.* 1620. *Hall.* 1903. & forte 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. *Neck. M. M.* 59. *Weis. P. c.* 86. c.
H. in ericetis & ad truncos arborum putridos copiose passim.
987. LICHEN, *deformis*, scyphifer simpliciusculus subventricosus, calycibus dentatis. *Linn. Spec.* 1620. *Hall.* 1904. 1938.
H. in montosis sterilibus mucosis *am Rehberg*, rarius.
h. *Fruticulosi*.
988. LICHEN, *rangiferinus*, fruticulosus perforatus ramosissimus, ramulis nutantibus. *Linn. Spec.* 1620.
α. alpestris. *Hall.* 1957. *Weis. P. c.* 95. } Lich. alpestris.
β. sylvaticus. *Hall.* 1956. } *Neck. M. M.* 68.
H. α.

H. α . in montosis editioribus *am Galgenberg* ; *Rehberg* ; β . in sterilibus montosis ubique copiosissime.

989. LICHEN, *uncialis*, fruticulosus perforatus, ramulis brevissimis acutis. *Linn. Spec.* 1621. *Hall.* 1960. *L. ceranoides. Neck. M. M.* 63. var. junior.

H. in ericetis, inter *L. subulatum*, *am Galgen-Berg*, infrequens.

990. LICHEN, *subulatus*, fruticulosus subdichotomus, ramis simplicibus subulatis. *Linn. Spec.* 1621. *Hall.* 1955. *L. cornu cervi. Neck. M. M.* 64. β . *Weiss. P. c.* 97.

H. similibus locis sterilibus montosis passim.

991. LICHEN, *pascualis*, fruticulosus solidus rectus foliolis crustaceis. *Linn. Spec.* 1621. *Hall.* 1963. *Neck. M. M.* 66.

H. in sterilibus montosis *im Thiergarten* ; unicum tantum specimen a Filio H. P. lectum : *Caulis & ramis lignosis solidis, intus non cavis ; Tuberculis foliolisque pulverulentis glomeratis fere totis obtectis*, possideo,

992. LICHEN, *castaneus*, fruticosus, durus castaneus, furculis spinosis. *Hall.* 1965. *Dillen. H. M.* 112. T. 17. f. 31.

H. in ericetis montosis inter *L. subulatum am Homberg* ; *Beilstein*, alibique copiose.

Caulis bipollicaris, ramosissimus, erectus, compresso-lacunosus, glaber, nitidus, spadiceus, axillis non perforatis, interne medulla farctus arachnoidea. Rami copiosissimis, valde divisis & subdivisis, ciliatis ; in secco, duris hispidis ; in humido, mollissimis. Scutellæ in caule & majoribus ramis terminales, rufa, marginata, radiata : lacinulis setaceis confertis inaequalibus. Camilium basis saepe sanguineo-maculata ; hinc i. islandico forte adfinis.

993. LICHEN, *quisquiliaris*, fronde cinerea, scabra, ramis brevibus acutis, scutellis nigerrimis. *Hall.* 2026. *Mieb. N. G.* p. 78. T. 53. f. 8.

H. in rupium cavernulis, *am Geistlichen Berg* ; alibique frequens, muscis intermixtus.

Tenerrimi fruticuli, albidii, erecti, ramosissimi, ramulis acutis, fursura albido rectis. In aliis individuis durioribus minusque ramosis : Tubercula terminalia, conferta, atro-fusca.

i. *Filamentosi.*

994. LICHEN, *barbatus*, filamentosus pendulus subarticu-

articulatus, ramis patentibus. *Linn. Spec.* 1622, *Hall.* 1970. *Neck. M. M.* 71. *Weisf. P. c.* 100.

H. in sylvis, in der Hölle frequens.

995. LICHEN, *juvatus*, filamentosus pendulus: axillis compressis. *Linn. Spec.* 1622. *Hall.* 1968. *Neck. M. M.* 72. *Weisf. P. c.* 101.

H. in sylvis, ad arborum truncos in der Hölle; im Thiergarten frequens.

996. LICHEN, *lanatus*, filamentosus ramosissimus decumbens implicatus opacus. *Linn. Spec.* 1623? *Hall.* 1967. *Neck. M. M.* 73. β .

H. in rupibus, sepimentisque vetustis im Thiergarten, alibique.

Nostr. ramosissimus, implexus, decumbens, fusco-ater, ramulis capillaribus hirsutis, per lentem lavibus; axillis compressis, tuberculisque exiguis uti in precedente, cujus varietas est.

997. LICHEN, *pubescens*, filamentosus ramosissimus decumbens implexus nitidus. *Linn. Spec.* 1623? Usnea nigra, setæ equinæ facie, parum ramosa. *Dillen, H. M.* 67. *T.* 13. f. 11.

H. in rupibus, ericetis inque sylvis, am Homburg alibique frequens.

Fila capillaria spithamea s. dodrantalia, subramosa, nigra, glabra, nitida, teretia, setam equinam exacte referentia; soli obversa pellucida, purpurea, intus medulla candida farcta; exsiccata rigida linearia, planissima, spiritaliter contracta, subviolacea. Rami pauci, breviores, remoti, patentissimi; quibus circumgyrando Hypna constringit, ut difficile separari queant. Filorum basis semper solitaria, frustulo ligni seu folio putrido, immo etiam ipsi Muscis, adnata.

998. LICHEN, *chalybeiformis*, filamentosus ramosus divaricatus decumbens implicato-flexuosus. *Linn. Spec.* 1623. *Hall.* 1969. *Neck. M. M.* 73.

H. in sepimentis vetustis im Thiergarten rarius.

999. LICHEN, *birtus*, filamentosus ramosissimus erectus, tuberculis farinaceis sparsis. *Linn. Spec.* 1623. *Hall.* 1973. *Neck. M. M.* 69. *Weisf. P. c.* 101.

H. in sylvis, ad arbores sepime itaque passim.

1000. LICHEN, *floridus*, filamentosus ramosus erectus,

ctus, scutellis radiatis. *Linn. Spec.* 1624. *Hall.*
1972. *Neck. M. M.* 69. *Weisf. P. c.* 102.

H. in sylvis cum præcedente passim; in sepimentis vetustis
im *Thiergarten*. Scutellis maximis ultra pollicem latis.

BYSSUS G. P. 1208.

Lanugo aut Pulvis simplicissimus. S. N. 721.

a. *Filamentosa.*

1001. Byssus, *Flos aquæ*, filamentis plumosis natan-
tibus. *Linn. S. N.* 721. *Spec.* 1637. *Hall.*
2113.

H. in omni aqua stagnante, superficiæ innatans.

1002. Byssus, *phosphorea*, lanuginosa violacea li-
gnis adnascens. *Linn. Spec.* 1638. *Neck. M.*
M. 1.

H. in corticibus rimosis semiputridis arborum passim.

1003. Byssus, *velutina*, capillacea viridis: filamen-
tis ramosis. *Linn. S. N.* 721. *Spec.* 1638. *Hall.*
2101. *Neck. M. M.* 2. *Weisf. P. c.* 12.

H. in terra humida umbrosa, in hortis passim.

1004. Byssus, *aurea*, capillacea pulverulenta, fru-
ctificationibus sparsis, filamentis simplicibus
ramosisque. *Linn. Spec.* 1638. *Hall.* 2106.
Neck. M. M. 1. *Weisf. P. c.* 13.

H. in rupibus, muscos vestiens, inter *Mn. hornum*, & *Lich.*
saccatum, am *Weg nach dem Thiergarten zu*.

1005. Byssus, *floccosa*, evanida floccosa nivea. *Leyf.*
Fl. Hal. 1045. *B. cellaris* *Weisf. P. c.* 18. *Hall.*
2108.

H. in cellis ad dolia frequens.

1006. Byssus, *nigra*, velutina. *Hall.* 2104. *Dillen.*
H. M. 9. *T.* 1. f. 18.

H. in rupibus am *Geistlichen Berg* alibique frequens.

Pulvilloso formas ambitu pollicares, aterrimos, pannum velutinum
atrum exakte referentes: Filamentis erectis constas ramosissi-
mis.

b. *Pulverulenta.*

1007. Byssus, *antiquitatis*, pulverulenta atra. *Linn.*
Spec. 1638. *Hall.* 2081. *Weisf. P. c.* 14.

H. in muris antiquis, & tectis schisteis passim.

1008.

1008. *Byssus, saxatilis*, pulverulenta cinerea rupes operiens. *Linn. Spec.* 1638. *Weisf. P. c.* 17. Lich. *segestria*. *Neck. M. M.* 113.

H. in saxis *am Homberg*, ubique frequens.

1009. *Byssus, candelaris*, pulverulenta flava lignis adnascens *Linn. Spec.* 1639. *Hall.* 2096. Lichen. *Neck. M. M.* 112. *Weisf. P. c.* 15.

H. in cortice arborum, parietibus antiquis, Februario frequens.

1010. *Byssus, botryoides*, pulverulenta viridis. *Linn. Spec.* 1639. *Hall.* 2089. Lichen. *Neck. M. M.* 111. *Weisf. P. c.* 15.

H. in terra humida umbrosa passim.

1011. *Byssus, incana*, pulverulenta incana, farinae instar strata *Linn. Spec.* 1639. *Hall.* 2094. *Weisf. P. c.* 16. Lichen. *Neck. M. M.* 112.

H. in cortice rimoso arborum, inque terra.

1012. *Byssus, lactea*, pulverulento - crustacea albissima. *Linn. Spec.* 1639. *Hall.* 2093. *Weisf. P. c.* 17. Lichen. *Neck. M. M.* 113.

H. in arborum truncis, muscos vestiens.

•• *Aquaticæ.*

TREMELLA. G. P. 1204.

Fructificationes vix manifestæ, in corpore gelatinoso. S. N. 714.

1013. TREMELLA, *juniperina*, sessilis membranacea auriformis fulva. *Linn. Spec.* 1625. *Hall.* 2260.

H. in Junipero, aliisque lignis putridis primo vere *am Homberg* frequens.

1014. TREMELLA, *Nostoc*, plicata undulata. *Linn. Spec.* 1625. *Hall.* 2041. Lichen. *Weisf. P. c.* 29. *Dillen. H. M. T.* 10. f. 14.

β. *Dillen. H. M. T.* 10. f. 15.

H. α. Viridis membranacea undulato-plicata, semper fructificatione destituta. in pratis post pluvias, & inter muscos frequens; β. Nigrescens gelatinosa, crassa, reticulato-plicata, fructificationibus sparsis conicis, in truncis arborum emortuis passim. Floret hyeme.

1015. TREMELLA, *purpurea*, subglobosa sessilis folitaria glabra. *Linn. Spec.* 1626. *Weis. P. c.* 30. H. in arborum imprimis Mali ramis emortuis frequens.

ULVA. G. P. 1206.

Fructificationes in membrana diaphana. S. N.

719.

1016. ULVA, *granulata*, globosa farcta viridis. *Linn. S. N.* 720. *Mant.* 136. *Spec.* 1633. *Tremella globosa. Weis. P. c.* 28. *Conserua. Hall.* 2123?

H. in agris humidis *hinter dem Schloß* autumnis; sphærule majoribus aggregatis, viridibus, farctis, pellucidis: ad ripas *Dilla auf dem Hinter-Sand*, primo vere frequens.

CONFERVA. G. P. 1207.

Tubercula inæqualia in fibris capillaribus longissimis. S. N. 720.

a. *Filamentis simplicibus, aequalibus, geniculis destitutis,*

1017. CONFERVA, *rivularis*, filamentis simplicissimis æqualibus longissimis. *Linn. Spec.* 1633. *Hall.* 2115. *Neck. M. M.* 3. *Weis. P. c.* 20.

H. in rivulis *auf der Herren-Wiese*; in der *Dilla* frequens.

1018. CONFERVA, *fontinalis*, filamentis simplicissimis æqualibus digito brevioribus. *Linn. Spec.* 1633. *Hall.* 2114. *Neck. M. M.* 4. *Weis. P. c.* 21.

H. ad canalium oras aquas ducentium *im Kallenbachs-Grund*.

b. *Filamentis ramosis, aequalibus,*

1019. CONFERVA, *bullosa*, filamentis æqualibus ramosis bullas aëreas includentibus. *Linn. Spec.* 1634. *Hall.* 2120. *Neck. M. M.* 3. *Weis. P. c.* 22.

H. in aquis stagnantibus, *im Juden-Weyer*, alibique.

1020. CONFERVA, *canalicularis*, filamentis æqualibus basin versus ramosioribus. *Linn. Spec.* 1634. *Hall.* 2118. *Neck. M. M.* 5. *Weis. P. c.* 23.

H. in rivulis canalibusque aquam vehentibus, *bey der Papier- & Walckmühle* frequens.

1021. CONFERVA, *amphibia*, filamentis æqualibus ramosis, exsiccatione coëuntibus in aculeos. *Linn. Spec. 1634. Neck. M. M. 4. Weis. P. c. 24.*
H. in fossis bey dem Bockshayn, frequens.
c. *Filamentis anastomosantibus.*
1022. CONFERVA, *reticulata*, filamentis reticulato-coadunatis. *Linn. Spec. 1635. Hall. 2119. Neck. M. M. 5. Weis. P. c. 24.*
H. in fossis aqua stagnante repletis, bey dem Sinner Hof.
d. *Filamentis nodosis.*
1023. CONFERVA, *fluviatilis*, filis simplicissimis seriformibus rectis: geniculis crassioribus angulatis. *Linn. Spec. 1635. Dill. H. M. 39. T. 7. f. 47. et β. 48.*
H. α. unter der neuen Brücke; β. am Schützriemen, auf der Herrn Wiese, gegen Burgk über. Lapidibus sub aqua dense adnascens.
1024. CONFERVA, *gelatinosa*, filis ramosis moniliformibus, articulis globosis gelatinosis. *Linn. Spec. 1635. Hall. 2124. Chara batrachosperma. Weis. P. c. 33.*
H. in scaturiginosis sylvaticis im Hirschberg ad Gundersdorf frequens.
1025. CONFERVA, *capillaris*, filis geniculatis simplicibus: articulis alternatim compressis. *Linn. Spec. 1636. Dillen. H. M. 25. Tab. 5. f. 25. A. et B. Neck. M. M. 8.*
H. in stagnis an der Dille bey dem Sinner Hof, rarius.
1026. CONFERVA, *glomerata*, filamentis geniculatis, ramulis brevioribus multifidis. *Linn. Spec. 1637. Neck. M. M. 9. Weis. P. c. 25. α. Dillen. H. M. 28. T. 5. f. 31. & β. p. 27. T. 5. f. 28. & 29.*
H. α. in rivulis, unter dem Steg bey der obern Walckmühle; β. auf der Herrn Wiese.

Hic habes L. B. MUSCOS & ALGAS, quas decem annorum spatio, summo cum labore & molestia, in nostræ urbis regione vicinisque sylvis collegi, descripsi, & ad vivum accurate depinxi;

pinxi ; Has, siquidem vires valetudine , dum hæc scribo ,
summe infirmas restaurabit , & ulteriorem lucis usum di-
vina mihi concedet indulgentia , omnes æri incidere &
cum descriptionibus sub Titulo : VEGETABILIA CRY-
PTOGAMICA ICONIBUS ILLUSTRATA , in lucem
edere animus est.

D. F U N G I.

* *Pileati.*

AGARICUS, G. P. 1209.

Fungus horizontalis, subtus lamellosus, S N.

722

a. *Stipitati , pileo orbiculato.*

1027. AGARICUS , *Cbantarellus* , stipitatus , lamellis
ramosis decurrentibus. *Linn Spec.* 1639. *Meru-*
lius Hall. 2326. *Gled. Meth. Fung.* 103. XII.

H. in pratis sylvaticis *am Rebberg*, post pluvias autumnio pri-
moque vere frequens.

1028. AGARICUS , *integer* , stipitatus , lamellis omni-
bus magnitudine æqualibus. *Linn Spec.* 1640.
Hall. 2374. *Gled M. F.* 106. XIV.

H. in sylvis ad arborum radices *im Thiergarten*; autumnio.

1029. AGARICUS , *muscarius* , stipitatus , lamellis di-
midiatis solitariis , stipite volvato : apice di-
latato , basi ovata. *Linn. Spec.* 1640. *Hall.* 2373.
Gled. M. F. 82. I.

H. in sylvis passim ; *am Guldners - und Fischerweyer - Grund* ;
im Beilstein frequens.

1030. AGARICUS , *dentatus* , stipitatus , pileo con-
vexo , lamellis basi mucrone dentatis. *Linn.*
Spec. 1640 *Hall* 2421 ?

H. in sylvis ; *im Thiergarten* autumnio.

1031. AGARICUS , *deliciosus* , stipitatus , pileo testa-
ceo , succo lutescente. *Linn. Spec.* 1641. *Hall.*
2419. *Gled. M. F.* 101. XI. a.

H. in montosis sylvaticis sterilibus *am Homberg* rarius ; *am*
steinern Berg frequens.

1032. AGARICUS , *piperatus* , stipitatus , pileo plani-
sculo lactescente : margine deflexo , lamellis
incarnato-pallidis. *Linn. Spec.* 1641. *Hall.* 2338.

a) Pi-

- α. Pileo convexo-depresso, lamellis pallidis, *Linn. Flor. Suec.* 1195. α. *Gled. M. F.* 97. X. α.
 β. Pileo planiusculo disco conico, lamellis lividis *Linn. Flor. Suec.* 1195. β. *Gled. M. F.* 103. e.
 H. α. in pascuis & pratis *in der Aus; vor dem Pomberg; auf dem Schlüssel. S.* ibidem rarius
1033. AGARICUS, *campestris*, stipitatus, pileo convexo squamato albido, lamellis rufis. *Linn. Spec.* 1641. *Hall.* 2443. *Gled. M. F.* 115. XXI.
 H. in pascuis, pratis, pomariisque post pluvias Augusto & sequ. frequens.
1034. AGARICUS, *georgii*, stipitatus, pileo flavo convexo, lamellis albis. *Linn. Spec.* 1642. *Hall.* 2367. *Gled. M. F.* 117. e.
 H. in pascuis sylvaticis *am Beilstein*, abunde Septembri.
1035. AGARICUS, *violaceus*, stipitatus, pileo rimoso: margine violaceo tomentoso, stipite cærulescente lana ferruginea. *Linn. Spec.* 1641. *Hall.* 2455.
 H. in pascuis sylvaticis circa *Ockersdorf & Amdorf*.
1036. AGARICUS, *cinnamomeus*, stipitatus, pileo for-
 dide flavo, lamellis luteo rufis *Linn. Spec.* 1642. *Hall.* 2432.
 H. in pratis sylvaticis *am Rehberg*, Octobri.
1037. AGARICUS, *mammosus*, stipitatus, pileo convexo acuminato griseo, lamellis convexis griseis crenatis, stipite nudo. *Linn. Spec.* 1642.
 H. in pascuis *hinter dem Schloß*; locis umbrosis, ad sepes.
1038. AGARICUS, *extinctorius*, stipitatus, pileo campaniformi albido lacero, lamellis niveis, stipite subbulboso subulato nudo. *Linn. Spec.* 1643. *Hall.* 2341. 2342. *Gled. M. F.* 130. XXVII. cum Var.
 H. in dumetis, sepibus, pascuis, & muscosis locis sylvaticis passim.
1039. AGARICUS, *finetarius*, stipitatus, pileo campanulato lacero, lamellis nigris lateraliter flexuosis, stipite fistuloso. *Linn. Spec.* 1643. *Hall.* 2357. *Gled. M. F.* 122. XXIV. α.
 H. in finetis & ambulacris hortorum, intra extraque urbem frequens.

1040. AGARICUS, *campanulatus*, stipitatus, pileo campanulato striato pellucido, lamellis adscendentibus, stipite nudo. *Linn Spec.* 1643.
H. in pratis auf denen neuen Wiesen frequens.
1041. AGARICUS, *fragilis*, stipitatus, pileo convexo viscido pellucido, lamellis luteis, stipite nudo. *Linn. Spec.* 1643. *Hall.* 2425 & 2426.
H. in hortorum ambulacris, & lignis semiputridis auf dem Hinter-Sand; rarius.
1042. AGARICUS, *umbelliferus*, stipitatus, pileo plicato membranaceo, lamellis basi latioribus. *Linn. Spec.* 1643. *Hall.* 2346. *Gled. M. F.* 126. g. & 126. f.
H. in foliis dejectis, rejectamentisque hortorum passim; bey dem dicken Thurm, alibique
1043. AGARICUS, *androsaceus*, stipitatus albus, pileo plicato membranaceo, stipite nigro. *Linn. Spec.* 1644. *Hall.* 2351. *Gled. M. F.* 108. XV.
H. in foliis dejectis, Pini strobilis, & inter muscos am Homberg, im Thiergarten, alibique.
1044. AGARICUS, *clavus*, stipitatus, pileo luteo, convexo striato, lamellis stipiteque albis. *Linn. Spec.* 1644. *Hall.* 2370. *Gled. M. F.* 109. XVII. a.
H. in graminosis muscosis umbrosis vor dem Homberg am Winkel, rarius Aprili.

b. Acaules.

1045. AGARICUS, *Quercinus*, acaulis, lamellis labyrinthiformibus. *Linn. Spec.* 1644. *Hall.* 2330. *Gled. M. F.* 134. XXX.
H. in arborum imprimis Quercus truncis emortuis in der Hirre alibique frequens.
1046. AGARICUS, *Betulinus*, acaulis, coriaceus villosus: margine obtuso, lamellis ramosis anastomisantibus. *Linn. Spec.* 1645. *Merulius Hall.* 2309.
H. in caudicibus Betularum, aliisque lignis, auf dem Hinter-Sand.
1047. AGARICUS, *Alneus*, acaulis, lamellis bifidis pulverulentis. *Linn. Spec.* 1645. *Hall.* 2333. *Gled. M. F.* 134. XXXI.
H. in arborum truncis emortuis in der Alzbach, rarius.

BOLE-

1048. AGARICUS, *cervinus*, petiolo bulboso, far-
to, pileolo per oram tuberculoso & striato.
Hall. 2401.

H. in rejectamentis coriariorum intra urbem. Octobri.

1049. AGARICUS, *flavus*, totus striatus tenuissimus.
Hall. 2429.

H. in sterilibus montosis *am Homberg.* Octobri.

1050. AGARICUS, *viscidus*, petioli carne flava, pi-
leo plano, sordide luteo, lamellis albis. *Hall.*
2369.

H. in Pineto in *Hoffmanns Tannen.* Septembri.

1051. AGARICUS, *murinus*, pileo ovato adtracto.
Hall. 2473.

H. in sterilibus muscosis *im Thiergarten.* Aprili.

1052. AGARICUS, *cervinus* annulatus procerus exi-
guus. *Hall.* 2403.

H. in sylvaticis umbrosis *im Thiergarten.* Aprili.

1053. AGARICUS, *violaceus*, petiolo gracili, pileo-
lo pulvinato. *Hall.* 2457.

H. in sylvis *am Homberg.* Octobri.

1054. AGARICUS, annulo araneoso, pileo flavo, la-
mellis ex flavo fuliginosis. *Hall.* 2482.

H. in sylvis *am Homberg.* Octobri.

1055. AGARICUS, petiolo procero gracilissimo, pi-
leolo conico striato murino, lamellis albis.
Hall. 2391.

H. in muscosis sterilibus *am Homberg.* inter Hypna. Julio.

1056. AGARICUS, pileo pulvinato, leonino, cen-
tro fusco squamoso. *Hall.* 2360. an. *Mich.*
N. G. T. 75. f. 4.

H. in foliis congestis putridis *am Homberg.* Octobri.

1057. AGARICUS, infundibuli forma, *cervinus* la-
mellis albis. *Hall.* 2359. *Gled. M. F.* 119. b?

H. similibus locis *am Homberg.* Octobri.

1058. AGARICUS, petiolo gracili, prælongo, pi-
leolo striato conico. *Hall.* 2345. f. 2347. *Gled.*
M. F. 120. VI. f. 128. k.

H. inter Hypna *am Homberg.* Octobri.

1059. AGARICUS, *cespitosus*, petiolo procero, fi-
stuloso.

stuloso, pileo umbonato, striato, squamoso:
Hall. 2389.

H. ad arborum radices *am Homberg*.

1060. AGARICUS, radice caudata, petiolo fistuloso
procero, pileo umbonato, cinereo, striato,
lamellis albis. Hall. 2388. Gled. M. F. 124.
XXV.

H. locis umbrosis *hinter dem Schloß* Octobri.

1061. AGARICUS, albus, pileo hæmisphærico; ex-
carni, oris striatis. Hall. 2348. Gled. M. F.
120. C.

H. ad arborum cortices inter Lichenes imbric. post pluvias
diurnas, toto fere anno frequens.

1062. AGARICUS, flavus, volvatus, annulo latissi-
mo. Hall. 1430. Gled. M. F. 85. b.

H. in quiescentibus putrescentibus, *auf dem Hinter-Sand*, Octobri.

1063. AGARICUS, albus omnium minimus, pileolo
hæmisphærico. Hall. 2349 Gled. M. F. 121. d.

H. in foliis putrescentibus autumnis passim.

BOLETUS. G. P. 1210.

Fungus horizontalis, subtus porosus. S. N.
723.

b. *Parasitici acaules.*

1064. BOLETUS, *suberosus*, acaulis pulvinatus albus
lævis, poris acutis difformibus. Linn. Spec. 1645.

H. in arborum caudicibus *am Homberg*; *im Thiergarten*; *auf dem Hinter-Sand*, alibique.

1065. BOLETUS, *fomentarius*, acaulis pulvinatus in-
æqualis obtusus, poris teretibus inæqualibus
glaucis. Linn. Spec. 1645.

H. cum præcedente, *im Beilstein* frequens.

1066. BOLETUS, *igniarius*, acaulis pulvinatus lævis,
poris tenuissimis. Linn. Spec. 1645. Hall. 2288.
Gled. M. F. 78. XII.

H. ad arborum truncos antiquos, passim.

1067. BOLETUS, *versicolor*, acaulis: fasciis dicolori-
bus, poris albis. Linn. Spec. 1645. Hall. 2282.
Gled. M. F. 68. b.

H. ad arborum truncos submortuos, ubique *vare* & autu-
mno frequens.

1068.

b. *Stipitatus*.

1068. *BOLETUS, viscidus*, stipitatus, pileo pulvinato viscido poris teretibus convexis immerfis distinctis, stipite lacero. *Linn. Spec.* 1646.

H. in sylvis *bey dem Guldners - & Fischweyer - Grund*, autumnino.

1069. *BOLETUS, luteus*, stipitatus, pileo pulvinato subviscido, poris rotundatis convexis flavissimis, stipite albido. *Linn. Spec.* 1646. *Polyporus. Hall.* 2301.

H. in sylvis *am Homberg*; *im Beilstein*, alibique autumnino copiosissime.

1070. *BOLETUS, bovinus*, stipitatus, pileo glabro pulvinato marginato. poris compositis acutis: porulis angularis brevioribus. *Linn. Spec.* 1646. *Hall.* 2302. *Gled. M. F.* 63. l.

H. in pascuis sylvaticis *im Pulvers - & Guldners - Grund* copiosissime. Octobri.

1071. *BOLETUS subtomentosus*, stipitatus, pileo flavo subtomentoso, poris subangularis difformibus fulvis planis, stipite flavo. *Linn. Spec.* 1647. *Hall. Polypor.* 2311. *Gled. M. F.* 73. a?

H. in montosis *im Homberg*. Aprili.

1072. *BOLETUS, flabelliformis*, stipitatus coriaceus, poris tenuissimis, stipite laterali. *Leyser Hal.* 1093. *Gled. M. F.* 80. d.

1073. *BOLETUS, petiolatus niveus*, alveolis subtus quadrangulis. *Hall.* 2295.

H. in sylvaticis montosis *im Thiergarten*, primo vese.

1074. *BOLETUS, sessilis*, carne secedente, mollis, sanguineus, crassus, obscure lobatus. *Hall.* 2315. *Gled. M. F.* 77. X?

H. in truncis emoribundis *im Beilstein*. Septembri.

HYDNUM. G. P. 1215.

Fungus horizontalis, subtus echinatus. S. N.
724.

1075. *HYDNUM, imbricatum*, stipitarum, pileo convexo imbricato. *Linn. Spec.* 1647. *Hall. Echinus* 2314. S 2 H.

H. in Pinetis *am Homberg*; *Beilstein*, autumnno.

1076. *HYDNUM*, *repandum*, stipitatum, pileo convexo lævi flexuoso. *Linn. Spec.* 1647. *Hall.* 2325. *Gled. M. F.* 74. VI.

H. in sylvis *am Hemberg*; *im Thiergarten*, copiose.

1077. *HYDNUM*, *tomentosum*, stipitatum, pileo plano infundibuliformi. *Linn. Spec.* 1647.

H. in montosis muscosis *am Homberg*. *Martio*.

1078. *HYDNUM*, *auriscalpium*, stipitatum, pileo dimidiato. *Linn. Spec.* 1648. *Hall.* 2321. *Gled. M. F.* 74. VII.

H. in sylvis acerosis *am Stützelberg*; *in Hoffmanns Tannen*, rarius; *im Thiergarten* copiose. Strobilis Pini dejectis putrescentibus innascens. Novembr.

1079. *HYDNUM*, *parasiticum acaule*, arcuato-rugosum tomentosum. *Linn. Spec.* 1648.

H. in arborum truncis *am Beilstein* frequens.

1080. *HYDNUM*, *laciniatum*, ramiosus niveus, aculeis parallelis horizontalibus, unilateralibus. *Echinus Hall.* 2317. *Mich. N. G.* 122. T. 64. f. 2. optime.

H. in caudicibus arborum *in der Hölle*. *Filius*. Octobri.

Fungus altissimus, elegans. Stipes crassus, carnosus, ramosissimus, ramis subteretibus, divisis & subdivisis, apice bi s. trifidis obtusiusculis; Aculei numerosi, concolores horizontales, in stipite ramisque unilaterales.

PHALLUS. G. P. 1212.

Fungus supra reticularis, subtus lævis. S. N. 724.

1081. *PHALLUS*, *esculentus*, pileo ovato celluloso, stipite nudo rugoso. *Linn.* 1648. *Boletus Hall.* 2247. *Gled. M. F.* 60. a.

H. in sylvis *am Homberg* rarius; *in der Hölle* copiose. April.

1082. *PHALLUS*, *impudicus*, volvatus stipitatus, pileo celluloso. *Linn. Spec.* 1648. *Hall.* 2248. *Gled. M. F.* 54. α. I. & β. 55. II.

H. in sylvis α. *im Thiergarten*; β. in dumetis oben *am Fisch-vvayer-Grund*. Septembri. α. Pileo apice clauso. β. Pileo apice parvo.

** *Pileo*

** *Pileo destituti.*

HELVELA. G. P. 1214.

Fungus turbinatus, S. N. 725.

1083. HELVELA, *mitra*, pileo deflexo adnato lobato difformi. *Linn. Spec.* 1649. *Boletus* Hall. 2246. *Gled. M. F.* 38. c.

H. in sylvis unter denen Tannen im Thiergarten rarius.

PEZIZA. G. P. 1215.

Fungus campanulatus, sessilis.

1084. PEZIZA, *lentifera*, campanulata lentifera. *Linn. Spec.* 1649.

α. Cyathus sericeus, intus laevis. Hall. 2215. *Gled. M. F.* 137. I.

β. Cyathus hirsutus intus striatus. Hall. 2215. *Gled. M. F.* 138. a.

H. α. in terra glareosa, ex frustulo ligni sepulto; β. in truncis arborum semiputridis; auf dem Hinter-Sand. Octobri.

1085. PEZIZA, *minuta*, campanulata lentifera stipitata. an. Hall. 2338?

H. in Jungermannia platyphylla frondibus emarcidis, am Geißlichenberg. Octobri.

Omnium minima, vix lineam longa, Calycem hyalinum vinarium vulgo Kelchglas dictum exactissime referens. Stipes semilineam longus, purpureus, basi orbiculata. Scyphus campaniformis, flavescens, membrana convexa elatus, qua decidente, intus totus seminibus repletus. Semina magnitudine & figura sem. Papaveris singulari modo elastice dissiliunt, in lacinias radiantes dehiscunt, lanamque niveam explodunt. Scypho vacuo persistente.

1086. PEZIZA, *punctata*, turbinata truncata, disco punctato. *Linn. Spec.* 1650. *Sphaeria* Hall. 2184. *Gled. M. F.* 44. VII.

H. in stercore equino bovinoque, auf dem Schießplatz rarius.

1087. PEZIZA, *cornucopioides*, infundibuliformis, disco patente sinuato-punctato. *Linn. Spec.* 1650. Hall. 2216.

H. in sylvaticis am Dollberg; in sepibus hinter dem Schloß; bey dem Klingelborn, infrequens.

1088. PEZIZA, *Acetabulum*, cyathiformis: extus angulata renis ramosis. *Linn. Spec.* 1650. *Hall.* 2223. *Gled. M. F.* 42. VI.

H. in sylvaticis montosis am Geißlichen Berg; im Thiergarten.

1089. PEZIZA, cyathiformis: margine obtuso erecto. *Linn. Spec.* 1651.

H. ad terram in sylvaticis umbrosis im Beilstein; circa Erbach frequens.

1090. PEZIZA, *cupularis*, globoso - campanulata: margine crenato. *Linn. Spec.* 1651. *Hall.* 2228.

H. ad terram hinter dem Schloß, in der Höhle; in sylvis im Hirschberg copiose.

1091. PEZIZA, *scutellata*, plana: margine convexo piloso. *Linn. Spec.* 1651. *Hall.* 2242. *Gled. M. F.* 45. a.

H. in sylvis, inter muscos ad terram am Homberg, alibique frequens.

1092. PEZIZA, *cochleata*, turbinata cochleara. *Linn. Spec.* 1651. *Hall.* 2218?

H. locis umbrosis in sylvis im Mühlberg, rarius.

1093. PEZIZA, *Auricula*, concava rugosa auriformis. *Linn. S. N.* 725. *Tremella Auricula. Spec.* 1625. *Hall.* 2220 *Gled. M. F.* 39 III.

H. in caudicibus arborum, imprimis sambuci senio moribundis in pomariis passim. Octobri.

Pharm. FUNGI SAMBUCINI, f. AURICULA JUDÆ.

1094. PEZIZA, sessilis infundibuliformis, extus hirsuta, umbrina, intus nigerrima. *Hall.* 2219. T. 48. f. 8. optime.

H. in caudicibus arborum auf dem Hinter-Sand; vor dem obern Thor, auf dem Zimmerplatz; frequens.

1095. PEZIZA plana, flava brevissime petiolata. *Hall.* 2241.

H. in truncis putridis im Schusters - Grund. Octobri.

1096. PEZIZA humida, exilis, læte rubicunda. *Hall.* 2245.

H. in ligno putrescente in Testis am Homberg. Octobri.

Scutelliformis plana, sanguinea, marginata, sessilis, basi pilosa.

1097. PEZIZA nivea, infundibuliformis, brevissime petiolata. *Hall.* 2239. *Gled. M. F.* 46. c?

H. in truncis putridis passim.

1098. PEZIZA planissima, ex glauco nigricans. *Hall.* 2243.

H. similibus locis.

1099. PEZIZA plana, sessilis glauca, extus nivea. *Hall.* 2244.

H. in truncis putridis inter corticem. Var. præced.

1100. PEZIZA minima, petiolata, coccinea, hirsuta. *Hall.* 2240.

H. in ligno putrescente.

1101. PEZIZA plana, sessilis miniata, oris ciliatis. *Hall.* 2245. *Peziza minima lutea verna.* *Dill. cat. Giff.* 195. *Gled. M. F.* 45. VIII.

H. ad terram in ambulacris hortorum frequens inter Brya.

Non est var. *scutellata* Scutellæ fulva, carnosæ; sessiles, marginatæ, limbo piloso tumido.

1102. PEZIZA minima alba, petiolata, scypho infundibuliformi. *Hall.* 2238. et forte 2237.

H. in virgultis siccis passim.

CLAVARIA. G. P. 1216.

Fungus lævis, oblongus. S. N. 725.

a. Indivisa.

1103. CLAVARIA, *pistillaris*, clavæformis simplicissima. *Linn. Spec.* 1651. *Hall.* 2203. *Gled. M. F.* 26. I.

H. in sylvis umbrosis *im Breitscheider Wald*; *im Thiergarten.* Novembri.

1104. CLAVARIA, *militaris*, clavata integerrima capite squamoso. *Linn. Spec.* 1652. *Hall.* 2204.

H. in sylvis *in der Höhe*; *im Hirschberg*, rarius.

1105. CLAVARIA, *opbioglossoides*, clavata integerrima compressa obtusa. *Linn. Spec.* 1652. *Hall.* 2206.

H. in sylvaticis muscosis editioribus, *oben am Beilstein.* Octobri.

b. Ramosa.

1106. CLAVARIA, *digitata*, ramosa lignea nigra. *Linn.*

Linn. Spec. 1652. Sphæria. Hall. 2193. Mich. N. G. 104. T. 54. t. 4. 5.

H. in columnis cariosis prope terram, in Horto meo annuatim provenit. Octobri.

1107. CLAVARIA, *Hypoxylon*, ramoso - cornuta compressa. *Linn. Spec. 1652. Sphæria. Hall. 2194.*

H. in truncis arborum cædvis, in pomariis umbrosis vor dem Hornberg; am Hayn - Winckelgen, alibique frequens.

1108. CLAVARIA, *Coralloides*, ramis confertis ramosissimis inæqualibus. *Linn. Spec. 1652. Hall. 2201. Gled. M. F. 31. III.*

β. Clavaria, *purpurea*, corpore multifido, inæquali & ramossilluno, in apices graciles terminato. *Gled. M. F. 32. c.*

H. in sylvis im Hirschberg frequens. β. in umbrosis an der Høhle hinter dem Schloß, in sylvis in der Hørr frequens.

Colore pulcherrime purpureo. Ramis totis fructificatis omnibus exasperatis conicis concoloribus.

1109. CLAVARIA, *fastigiata*, ramis confertis ramossillimis fastigiatis obtusis luteis. *Linn. Spec. 1652.*

H. in sylvis im Thiergarten rarius.

1110. CLAVARIA, *muscoïdes*, ramis ramosis acuminatis inæqualibus luteis. *Linn. Spec. 1652. Hall. 2199.*

H. locis sterilibus muscosis, inter Lich. *rangifer. am Hornberg*, alibique frequens.

LYCOPERDON. G. P. 1217.

Fungus subrotundus, seminibus farinaceis repletus. S. N. 726.

a. *Solida, subterranea absque radice.*

1111. LYCOPERDON, *Tuber*, globosum solidum muricatum, radice destitutum. *Linn. Spec. 1653. Hall. 2177.*

H. in sylvis, sub terra, circa arcem Beilstein. Grüter, Consil.

1112. LYCOPERDON, *Cervinum*, globosum solidiusculum centro farinifero, radice instructum. *Linn. Spec. 1653. Sphæria. Hall. 2191.*

H. in

H. in sylvis montosis *im Beilstein*, a me ipso lectum, *bey dem Klingelborn* rarius; *im Ebersbacher Grund*, copiose.

Pharm. BOLETUS CERVINUS.

1113. LYCOPERDON, totum exasperatum, petiolo cylindrico, capitulo sphaerico. *Hall.* 2171. *Gled. M. F.* 144. e.

H. in sterilibus montosis *am Homberg*, Augusto.

b. *Pulverulenta, radicata supra terram.*

1114. LYCOPERDON, *Bovista*, subrotundum lacerto-dehiscens. *Linn. Spec.* 1653.

α. *lave*, } sessile vel stipitatum. *Hall.* 2171. 2172.
β. *hispidum*, }

Gled. M. F. 143. I. confer. varietates. & 144. e.

H. ad Terram α. in sylvis *im Thiergarten*, copiose. β. in paucis montosis sterilibus *auf dem Homberg*, frequens. Figura & magnitudine valde ludit.

1115. LYCOPERDON, *stellatum*, volva multifida patente, capitulo glabro: ore acuminato dentato. *Linn. Spec.* 1653. *Hall.* 2174. *Gled. M. F.* 152. b.

H. in montosis sylvaticis *am Geistlichen Berg*, rarius.

1116. LYCOPERDON, *pedunculatum*, stipite longo, capitulo globofo glabro: ore cylindrico integerrimo. *Linn. Spec.* 1654. *Hall.* 2170. *Gled. M. F.* 150. III.

H. in campis sterilibus sabulosis *auf dem Hinter-Sand*; *auf dem Schießplatz*, rarius.

1117. LYCOPERDON, *minimum*, pedunculatum, stipite bulboso, capitulo subrotundo lævi, ore tubuloso multifido.

H. in stipitibus Equiseti putrescentibus, in paludosis prope *Sinn*, frequens.

Funguli subaggregati, vix semilineam longi. Stipes basi bulbosus, sanguineus, pellucidus. Capitulum ab initio globosum, minimum, centro annulato depresso, dein poro dehiscente, tubus ascendis brevis, margine multifidus, ex quo pollen purpureum evolat.

c. *Parasitica, in farinam fatescentia.*

1118. LYCOPERDON, *variolosum*, parasiticum sessile subrotundum, cortice exteriori fulvo decido-

duo , farina atra compacta. *Linn. S. N. T. Hl.*
p. 234. *Lycogala. Hall. 2142.. Gled. M. F.*
161. III. a.

H. in arborum ramis emortuis dejectis , primo vere usque
frequens.

1119. LYCOPERDON , *pisiforme* , globosum scabrum :
ore perforato. *Linn. S. N. 726 ?*

H. in caudicibus arborum putrescentibus ; in pomariis *vor*
dem untern Thor. Novembri.

1120. LYCOPERDON , *Epidendrum* , cortice farinaque
purpurea. *Linn. Spec. 1654. Hall. 2173. Gled.*
M. F. 150. IV.

H. in lignis putrescentibus , & ad Terram *auf dem Hinter-*
sand. Colore sanguineo , purpureo flavo fuscoque ludit.

1121. LYCOPERDON , *epiphyllum* , aggregatum para-
fiticum ore multifido lacero : pulvere fulvo.
Linn. Spec. 1655.

H. in pagina inferiore Foliorum Tussilaginis.

MUCOR. G. P. 1218.

Fungus vesiculis stipitatis S. N. 726.

n. Perennis.

1122. MUCOR , *sphaerocephalus* , perennis stipite fili-
formi nigro , capitulo globoso cinereo. *Linn.*
Spec. 1655. Trichia. Hall. 2161.

H. in parietibus , & cortice arborum rimoso *am Homberg , in*
Conradi Garten.

1123. MUCOR , *lichenoides* , perennis , stipite subu-
lato nigro , capitulo lenticulari cinereo. *Linn.*
Spec. 1655.

H. in corticibus arborum *am Homberg.*

1124. MUCOR , *Embolus* ; seta nigra , villo fusco.
Linn. Spec. 1655. Embolus. Hall. 2137.

H. in truncis arborum putrescentibus , *bey dem Haynroin-*
ckelgen.

1125. MUCOR , *fulvus* , perennis pallidus , pileo
fulvo. *Linn. Spec. 1655.*

H. in arborum cortice , in pomario *hinter dem Schloß bey dem*
Aurfsuß der Mühlbach.

1126.

1126. *MUCOR, furfuraceus*, perennis viridis, foliis furfuraceis, stipite filiformi, capitulo globoso. *Linn. Spec.* 1655. *Trichia. Hall.* 2162.

H. ad Terram, in frustulis ligni putrescentis, *am Geistlichen Berg* frequens.

1127. *MUCOR, rufus*, stipitatus, capitulo subrotundo rufo. *an. Trichia. Hall.* 2163?

H. in ligno putrescente rarius.

Stipes *sataceus niger*. Capitulum *subrotundum, depressum, rufum, superfacie villosa*. Rupta epidermide lana assurgit, *evolasque niva, polline rufo*.

1128. *MUCOR, violaceus*, stipitatus, capitulo lentiformi depresso.

H. in ligno putrescente.

Stipes *lineam longus niger*. Capitulum *magnitudine & figura lentis minoris, depressum; quod in centro dehiscit in lacinas radiantes, pollen pulcherrime violaceum; lana albißima adhaerens excutit*.

b. *Fugaces.*

1129. *MUCOR, Mucedo* stipitatus capsula globosa. *Linn. Spec.* 1655. *Hall.* 2147. *Gled. M. F.* 161. IV.

H. in variis putrescentibus, Pane, Plantis exsiccatis.

1130. *MUCOR, leprosus*, seraceus, seminibus radi-
calibus. *Linn. Spec.* 1656.

H. in truncis putredine excavatis, *am Homberg.* Octobri.

1131. *MUCOR, glaucus*, stipitatus, capitulo subrotundo aggregato. *Linn. Spec.* 1656. *Gled. M. F.* 24. VI.

H. in pomis putredine corruptis.

1132. *MUCOR, lacteus*, stipitatus, capitulo puriformi-oblongo lacteo.

Mucilago minima clavæ effigie, lacteum candorem simulans, pediculo donata. *Mich.* 216. no. 4. T. 96. f. 4. *optime*. Embolus. *Hall.* 2138.

H. in trunco putrescente *am Homberg* rarius. Novembri.

*Substantia fungosa, fragilissima, mox contabescens, apice pers-
tata.*

1133. *Mucor, niveus*, stipitatus, capitulo globosa niveo nitido. *Lycogala. Hall. 2146.*

H. similibus in putrescentibus.

Stipes duas lineas longus, cinereus, striatus. Capitulum niveum, dein glaucum, epidermide tenaci, liquamen flavum continens.

1134. *Mucor, coccineus*, stipitatus, capitulo subrotundo. *Trichia. Hall. 2164.*

H. in ligno putrido semisepulto am Homberg. Martio.

Stipes lineam unam longus, nigricans. Capitulum magnitudine grani piperis, globosum, eximie coccineum. Epidermis vix digito tacta infra medium circumscinditur, & lana carnea assurgit, in formam Clava, pollen purpureum elastice ejaculans; stipite cum volva hemispharica persistente.

1135. *Mucor, pyriformis*, stipitatus, capitulo pyriformi purpureo. *Trichia. Hall. 2167.*

H. in cavis cariosisque arboribus passum.

Stipes solitarius, vel ex una basi multiplex. Capitulum pyriforme, purpureum, nitidum, stipite longius. Cuticula in medio transversim rupta, lana assurgit densa, pollinifera concolor, eorum simulans altitudine semipollicari.

1136. *Mucor, pomiformis*, substipitatus, capitulo globoso fulvo. *Trichia. Hall. 2167.*

H. similibus in locis.

Capitula globosa, aggregata, subsessilia. Lana & pollen fulvum

1137. *Mucor, crustaceus*, stipitatus, spicis digitatis. *Linn. Spec. 1656.*

H. in variis cibis corruptis.

1138. *Mucor, cespitosus*, stipite ramoso, spicis ternatis. *Linn. Spec. 1656.*

H. in rejectamentis hortorum putrescentibus.

1139. *Mucor, Erysiphe*, albus, capitulis fuscis sessilibus. *Linn. Spec. 1656.*

H. in foliis Sonchi, Humuli Lamii.

1140. *Mucor, septicus*, unctuosus flavus. *Linn. Spec. 1656. Fuligo. Hall. 2133. Gled. M. M. 160. d.*

H. in lignis putridis.

F I N I S.

Nota ad B. L.

Menda, quae irrepperunt B. L. eo magis excusabis; quia cum propriis negotiis implicatus, semperque tenui fuerim valetudine, & insuper homine huius rei completa notitia instructo destituerer, ipsemet hasce paginas elaborare, meisque tantum oculis perlustrare coactus fui. Sequentia itaque pro tuo candore corrigas & emendes rogo:

ADDENDA ET EMENDANDA.

Pag. 5. n. 20. VERR. *Acinifol.* Hall. 574. lege 547.

— 8. n. 31. POLYCNEUMUM adde: G. P. 53.

post n. 51. inseratur:

AGROSTIS, *Calamagrostis*, panicula incrassata, petalo exteriori toto lanato apice aristato, culmo ramoso. *Linn. Spec. 92.* (*Arundo.* Hall. 1521.)

H. in sylvaticis paludosis im Hirschberg ad Pagum Guntersdorf. Floret Julio.

Radix densa, fibrosa, arte implexa. Culmi 4 f. 5 - pedales, in nostrate non ramosi, erecti, stricti, scabri, binodes: Geniculo unico juxta basin, altero in culmi medio. Folia radicalia sesqui- & bipedalia, duriuscula lata, albido viridia, basi involuta, utrinque, imprimis subtus scaberrima. F. culmea, inferiora plura praeorsae seu emarcida, 2 f. 3 stricta, patensissima: Vaginis arctis, scabriusculis; Ligula oblonga, acuta, fissa. Panicula semipedalis, oblonga, ante & post florescentiam in spicaformam contracta; florens patens: Pedunculis verticillatis, strictis, ad angulum acutum discedentibus, basi in nodum callosum coactis; Pedicellis brevissimis: Flosculis dense confertis, subsecundis. Calyx uniflorus, glumis aequalibus, subulatis, dorso hispidiusculis; exteriori angustiore mucronata, rufescente. Corolla membranacea, albida, basi lanata: pilis inaequalibus, calyce paulo brevioribus: Petalum exterius acuminatum, apice fisso, calyce dimidio minus; Aristam ex dorso medio exserens rectam, crassitie ubique aequalem, scabram, calyce brevior: Petalum interius duplo minus, apice bifidum. Nectaria duo lanceolata, basi callosa germen ambientia. Stamina longitudine corolla. Antherae bifurcae, ochroleuca. Germen subrotundum. Styli patentes, crassiusculi. Stigmata densa, plumu-

plumulosa. Semen *acuminatum*, corolla *adnatum*, lana *cin-*
ctum, *Arista erecta paulo longiore*.

Pag. 21. n. 56. lin. 12. VAR. AG. lege: VAR. AGR. cet.

P. 23. n. 59. *AIRA cespitosa* lin. 7. *Epidermate plicato*
cet. lege: *Epidermide plicata* & cet.

P. 23. lin. 8. *armato* lege: *armata*.

P. 29. lin. 2. Geniculi 3 f. 4, subcylindracei cet. lege: Geni-
culis subcylindraceis cet.

P. 34. n. 77. lin. 17. *brevissimi*, lege: *brevissimi*.

P. 35. n. 79. lin. 15. pro *compressae* lege: *compressae*.

P. 36. n. 81. lin. 7. pro *levis*. Geniculi cet. lege: *levis*;
Geniculis 4 f. 6, subglobosis, nudis.

P. 38. n. 84. lin. 6. Geniculis, 3, lege: Geniculis 3,

P. 44. n. 93. infra pro Variat. lege: Variat sine puncto.

P. 46. n. 96. lin. 7. pro constans lege: constans c. p.

P. 48. n. 98. lin. 10. lethale lege: lethale.

P. 50. n. 101. *MONTIA fontana* addatur: H. in paludosis
silvaticis im *Hirschberg bey Gundersdorf*.

P. 54. post n. 120. *CORNUS mas, inferatur*: H. in sepibus
ad pagum *Breidscheid*.

P. 54. n. 122. lin. 7. pro SYST. NATH. III. 236. lege:
SYST. NAT. T. III. 236.

P. 73. lin. 36. dragmas lege: drachmas.

P. 86. n. 258. *LILIUM Martagen* addatur: H. in dumetis
am besten *Geörgen-Berg im Winckel in der Hecke*.

P. 97. n. 291. adde: *Pharm. VITIS IDAEAE* Rob. (Baccæ)

P. 105. n. 325. Petala calyce duplo breviora lege: *dimidio*
breviora.

P. 117. n. 380. ad *ROSAM sempervirens*. Mea *umbellata* ni-
hil aliud esse videtur:

Aculei recurvi, in ramulis sub floribus numerosiores tenuio-
res recti purpurascens. Stipulae uti folia supra glabra,
subtus marginibusque villosae - virides, glandulis fusco pur-
pureis undique adpersae, odoratae, odore pomorum. Pe-
tioli aculeati, glandulosi viscidis. Foliola interiora septena,
superiora quina tantum, ovata, serrata, serraturis subincisis.
Flores singuli rami terminales subumbellati 3-5. 7. laterales.
Sapini solitarii, pedunculi aculeis rectis hispidi, quorum interme-
dium nudus, reliqui bracteati, bracteis duabus oppositis lan-
ceolato-acuminatis, glandula incisis. Germen subglobosum.
Aculeatum. Calycis foliola pinnatifid. more canina. At
omnia foliola, glandulis stipitata. Adpersa visco. Flos par-
vus, Corolla qualem dixi. Fructus subglobosus maturus nigri-
cans, aculeatus. In asperis duris theriotrophæi Junio men-
se hunc fruticem, cum floribus & fructu exsucco præceden-
tis anni adhuc adhærente, reperi. Arbitror nostram um-
bellatam,

bellatam, & *eglanteriam*, cum hac coalescere, & meras hujus esse varietates. Nom. specificum S. N. 348. R. sempervirentis satis ad hanc quadrat. Ob defectum Authorum, mihi impossibile est, in hoc frutice aliquid certi exactique determinare.

p. 197. n. 710 lin. 11. pro *inferiores*, lege: *inferiora*.

p. — n. 711. lin. 13. pro *acuta* lege: *acuta*.

p. 258. n. 955 lin. 11. pro *hoc* lege: *hic*.

p. 261. lin. 4. pro *duo* lege: *dua*.

p. 272. infra pro BOL - lege: 1048.



CLAVIS

Litterarum, quæ in iconibus occurrunt, & quibus, ad partes fructificationis designandas utor & in posteris operibus, ad repetitionem vitandam, quoque utar.

a	.	.	.	Calyx.
b	.	.	.	Involucrum.
c	.	.	.	Corollæ petalum c * valvula interior.
d	.	.	.	Disci.
e	.	.	.	Radii.
f	.	.	.	Tubus f. unguis.
g	.	.	.	Limbus f. Lamina.
h	.	.	.	Vexillum.
i	.	.	.	<i>Ala.</i>
k	.	.	.	<i>Carina.</i>
l	.	.	.	<i>Nectarium.</i>
m	.	.	.	<i>Stamina.</i>
n	.	.	.	Germen.
o	.	.	.	Stigma.
p	.	.	.	Pericarpium.

q Dissepimentum.

q	:	.	.	Dissepimentum.
r	.	.	.	Loculamenta.
f	.	.	.	Semen.
c	.	.	.	Corona s. pappus.
u	.	.	.	Nux vel nucleus.
v	.	.	.	Receptaculum.
x	.	.	.	Arista.
y	.	.	.	Rachis.
z	.	.	.	Palea.
♂	.	.	.	Mas.
♀	.	.	.	Femina.
♂	.	.	.	Hermaphroditus.

Figuræ literis
mediocribus notatae partium magnitudinem
naturalem, literis maioribus vero, magnitu-
dinem semper mediocriter auctam significant.
Cal. a. Cal. auctus A.





I N D E X.

A.

Acer	772-774
<u>Achillea</u>	<u>669-671</u>
Aconitum	412
Acorus	<u>260</u>
Acrostichum	788
Aëza	405
Adoxa	<u>303</u>
Aegopodium	<u>221</u>
Aesculus	<u>283</u>
Aerhufa	<u>207</u>
Agaricus	1027-1063
Agrimonia	355
Agrostema	348
Agrostis	<u>51</u> - <u>56</u>
Aira	<u>58</u> - 62
Ajuga	443 - 446
<u>Alchemilla</u>	<u>121</u> , <u>122</u>
Alisma	<u>282</u>
Allium	<u>244</u> - <u>246</u>
Alopecurus	43 - <u>45</u>
Alfne	<u>232</u>
Alyssum	499. 500
Anagallis	<u>139</u>
Anemone	417-419
Anerhum	<u>219</u> , <u>220</u>
Angelica	<u>205</u> , <u>206</u>
Anthemis	666-668
Anthericum	252
Antirrhinum	488-493
Anthoceros	914-915
Anthoxanthum	<u>25</u>
Anthyllis	<u>557</u>
Apium	222, <u>223</u>
Aquilegia	<u>413</u>
Arabis	<u>514</u>
Arctium	<u>624</u>
Arenaria	324 - <u>327</u>

Aristolochia	701
Arnica	<u>651</u>
Artemisia	636-637
Arum	702
Arundo	<u>94</u>
Asarum	<u>353</u>
Asclepias	<u>175</u>
Asparagus	<u>257</u>
Asperula	<u>118</u>
Asplenium	798-802
Astragalus	570
Atriplex	775-777
Atropa	<u>155</u>
Avena	<u>88</u> - <u>93</u>

B.

Ballota	464
Bellis	643
Berberis	240
Betonica	447
Betula	730-731
Bidenis	634-635
Blasia	916
Boletus	1064-1074
Borago	<u>135</u>
Brassica	515-517
Bromus	81-87
Briza	<u>64</u>
Bryonia	744
Bryum	829-849
Bunium	<u>199</u>
Bupleurum	<u>200</u>
Buxbaumia	887
Byssus	<u>1001</u> , <u>1012</u>

C.

Calendula	680
Callitriche	<u>2</u> , <u>3</u>

Caltha	<u>416</u>
Campanula	157- <u>163</u>
Cannabis	761
Cardamine	522-526
Carduus	625-630
Carex	705-725
Carlina	622
Carpinus	741
Carum	<u>217</u>
Caucalis	<u>194</u>
Centaurea	672-674
Cerastium	343-347
Ceratophyllum	734-735
Chazrophyllyum	212-215
Chelidonium	404
Chenopodium	180- <u>188</u>
Chrysanthemum	647-650
Chrysofenium	312
Cichorium	<u>313</u>
Cicrea	598
Cistus	<u>24</u>
Clavaria	406
Clematis	<u>1103</u> - <u>1110</u>
Clinopodium	414
Cnicus	472
Cochlearia	623
Colchicum	<u>501</u> , <u>502</u>
Colchicum	<u>271</u>
Comarum	399
Conserua	1017-1026
Conium	<u>198</u>
Convallaria	247-251
Convolvulus	145-146
Coryza	639
Coreopsis	676
Cornus	120

I N D E X.

Corylus	740	Filago	677 - 679.	Iris	30
Crataegus	371 373	Fontinalis	885. 886	Juglans	739
Crepis	609-611	Fragaria	391. 392	Juncus	261-270
Cucubalus	332	Fraxinus	778	Jungermannia	891
Cuscuta	123	Fumaria	548 - 550	-	913
Cynoglossum.	137			Juniperus	268
Cynofarus.	99				
Cyperus	33				

G.

L.

D.

Dactylis	57
Daphne	294
Datura	147
Daucus	195
Delphinium.	410
-	411
Dentaria	521
Dianthus	319-323
Digitalis	486. 487
Dipsacus.	102. 103
Draba	496
Drosera.	237. 238

E.

Echium	130
Elvela	1083
Elymus.	96
Epilobium	284-288
Equisetum	779-784
Erica	293
Erigeron	654-655
Eriophorum	37
Ervum	587-591
Erysimum	510-513
Eryonymus	168
Eupatorium	633
Euphorbia	357-362
Euphrasia	475-476

F.

Fagus	773
Festuca	74-80

Galeopsis	452-455
Galium	110-117
Genista	553-556
Gentiana	176-179
Geranium	533-542
Geum	397. 398
Glechoma	434
Gnaphalium	640-
-	642
Gypsophila	316

H.

Hedera	174
Hedysarum	584
Heracleum	192
Herniaria	189
Hieracium	613-
-	620
Hippuris	1
Holcus	769. 770
Holosteum	100
Humulus	762
Hydnum	1075-1080
Hyoscyamus	148
Hypericum	593-597
Hypnum	850-884
Hypochaeris	599
-	600

I.

Jasione	681
Ilex	124
Impatiens	686
Inula	652. 653

M.

Malva	543-547
Marchantia	888-
-	890
Marrubium	465
Matricaria	644-646

Medi.

I N D E X.

Medicago 585. 586
 Melampyrum 478-
 481
 Melica -63
 Mentha 435 - 439
 Menyanthes 141
 Mercurialis 766. 767
 Mespilus 375
 Milium 50
 Munum 812- 828
 Monotropa 305
 Montia 101
 Mucor 1122- 1140
 Myagrum 498
 Myosotis 138
 Myosurus 239
 Myriophyllum 732
 - 733

N.

Narcissus 242. 243
 Nardus - 38
 Nepeta 462
 Nymphæa 408. 409

O.

Oenanthe 193
 Oenothera 289
 Ononis 558
 Onopordum 631
 Ophioglossum 785
 Ophrys 696. 697
 Orchis 687- 695
 Origanum 478
 Ornithogalum 253-
 255
 Oropanche 473
 Orobus 559. 560
 Osmunda 786. 787
 Oxalis 351. 352

P.

Panicum 39 - 42
 Papaver 400- 403
 Paris 304
 Parnassia 233
 Pastinaca 218
 Pedicularis 494
 - 495
 Peucedanum 197
 Peziza 1084- 1102
 Phales 48. 49
 Phalis 1081. 1082
 Phacelia 807. 808
 Phelandrium 216
 Philadelphus 364
 Phleum 46. 47
 Phytolacca 156
 Picris 602
 Pimpinella 224. 225
 Pinus 742. 743
 Plantago 106 - 108
 Poa 65 - 73
 Polynemum 31
 Polyala 551
 Polygonum 295 -
 302
 Polyodium 789 -
 797
 Polyrichum 809 -
 811
 Populus 763 - 765
 Pottamogeton 116 -
 129
 Portulaca 393- 396
 Potirum 736
 Præanthes 612
 Prunella 143
 Prunella 469. 470
 Prunus 365 - 370
 Pteris 803
 Pulmonaria 131
 Pyrola 306 - 309
 Pyrus 376. 377

Q.

Quercus 738

R.

Ranunculus 421 -
 432
 Raphanus 509
 Refeda 356
 Rhamnus 166. 167
 Rhinanthus 477
 Ribes 169 - 173
 Riccia 917 - 919
 Rosa 379 - 385
 Rubus 386 - 389
 Rudbeckia 675
 Rumex 273 - 281

S.

Sagina 125
 Salix 745 - 759
 Sambucus 228 - 230
 Sanguiforba 109
 Sanicula 191
 Saponaria 317 -
 318
 Satureia 463
 Saxifraga 314. 315
 Scabiosa 104. 105
 Scandix 208. 211
 Schœnus 32
 Scilla 252
 Scirpus 34 - 36
 Scleranthus 310
 - 311
 Scrophularia 483 -
 485
 Scutellaria 466
 Sedum 334 - 339
 Selinum 204
 Sempervivum 363
 Senecio 657 - 662

T 2

Sera-

T.


V.

Serapias	698-700	Tanacetum	638	Vaccinium	290-
Serratula	632	Teucrium	440-		292
Sherardia	119		442	Valantia	771
Silene	333	Thalictrum	415	Valeriana	26-29
Sinapis	527	Thlaspi	50-508	Verbascum	149-
Sisymbrium	528-	Thymus	47-468		151
	532	Tilia	407	Verbena	22
Sium	201-203	Tordylium	196	Veronica	6-20
Solanum	153-154	Tormentilla	390	Viburnum	226-227
Solidago	656	Tragopogon	601	Vicia	564-569
Sonchus	607-608	Tremella	101-1015	Vinca	152
Sorbus	374	Trifolium	571-	Viola	682-685
Sparganium	726		583	Viscum	760
Spartium	552	Triglochin	272		
Spergula	340-342	Triticum	95		
Sphagnum	806	Trollius	420		
Spiraea	378	Tulipa	259		
Stachys	456-461	Turritis	53-520	Ulmus	190
Staphylea	231	Tussilago	60-565	Urtica	728-729
Stellaria	328-331	Typha	727	Utricularia	21
Symphytum	134				
Syringa	5				


U.




547412













Love & sister in sculpture.








Lycopersicon al. f. scap.














12

12




























Leaves of the plant.





Leaves of the plant





